



**Centros de
Integración
Juvenil, A.C.**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL
CONSUMO DE DROGAS**

**CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES
DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE
INTEGRACIÓN JUVENIL**

DROGAS ILÍCITAS

PRIMER SEMESTRE DE 2019

Alma Delia Gutiérrez López

Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
México, septiembre del 2019

SIECD

Informe de Investigación 19-04a



DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Mtra. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

JEFE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA

Dr. Valeriano Raúl García Aurrecoechea

CONTENIDO	PÁG.
RESUMEN	4
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
RESULTADOS	8
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	28
GLOSARIO	52

ÍNDICE DE CUADROS		PÁG.
Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	29
Cuadro 2	Sexo	32
Cuadro 3	Persona que proporciona la información	32
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	32
Cuadro 5	Estado civil	33
Cuadro 6	Escolaridad	33
Cuadro 7	Ocupación	34
Cuadro 8	Estrato social	34
Cuadro 9	Motivos de consulta	35
Cuadro 10	Condicionantes de la solicitud de tratamiento	35
Cuadro 11	Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	36
Cuadro 12	Problemas asociados al consumo de sustancias	36
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de tabaco	37
Cuadro 14	Edad de inicio del consumo de alcohol	37
Cuadro 15	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	38
Cuadro 16	Drogas ilícitas de inicio según menciones	39
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 18	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 19	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	41
Cuadro 20	Tipo de consumo de drogas ilícitas	41
Cuadro 21	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	42
Cuadro 22	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	42
Cuadro 23	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	43
Cuadro 24	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	44
Cuadro 25	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	44
Cuadro 26	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	45
Cuadro 27	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 28	Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	47
Cuadro 29	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	48
Cuadro 30	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	48
Cuadro 31	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	49
Cuadro 32	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	50
Cuadro 33	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	51
Cuadro 34	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	51
Cuadro 35	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	51

RESUMEN

El presente informe se realizó con base en 11,596 registros clínicos de la entrevista inicial realizada a personas que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento por el consumo de drogas a Centros de Integración Juvenil (CIJ) entre enero y junio de 2019.

Los objetivos del estudio son: a) actualizar información de los solicitantes de tratamiento en cuanto al perfil sociodemográfico, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de sustancias; b) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas c) contribuir con los sistemas nacionales de información del consumo de drogas y d) generar información que oriente el desarrollo de estudios sobre el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias en México.

Los datos que se presentan revelan que el uso de drogas ilícitas sigue siendo un problema que afecta mayormente a la población masculina, en una proporción de 4.3 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 23.8 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (24.2 y 22.2 años, respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco y de alcohol fue a los 14.7 años y la de drogas ilícitas a los 16.3 años. La edad de inicio del consumo de sustancias no presenta diferencias importantes por sexo en cuanto a tabaco y alcohol. Sin embargo, el consumo de drogas ilícitas se presentó de manera más temprana entre los hombres (16.2 años), en comparación con las mujeres (16.9 años.)

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (88.5%), cannabis (86.5%), tabaco (85.3%), cocaína/crack (46.2%), estimulantes (40.2%, principalmente metanfetaminas: 35.6% y éxtasis: 6.5%), inhalables (21.5%), depresores (15.3%), drogas alucinógenas y disociativas (13.6%) y opiáceos (4.2%, principalmente heroína: 2.5%). Las sustancias más utilizadas el mes previo al ingreso a tratamiento fueron: tabaco (59.5%), alcohol (55.8%), cannabis (47.9%), metanfetaminas (19.4%), cocaína/crack (15.2%), inhalables (5.8%) y benzodiazepinas (5.0%). Las sustancias reportadas como de mayor impacto fueron: marihuana (36.4%), metanfetaminas (22.9%), alcohol (13.1%), crack (6.2%), tabaco (5.7%) y cocaína en polvo (4.9%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los consultantes acudieron principalmente por recomendación de la familia (44.1%) o por iniciativa propia (43.8%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (88.2%), alcohol (42.2%) o tabaco (36.5%). Previo a su ingreso a tratamiento en CIJ, 31.9% de los solicitantes intentaron interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el uso de sustancias, mientras que 25.4% no habían realizado alguna acción para dejar el consumo. Los problemas asociados al consumo de drogas reportados con mayor frecuencia fueron los del ámbito familiar (78.2%), de salud (45.5%), psicológicos (45.2%) y escolares (36.9%).

ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976¹. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso². Sin embargo, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática³. Posteriormente, se implementa el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha consolidado a través de los años y realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen en la toma de decisiones de los servicios institucionales. Además, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del uso de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)⁴ de la Secretaría de Salud, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRF)⁵– y el Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud^{6,7,8}.

El SIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, incluyendo el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo⁹, uso de drogas en mujeres¹⁰, población infantil¹¹ o de acuerdo con las etapas de la vida¹² y estudios de tendencias^{13,14,15,16}. Esta información permite enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que sustenta el diseño de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides^{17,18}.

La información reportada a través del sistema ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el 2006, el SIECD genera un informe de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol¹⁹, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores²⁰; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática²¹ y que ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes²².

Cabe destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales^{23,24,25} y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de

investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*²⁶ realizados por los CIJ a lo largo del país.

El presente informe se elaboró con base en información obtenida por el SIECD durante el primer semestre del 2019 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: Censo, descriptivo, semestral.

Población: 11,596 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 107 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2019 (cuadro 1. Anexo).

Fuente de información: Formato de Entrevista Inicial aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 15 de julio de 2019 a las 16:34 hrs., con 11.596 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (67 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, droga ilícita de inicio, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas

dos últimas variables de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta agrupada en 26 categorías de drogas y en algunos casos (consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes) se proporciona además información concentrada en diez grupos:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiazepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas (<i>crystal</i> o <i>ICE</i>), MDMA (<i>éxtasis</i>) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, Opioides sintéticos y opio y otros opiáceos
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

Procesamiento de datos. Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS^a

Sexo. La población se conformó por 9,428 hombres y 2,168 mujeres, lo cual representa 81.3% y 18.7%, respectivamente. Es decir, 4.3 hombres solicitan tratamiento en CIJ por cada mujer.

Persona que proporciona la información. 49.0% de los casos acudieron en compañía de familiares u otras personas, sin diferencias entre hombres (49.0%) y mujeres (49.0%).

Edad de ingreso a tratamiento. Se observa un rango de edad de 6 a 80 años, con un promedio de 23.8 años (DE= 10.8 años); es decir, 9,728 de los usuarios de drogas tenía entre los 13 y 35 años de edad (alrededor del 84% de las personas atendidas); la edad mediana de la población fue de 20 años (39.0% de los casos fueron menores de edad; 4,525 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 16 años (1,112 casos atendidos).

Figura 1. Edad de ingreso según sexo


	 Años	 Años	Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad (en promedio, dos años antes que los hombres).
Rango	6 a 80	11 a 77	
Promedio (Desviación estándar)	24.2 (10.9)	22.2 (10.0)	
Mediana	20	18	
Moda	16	15	
Decil₁	14	14	

^a Cfr., Cuadros 1 a 8.

Estado civil. La mayor parte de la población refirió ser soltera (70.3%), mientras que 12.4% indicó que vivía en unión libre y 9.5% estaba casada.


Figura 2. Estado civil según sexo

La proporción de hombres que cuentan con alguna relación de pareja es mayor que la de mujeres.



Escolaridad. En términos generales, 39.7% había cursado al menos algún grado de educación secundaria, 38.8% algún grado de bachillerato, 11.6% tenía estudios superiores y 6.5% solo había cursado la primaria.


Figura 3. Escolaridad según sexo



Las mujeres cuentan, en mayor proporción que los hombres, con estudios superiores.


Ocupación. 36.6% desempeñaba alguna actividad laboral, 32.0% reportó ser estudiante y 21.7% estaba desempleado.

Figura 4. Principal ocupación según sexo



Estrato social. De acuerdo con la percepción de los terapeutas, la mitad de los pacientes (50.6%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 23.2% en un nivel bajo y 21.3% fue clasificado en el estrato medio.


Figura 5. Estrato social según sexo



FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO^b


Motivos de consulta. 45.9% de las personas atendidas reportaron más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.1% no expresó ninguno. 88.2% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 42.2% por uso de bebidas alcohólicas y 36.5% por uso de tabaco.

Figura 6. Motivos de consulta según sexo



Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 29.1% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 44.1% acudió por recomendación de la familia, 43.8% por iniciativa propia, 18.7% por condicionamiento o recomendación escolar, 10.1% por indicación médica y 8.5 % por condicionamiento legal.


Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo



^b Cfr. Cuadros 9 a 12.

Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. 31.9% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir voluntariamente el consumo sin otro tipo de apoyo, 12.2% señaló que había estado internado en algún anexo, 7.2% había acudido a algún grupo de autoayuda, 6.6% lo había hecho a través de juramento y el 6.8% con tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico de tipo ambulatorio. Cabe señalar que 13.3% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 25.4% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo



Mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas para dejar el consumo de drogas o habían acudido a tratamientos psiquiátricos o psicoterapéuticos ambulatorios, mientras que los hombres en mayor proporción que las mujeres intentaron dejarlo de manera voluntaria, se internaron en algún anexo, participaron en grupos de autoayuda o por medio de juramento.

Problemas asociados al consumo de sustancias. 78.2% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 45.5% de salud, 45.2% psicológicos, 36.9% escolares, 25.4% laborales, 18.9% legales, 13.8% de conducta antisocial o delictiva y 13.7% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 77.7% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 5.1% no reportó ninguno.

Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo



Los problemas familiares son los más frecuentemente relacionados al consumo de drogas entre hombres y mujeres.

Sin embargo, las mujeres reportaron en mayor proporción que los hombres problemas psicológicos, de salud y escolares; mientras que los hombres por poco duplican el porcentaje de mujeres, al referir problemas de tipo laboral y legal.

CONSUMO DE DROGAS^c

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.7 años (DE =3.6 años), la mediana en 14 años y la moda en 15 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.7 años (DE =3.1 años) con una mediana y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio del uso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 16.3 años (DE =5.3 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco aparece a los 11 años, mientras que el de alcohol y drogas ilícitas se presenta a los 12 años de edad.

Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	14.6 (3.5)	14.7 (3.0)	16.2 (5.1)	14.9 (4.0)	14.8 (3.5)	16.9 (6.2)
Mediana	14	15	15	14	15	15
Moda	15	15	15	14	15	15
Decil₁	11	12	12	11	12	12


En cuanto a la edad de inicio del consumo de sustancias, no se observan diferencias entre hombres y mujeres.

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias de inicio más reportadas fueron: marihuana (74.2%); cocaína (9.8%), tanto en forma de polvo blanco (7.7%) como crack (2.1%); inhalables (6.8%), mayormente en forma de solventes y removedores (4.9%); seguidos por los estimulantes (6.2%), donde destacan las metanfetaminas (5.2%); depresores

^c Cfr., Cuadros 13 a 35

con utilidad médica como las benzodiazepinas (1.6%); y los opiáceos (0.5%), entre los cuales sobresalen los opioides sintéticos (26 casos) y la heroína (19 casos).

Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo



Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco, 9.6 años (DE=10.3 años), alcohol 9.6 años (DE=10.2 años) y drogas ilícitas 7.5 años (DE =9.1 años).

Cabe señalar que la mitad de los usuarios de alcohol y la mitad de los usuarios de tabaco dejaron pasar seis años desde que iniciaron el consumo hasta que acudieron a solicitar tratamiento; en tanto que los usuarios de drogas dejaron pasar cuatro años.


Figura 12. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	10.0 (10.5)	10.1 (10.4)	8.0 (9.5)	7.8 (9.0)	7.7 (8.8)	5.3 (7.0)
Mediana	6	6	4	4	4	3
Moda	1	1	1	1	1	< un año
Decil₁	1	1	< un año	1	1	< un año

Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, 51.8% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 22.7% con consumo disfuncional, 12.6% con consumo social u ocasional, 10.0% con consumo experimental y 2.9% presentaba remisión del consumo.

Figura 13. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo




El patrón de consumo funcional y disfuncional es mayor en los hombres, mientras que una mayor proporción de mujeres reporta el consumo de tipo ocasional y experimental.

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.4 drogas (95.1% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.6 drogas (89.5% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.2 drogas (66.2% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.6 drogas (62.7% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 2.0 drogas (48.4% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.0 droga (22.6% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 14. Promedio de drogas consumidas según sexo




Mujeres y hombres han consumido prácticamente el mismo número de sustancias.

Consumo de drogas alguna vez en la vida.^d Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias en seguimiento fueron: alcohol (88.5%), *cannabis* (86.5%), tabaco (85.3%), cocaína (46.2%), estimulantes (40.2%), inhalables (21.5%), depresores (15.3 %), drogas alucinógenas y disociativas (13.6%), opiáceos (4.2%) y otras sustancias de abuso (2.3%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (86.4%), cocaína en polvo (40.4%), metanfetaminas (35.6%), *crack* (19.9%), solventes y removedores (16.2%), benzodiazepinas (14.8%) y LSD (11.3%); en menor proporción se reportó el consumo de *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (6.5%), hachís (6.0%) y pegamentos (5.5%).

Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo




Los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de tabaco, alcohol, marihuana, inhalables, cocaína y crack. Ellas reportaron mayormente el consumo de benzodiazepinas y éxtasis.

^d Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 98.7% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (81.5%), tabaco (76.1%), cannabis (72.0%), estimulantes (34.6%), cocaína (33.6%), inhalables (14.0%), depresores (11.0%), drogas alucinógenas y disociativas (8.9%); opiáceos (3.1%) y otras sustancias de abuso (1.7%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores, destacaron: marihuana (71.9%), metanfetaminas (31.4%), cocaína en polvo (27.5%), crack (14.6%) y solventes y removedores (10.7%); en menor proporción se refieren las benzodiazepinas (10.7%) y LSD (7.8%).


Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y marihuana; las mujeres usaron en mayor proporción que los hombres: metanfetaminas, benzodiazepinas y éxtasis.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: marihuana (41.6%), metanfetaminas (16.1%), alcohol (15.7%) y tabaco (10.0%).

Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo




Los hombres reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el uso de marihuana, cocaína en polvo, crack y heroína; mientras que en las mujeres la preferencia fue mayor que en los hombres por el tabaco, alcohol, inhalables, metanfetaminas y benzodiazepinas.

No obstante, cabe resaltar que la marihuana es la droga preferidas tanto por hombres como por mujeres.

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses. Las principales sustancias reportadas por los pacientes a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: marihuana (36.4%), metanfetaminas (22.9%) y alcohol (13.1%); en menor medida se mencionó al crack (6.2%), tabaco (5.7%) y cocaína en polvo (4.9%).

Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo




Hombres y mujeres acuden a tratamiento principalmente por el consumo de marihuana y metanfetaminas.

Con mayor frecuencia ellos acuden por los efectos asociados al consumo de marihuana y crack; mientras que ellas por los del uso de tabaco, alcohol, metanfetaminas y benzodiazepinas.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.^e Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, casi la mitad de la población (45.5%) reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo



Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el uso de dos o más sustancias (no se incluye el consumo de tabaco) en un mismo día.


^e No se toman en cuenta 2,190 casos (18.9%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 18.2% de los hombres y 21.7% de las mujeres (ver anexo, cuadro 29).

Consumo de drogas en los últimos 30 días. Incluyendo alcohol y tabaco, 89.7% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las prevalencias de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (59.5%), alcohol (55.8%), cannabis (47.9%), estimulantes (20.4%), cocaína (15.2%), inhalables (5.8%), depresores (5.1%), drogas alucinógenas y disociativas (1.9%), opiáceos (1.7%) y otras sustancias de abuso (0.9%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 47.9%, seguida de metanfetaminas (19.4%), Cocaína (9.7%), crack (7.3%), benzodiazepinas (5.0%) y solventes/removedores (4.5%); en menor proporción se registró el consumo de LSD (1.8%) y heroína (1.1%).


Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo



Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol, marihuana y metanfetaminas –los hombres en mayor proporción–. Las mujeres reportaron mayor consumo de benzodiazepinas y alucinógenos.

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 40.3% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Asimismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (36.5%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana o una o dos veces a la semana (29.5%). Por otra parte, 40.1% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 23.3% menos de una vez a la semana, 20.2% una a dos veces a la semana y 16.4% cada tercer día.

Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



En general, los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso de drogas ilícitas, tabaco y alcohol que las mujeres.

REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado de http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/info_sisvea/informes_sisvea_2006.pdf
5. Ortiz A, Martínez R., Meza D. (2019). Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: “Informe Individual sobre Consumo de Drogas”. Tendencias en el área metropolitana No. 63, Noviembre de 2017. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México. Recuperado de http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep_63_pdf.pdf
6. Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. y García, V. R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. *Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001*. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71). Recuperado de http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf
7. Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019). *Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas (OMEXTAD)*. México.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/469562/Dosier_Observatorio_Mexicano_de_Drogas_OMD.PDF

8. Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019) *Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México y su atención integral 2019*. México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/477564/Informe_sobre_la_situacion_de_las_drogas_en_Mexico_.pdf
9. García-Aurrecochea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Díaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
10. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. Recuperado de <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
11. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
12. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
13. García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
14. Gutiérrez López, AD. (2019). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 2° semestre de 2018. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 19-01e]. México:

- Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/19-01e.pdf>
15. Gutiérrez, A. D. (2019). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 2° semestre de 2018. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 19-01f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/19-01f.pdf>
16. Gutiérrez, A. D. (2019). *Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 2° semestre de 2018. (Nivel nacional y entidades federativas)* [Informe de Investigación 19-01g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/19-01g.pdf>
17. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
18. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
19. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
20. Gutiérrez, A. D. (2019). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Tabaco y alcohol. Segundo semestre del 2018.* (Informe de Investigación 19-01d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/19-01d.pdf>
21. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente*

en mujeres. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

22. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
23. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
24. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
25. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
26. Centros de Integración Juvenil, A.C. (2019). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2018*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/Index.html>

Cuadros

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTH)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	79	0.7	65	0.7	14	0.6	4.6 : 1
Álvaro Obregón Oriente	61	0.5	53	0.6	8	0.4	6.6 : 1
Atizapán	87	0.8	67	0.7	20	0.9	3.4 : 1
Azcapotzalco	154	1.3	127	1.3	27	1.2	4.7 : 1
Benito Juárez	127	1.1	101	1.1	26	1.2	3.9 : 1
Chalco	115	1.0	96	1.0	19	0.9	5.1 : 1
Coyoacán	168	1.4	133	1.4	35	1.6	3.8 : 1
Cuajimalpa	94	0.8	82	0.9	12	0.6	6.8 : 1
Cuauhtémoc Oriente	143	1.2	118	1.3	25	1.2	4.7 : 1
Cuauhtémoc Poniente	156	1.3	125	1.3	31	1.4	4.0 : 1
Ecatepec	198	1.7	169	1.8	29	1.3	5.8 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	226	1.9	194	2.1	32	1.5	6.1 : 1
Gustavo A. Madero Norte	160	1.4	132	1.4	28	1.3	4.7 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	26	0.2	22	0.2	4	0.2	5.5 : 1
Iztapalapa Oriente	378	3.3	320	3.4	58	2.7	5.5 : 1
Iztapalapa Poniente	103	0.9	81	0.9	22	1.0	3.7 : 1
Miguel Hidalgo	96	0.8	80	0.8	16	0.7	5.0 : 1
Naucalpan	141	1.2	121	1.3	20	0.9	6.1 : 1
Nezahualcóyotl	297	2.6	243	2.6	54	2.5	4.5 : 1
Texcoco	118	1.0	104	1.1	14	0.6	7.4 : 1
Tlalnepantla	215	1.9	180	1.9	35	1.6	5.1 : 1
Tlalpan	183	1.6	148	1.6	35	1.6	4.2 : 1
Venustiano Carranza	132	1.1	102	1.1	30	1.4	3.4 : 1
UH Ecatepec	50	0.4	47	0.5	3	0.1	15.7 : 1
UH Iztapalapa	128	1.1	105	1.1	23	1.1	4.6 : 1
UH Naucalpan	37	0.3	34	0.4	3	0.1	11.3 : 1
Acapulco	126	1.1	99	1.1	27	1.2	3.7 : 1
Aguascalientes	216	1.9	178	1.9	38	1.8	4.7 : 1
Cancún	137	1.2	103	1.1	34	1.6	3.0 : 1
Cd. del Carmen	37	0.3	29	0.3	8	0.4	3.6 : 1
Cd. Juárez Norte	128	1.1	100	1.1	28	1.3	3.6 : 1
Cd. Victoria	24	0.2	22	0.2	2	0.1	11.0 : 1
Celaya	221	1.9	179	1.9	42	1.9	4.3 : 1
Chetumal	62	0.5	47	0.5	15	0.7	3.1 : 1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chihuahua	262	2.3	203	2.2	59	2.7	3.4 : 1
Chilpancingo	72	0.6	58	0.6	14	0.6	4.1 : 1
Colima	146	1.3	123	1.3	23	1.1	5.3 : 1
Cozumel	53	0.5	48	0.5	5	0.2	9.6 : 1
Cuernavaca	124	1.1	107	1.1	17	0.8	6.3 : 1
Culiacán	127	1.1	111	1.2	16	0.7	6.9 : 1
Durango	72	0.6	48	0.5	24	1.1	2.0 : 1
Escuinapa	43	0.4	33	0.4	10	0.5	3.3 : 1
Fresnillo	35	0.3	23	0.2	12	0.6	1.9 : 1
Guadalajara Centro	282	2.4	236	2.5	46	2.1	5.1 : 1
Guadalajara Sur	139	1.2	115	1.2	24	1.1	4.8 : 1
Guadalupe	102	0.9	84	0.9	18	0.8	4.7 : 1
Guamúchil	74	0.6	60	0.6	14	0.6	4.3 : 1
Guasave	68	0.6	59	0.6	9	0.4	6.6 : 1
Hermosillo	114	1.0	91	1.0	23	1.1	4.0 : 1
Huatulco	26	0.2	22	0.2	4	0.2	5.5 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	38	0.3	30	0.3	8	0.4	3.8 : 1
La Paz	94	0.8	72	0.8	22	1.0	3.3 : 1
La Piedad	67	0.6	58	0.6	9	0.4	6.4 : 1
Laguna Durango	107	0.9	86	0.9	21	1.0	4.1 : 1
León	178	1.5	140	1.5	38	1.8	3.7 : 1
Los Cabos	64	0.6	50	0.5	14	0.6	3.6 : 1
Los Mochis	74	0.6	63	0.7	11	0.5	5.7 : 1
Manzanillo	56	0.5	43	0.5	13	0.6	3.3 : 1
Mazatlán	98	0.8	76	0.8	22	1.0	3.5 : 1
Mérida	105	0.9	89	0.9	16	0.7	5.6 : 1
Mexicali	140	1.2	115	1.2	25	1.2	4.6 : 1
Monterrey	181	1.6	139	1.5	42	1.9	3.3 : 1
Morelia	67	0.6	50	0.5	17	0.8	2.9 : 1
Nogales	80	0.7	59	0.6	21	1.0	2.8 : 1
Oaxaca	122	1.1	106	1.1	16	0.7	6.6 : 1
Pachuca	200	1.7	160	1.7	40	1.8	4.0 : 1
Playa del Carmen	59	0.5	46	0.5	13	0.6	3.5 : 1
Poza Rica	66	0.6	47	0.5	19	0.9	2.5 : 1
Puebla	112	1.0	88	0.9	24	1.1	3.7 : 1
Puerto Vallarta	114	1.0	94	1.0	20	0.9	4.7 : 1
Querétaro	140	1.2	115	1.2	25	1.2	4.6 : 1
Ramos Arizpe	2	0.0	2	0.0	0	0.0	---
Reynosa	49	0.4	43	0.5	6	0.3	7.2 : 1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Salamanca	58	0.5	48	0.5	10	0.5	4.8 : 1
Saltillo	232	2.0	180	1.9	52	2.4	3.5 : 1
San Luis Potosí	195	1.7	157	1.7	38	1.8	4.1 : 1
San Nicolás de los Garza	151	1.3	121	1.3	30	1.4	4.0 : 1
Tampico	84	0.7	71	0.8	13	0.6	5.5 : 1
Tapachula	29	0.3	25	0.3	4	0.2	6.3 : 1
Tecomán	57	0.5	48	0.5	9	0.4	5.3 : 1
Tehuacán	121	1.0	101	1.1	20	0.9	5.1 : 1
Tepic	28	0.2	22	0.2	6	0.3	3.7 : 1
Tijuana Guaycura	171	1.5	127	1.3	44	2.0	2.9 : 1
Tijuana Soler	152	1.3	103	1.1	49	2.3	2.1 : 1
Tlaquepaque	213	1.8	174	1.8	39	1.8	4.5 : 1
Tlaxcala	41	0.4	35	0.4	6	0.3	5.8 : 1
Toluca	221	1.9	195	2.1	26	1.2	7.5 : 1
Torreón Oriente	317	2.7	246	2.6	71	3.3	3.5 : 1
Tuxtla Gutiérrez	68	0.6	60	0.6	8	0.4	7.5 : 1
Villa Victoria	17	0.1	16	0.2	1	0.0	16.0 : 1
Villahermosa	75	0.6	54	0.6	21	1.0	2.6 : 1
Xalapa	92	0.8	78	0.8	14	0.6	5.6 : 1
Yucatán	79	0.7	70	0.7	9	0.4	7.8 : 1
Zacatecas	62	0.5	51	0.5	11	0.5	4.6 : 1
Zamora	67	0.6	50	0.5	17	0.8	2.9 : 1
Zapopan Kena Moreno	13	0.1	7	0.1	6	0.3	1.2 : 1
Zapopan Norte	177	1.5	140	1.5	37	1.7	3.8 : 1
UH Cd. Juárez	24	0.2	16	0.2	8	0.4	2.0 : 1
UH Culiacán	23	0.2	23	0.2	0	0.0	---
UH Ixbalanqué	10	0.1	9	0.1	1	0.0	9.0 : 1
UH Nuevo León	76	0.7	57	0.6	19	0.9	3.0 : 1
UH Punta Diamante	27	0.2	23	0.2	4	0.2	5.8 : 1
UH Tijuana	50	0.4	41	0.4	9	0.4	4.6 : 1
UH Zapopan	21	0.2	19	0.2	2	0.1	9.5 : 1
UH Zapotlán el Grande	22	0.2	22	0.2	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	22	0.2	18	0.2	4	0.2	4.5 : 1
UTUH Tijuana	26	0.2	23	0.2	3	0.1	7.7 : 1
Total	11,596	100.0	9,428	100.0	2,168	100.0	4.3 : 1

UH=Unidad de Hospitalización
UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Cuadro 2. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	9,428	81.3	
Mujeres	2,168	18.7	4.3 : 1
Total	11,596	100.0	

Cuadro 3. Persona que proporciona la información

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Usuario de drogas	5,910	51.0	4,805	51.0	1,105	51.0
Usuario de drogas y familiares u otras personas	5,686	49.0	4,623	49.0	1,063	49.0
Total	11,596	100.0	9,428	100.0	2,168	100.0

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,463	12.6	12.6	1,106	11.7	11.7	357	16.5	16.5
15 a 19 años	4,220	36.4	36.4	3,375	35.8	35.8	845	39.0	39.0
20 a 24 años	1,836	15.8	15.8	1,503	15.9	15.9	333	15.4	15.4
25 a 29 años	1,320	11.4	11.4	1,086	11.5	11.5	234	10.8	10.8
30 a 34 años	897	7.7	7.7	752	8.0	8.0	145	6.7	6.7
35 a 39 años	664	5.7	5.7	566	6.0	6.0	98	4.5	4.5
40 a 44 años	478	4.1	4.1	420	4.5	4.5	58	2.7	2.7
45 años y más	715	6.2	6.2	617	6.5	6.5	98	4.5	4.5
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0
Media (DE)	23.8 (10.8) años			24.2 (10.9) años			22.2 (10.0) años		
Mediana	20 años			20 años			18 años		
Moda	16 años			16 años			15 años		
Decil1	14 años			14 años			14 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,130	70.1	70.3	6,572	69.7	69.9	1,558	71.9	72.0
Casado	1,100	9.5	9.5	978	10.4	10.4	122	5.6	5.6
Unión libre	1,438	12.4	12.4	1,166	12.4	12.4	272	12.5	12.6
Separado	684	5.9	5.9	541	5.7	5.8	143	6.6	6.6
Divorciado	167	1.4	1.4	119	1.3	1.3	48	2.2	2.2
Viudo	46	0.4	0.4	24	0.3	0.3	22	1.0	1.0
<i>Sin información</i>	31	0.3	<i>Se omite</i>	28	0.3	<i>Se omite</i>	3	0.1	<i>Se omite</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	45	0.4	0.4	37	0.4	0.4	8	0.4	0.4
Ninguna (sabe leer y escribir)	28	0.2	0.2	27	0.3	0.3	1	0.0	0.0
Primaria incompleta	276	2.4	2.4	210	2.2	2.2	66	3.0	3.0
Primaria completa	475	4.1	4.1	392	4.2	4.2	83	3.8	3.8
Secundaria incompleta	2,662	23.0	23.0	2,118	22.5	22.5	544	25.1	25.1
Secundaria completa	1,939	16.7	16.7	1,638	17.4	17.4	301	13.9	13.9
Estudios técnicos o comerciales incompletos	159	1.4	1.4	133	1.4	1.4	26	1.2	1.2
Estudios técnicos o comerciales completos	110	0.9	0.9	75	0.8	0.8	35	1.6	1.6
Bachillerato incompleto	3,413	29.4	29.4	2,795	29.6	29.7	618	28.5	28.5
Bachillerato completo	1,079	9.3	9.3	901	9.6	9.6	178	8.2	8.2
Estudios superiores incompletos	944	8.1	8.1	752	8.0	8.0	192	8.9	8.9
Estudios superiores completos	404	3.5	3.5	310	3.3	3.3	94	4.3	4.3
Estudios de posgrado incompletos	22	0.2	0.2	15	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Estudios de posgrado completos	35	0.3	0.3	21	0.2	0.2	14	0.6	0.6
<i>Sin información</i>	5	0.0	<i>Se omite</i>	4	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,513	21.7	21.7	2,075	22.0	22.0	438	20.2	20.2
Estudiante	3,704	31.9	32.0	2,854	30.3	30.3	850	39.2	39.2
Estudiante que trabaja	660	5.7	5.7	564	6.0	6.0	96	4.4	4.4
Trabaja	4,254	36.7	36.7	3,778	40.1	40.1	476	22.0	22.0
Tareas del hogar	393	3.4	3.4	95	1.0	1.0	298	13.7	13.8
Pensionado	64	0.6	0.6	56	0.6	0.6	8	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0

Cuadro 8. Estrato social

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	39	0.3	0.3	31	0.3	0.3	8	0.4	0.4
Medio alto	459	4.0	4.0	377	4.0	4.0	82	3.8	3.8
Medio	2,462	21.2	21.3	1,967	20.9	20.9	495	22.8	22.9
Medio bajo	5,858	50.5	50.6	4,780	50.7	50.8	1,078	49.7	49.8
Bajo	2,686	23.2	23.2	2,200	23.3	23.4	486	22.4	22.4
Pobreza extrema o marginación	75	0.6	0.6	58	0.6	0.6	17	0.8	0.8
<i>Sin información</i>	17	0.1	<i>Se omite</i>	15	0.2	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019

Cuadro 9. Motivos de consulta

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	10,223	88.2	8,380	88.9	1,843	85.0
Consumo de bebidas alcohólicas	4,890	42.2	3,994	42.4	896	41.3
Consumo de tabaco	4,232	36.5	3,457	36.7	775	35.7
Otro motivo	602	5.2	459	4.9	143	6.6
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	15	0.1	12	0.1	3	0.1
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	5,323	45.9	4,361	46.3	962	44.4

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	5,081	43.8	4,132	43.8	949	43.8
Por condicionamiento o recomendación familiar	5,118	44.1	4,217	44.7	901	41.6
Por recomendación de pares	163	1.4	126	1.3	37	1.7
Por condicionamiento o recomendación escolar	2,170	18.7	1,752	18.6	418	19.3
Por condicionamiento legal	985	8.5	805	8.5	180	8.3
Por condicionamiento o recomendación laboral	247	2.1	233	2.5	14	0.6
Por indicación médica	1,175	10.1	936	9.9	239	11.0
Por solicitud de novia(o)	50	0.4	45	0.5	5	0.2
Otros condicionantes de solicitud de tratamiento	282	2.4	199	2.1	83	3.8
<i>Ningún condicionante reportado</i>	191	1.6	160	1.7	31	1.4
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	3,379	29.1	2,772	29.4	607	28.0

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	764	6.6	668	7.1	96	4.4
Grupo de autoayuda	838	7.2	720	7.6	118	5.4
Internamiento en anexo	1,412	12.2	1,215	12.9	197	9.1
Intervención de emergencia	111	1.0	94	1.0	17	0.8
Programa de mantenimiento	94	0.8	72	0.8	22	1.0
Tratamiento médico no especializado	110	0.9	92	1.0	18	0.8
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	787	6.8	619	6.6	168	7.7
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	271	2.3	228	2.4	43	2.0
Medicina tradicional o alternativa	63	0.5	48	0.5	15	0.7
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,700	31.9	3,072	32.6	628	29.0
Otras acciones	2,713	23.4	2,175	23.1	538	24.8
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>2,942</i>	<i>25.4</i>	<i>2,329</i>	<i>24.7</i>	<i>613</i>	<i>28.3</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,541</i>	<i>13.3</i>	<i>1,321</i>	<i>14.0</i>	<i>220</i>	<i>10.1</i>

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	5,279	45.5	4,271	45.3	1,008	46.5
Accidentes o lesiones	1,584	13.7	1,329	14.1	255	11.8
Problemas familiares	9,067	78.2	7,396	78.4	1,671	77.1
Problemas escolares	4,284	36.9	3,448	36.6	836	38.6
Problemas laborales	2,940	25.4	2,613	27.7	327	15.1
Problemas psicológicos	5,246	45.2	4,165	44.2	1,081	49.9
Problemas legales	2,189	18.9	1,920	20.4	269	12.4
Conducta antisocial o delictiva	1,602	13.8	1,382	14.7	220	10.1
Otros problemas	590	5.1	459	4.9	131	6.0
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>555</i>	<i>4.8</i>	<i>437</i>	<i>4.6</i>	<i>118</i>	<i>5.4</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>9,009</i>	<i>77.7</i>	<i>7,378</i>	<i>78.3</i>	<i>1,631</i>	<i>75.2</i>

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	340	2.9	3.4	292	3.1	3.6	48	2.2	2.7
10 a 14 años	4,838	41.7	49.0	3,946	41.9	48.7	892	41.1	50.5
15 a 19 años	4,056	35.0	41.1	3,381	35.9	41.7	675	31.1	38.2
20 a 24 años	427	3.7	4.3	325	3.4	4.0	102	4.7	5.8
25 a 29 años	123	1.1	1.2	95	1.0	1.2	28	1.3	1.6
30 a 34 años	40	0.3	0.4	31	0.3	0.4	9	0.4	0.5
35 a 39 años	17	0.1	0.2	13	0.1	0.2	4	0.2	0.2
40 a 44 años	17	0.1	0.2	10	0.1	0.1	7	0.3	0.4
45 años y más	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
<i>No consumió</i>	<i>1,704</i>	<i>14.7</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,308</i>	<i>13.9</i>	<i>Se omite</i>	<i>396</i>	<i>18.3</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>28</i>	<i>0.2</i>	<i>100.0</i>	<i>21</i>	<i>0.2</i>	<i>100.0</i>	<i>7</i>	<i>0.3</i>	<i>100.0</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0
Media (DE)	14.7 (3.6) años			14.6 (3.5) años			14.9 (4.0) años		
Mediana	14 años			14 años			14 años		
Moda	15 años			15 años			14 años		
Decil1	11 años			11 años			11 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	403	3.5	3.9	336	3.6	4.0	67	3.1	3.6
10 a 14 años	4,460	38.5	43.5	3,605	38.2	43.1	855	39.4	45.6
15 a 19 años	4,902	42.3	47.8	4,062	43.1	48.5	840	38.7	44.8
20 a 24 años	363	3.1	3.5	285	3.0	3.4	78	3.6	4.2
25 a 29 años	83	0.7	0.8	64	0.7	0.8	19	0.9	1.0
30 a 34 años	25	0.2	0.2	16	0.2	0.2	9	0.4	0.5
35 a 39 años	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.1	0.2
40 a 44 años	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.1
45 años y más	5	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.1	0.2
<i>No consumió</i>	<i>1,333</i>	<i>11.5</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,044</i>	<i>11.1</i>	<i>Se omite</i>	<i>289</i>	<i>13.3</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>17</i>	<i>0.1</i>	<i>100.0</i>	<i>13</i>	<i>0.1</i>	<i>100.0</i>	<i>4</i>	<i>0.2</i>	<i>100.0</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0
Media (DE)	14.7 (3.1) años			14.7 (3.0) años			14.8 (3.5) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	134	1.2	1.2	125	1.3	1.3	9	0.4	0.4
10 a 14 años	4,581	39.5	39.7	3,722	39.5	39.6	859	39.6	39.8
15 a 19 años	5,184	44.7	44.9	4,268	45.3	45.4	916	42.3	42.5
20 a 24 años	880	7.6	7.6	696	7.4	7.4	184	8.5	8.5
25 a 29 años	359	3.1	3.1	289	3.1	3.1	70	3.2	3.2
30 a 34 años	196	1.7	1.7	143	1.5	1.5	53	2.4	2.5
35 a 39 años	96	0.8	0.8	70	0.7	0.7	26	1.2	1.2
40 a 44 años	62	0.5	0.5	39	0.4	0.4	23	1.1	1.1
45 años y más	58	0.5	0.5	41	0.4	0.4	17	0.8	0.8
<i>Sin información</i>	46	0.4	<i>Se omite</i>	35	0.4	<i>Se omite</i>	11	0.5	<i>Se omite</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0
Media (DE)	16.3 (5.3) años			16.2 (5.1) años			16.9 (6.2) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio, según menciones

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mariguana	8,597	74.1	7,108	75.4	1,489	68.7
Hachís	9	0.1	9	0.1	0	0.0
Cocaína (Clorhidrato)	897	7.7	741	7.9	156	7.2
<i>Crack</i>	238	2.1	205	2.2	33	1.5
Otra presentación de cocaína	8	0.1	7	0.1	1	0.0
Solventes y removedores	570	4.9	468	5.0	102	4.7
Pegamentos	122	1.1	97	1.0	25	1.2
Esmaltes o pinturas	74	0.6	56	0.6	18	0.8
Otros inhalables	17	0.1	14	0.1	3	0.1
Benzodiazepinas	191	1.6	98	1.0	93	4.3
<i>Rohypnol</i> [®]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otros depresores del SNC	6	0.1	4	0.0	2	0.1
Anfetamina	65	0.6	56	0.6	9	0.4
Metanfetaminas	608	5.2	429	4.6	179	8.3
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	36	0.3	24	0.3	12	0.6
Otros estimulantes del SNC	15	0.1	12	0.1	3	0.1
LSD	25	0.2	19	0.2	6	0.3
Plantas alucinógenas y derivados	14	0.1	13	0.1	1	0.0
Otras drogas alucinógenas y disociativas	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Heroína	19	0.2	17	0.2	2	0.1
Opioides sintéticos	26	0.2	13	0.1	13	0.6
Opio y otros opiáceos	10	0.1	7	0.1	3	0.1
Sustancias con utilidad médica	14	0.1	5	0.1	9	0.4
Otras sustancias de abuso	33	0.3	24	0.3	9	0.4
Total	11,596	100.0	9,428	100.0	2,168	100.0

Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	606	5.2	6.1	470	5.0	5.8	136	6.3	7.7
1 a 5 años	4,238	36.5	43.0	3,374	35.8	41.7	864	39.9	49.0
6 a 10 años	1,752	15.1	17.8	1,440	15.3	17.8	312	14.4	17.7
11 a 15 años	1,117	9.6	11.3	951	10.1	11.7	166	7.7	9.4
16 a 20 años	717	6.2	7.3	600	6.4	7.4	117	5.4	6.6
21 a 25 años	543	4.7	5.5	476	5.0	5.9	67	3.1	3.8
26 o más años	891	7.7	9.0	788	8.4	9.7	103	4.8	5.8
<i>No consumió</i>	<i>1,704</i>	<i>14.7</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,308</i>	<i>13.9</i>	<i>Se omite</i>	<i>396</i>	<i>18.3</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>28</i>	<i>0.2</i>	<i>100.0</i>	<i>21</i>	<i>0.2</i>	<i>100.0</i>	<i>7</i>	<i>0.3</i>	<i>100.0</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0
Media (DE)	9.6 (10.3) años			10.0 (10.5) años			7.8 (9.0) años		
Mediana	6 años			6 años			4 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	651	5.6	6.4	487	5.2	5.8	164	7.6	8.7
1 a 5 años	4,254	36.7	41.5	3,362	35.7	40.2	892	41.1	47.6
6 a 10 años	1,866	16.1	18.2	1,535	16.3	18.3	331	15.3	17.7
11 a 15 años	1,216	10.5	11.9	1,015	10.8	12.1	201	9.3	10.7
16 a 20 años	762	6.6	7.4	645	6.8	7.7	117	5.4	6.2
21 a 25 años	588	5.1	5.7	516	5.5	6.2	72	3.3	3.8
26 o más años	909	7.8	8.9	811	8.6	9.7	98	4.5	5.2
<i>No consumió</i>	<i>1,333</i>	<i>11.5</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,044</i>	<i>11.1</i>	<i>Se omite</i>	<i>289</i>	<i>13.3</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>17</i>	<i>0.1</i>	<i>100.0</i>	<i>13</i>	<i>0.1</i>	<i>100.0</i>	<i>4</i>	<i>0.2</i>	<i>100.0</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0
Media (DE)	9.6 (10.2) años			10.1 (10.4) años			7.7 (8.8) años		
Mediana	6 años			6 años			4 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,643	14.2	14.2	1,220	12.9	13.0	423	19.5	19.6
1 a 5 años	5,157	44.5	44.6	4,095	43.4	43.6	1,062	49.0	49.2
6 a 10 años	1,883	16.2	16.3	1,555	16.5	16.6	328	15.1	15.2
11 a 15 años	1,063	9.2	9.2	906	9.6	9.6	157	7.2	7.3
16 a 20 años	621	5.4	5.4	539	5.7	5.7	82	3.8	3.8
21 a 25 años	503	4.3	4.4	453	4.8	4.8	50	2.3	2.3
26 o más años	680	5.9	5.9	625	6.6	6.7	55	2.5	2.5
<i>Sin información</i>	46	0.4	<i>Se omite</i>	35	0.4	<i>Se omite</i>	11	0.5	<i>Se omite</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0
Media (DE)	7.5 (9.1) años			8.0 (9.5) años			5.3 (7.0) años		
Mediana	4 años			4 años			3 años		
Moda	1 año			1 año			< un año		
Decil1	< un año			< un año			< un año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,156	10.0	10.0	872	9.2	9.3	284	13.1	13.1
Social u ocasional	1,451	12.5	12.6	1,131	12.0	12.0	320	14.8	14.8
Funcional	5,990	51.7	51.8	4,953	52.5	52.7	1,037	47.8	48.0
Disfuncional	2,621	22.6	22.7	2,167	23.0	23.1	454	20.9	21.0
En remisión	338	2.9	2.9	272	2.9	2.9	66	3.0	3.1
<i>Sin información</i>	40	0.3	<i>Se omite</i>	33	0.4	<i>Se omite</i>	7	0.3	<i>Se omite</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	568	4.9	426	4.5	142	6.5
2 sustancias	1,071	9.2	835	8.9	236	10.9
3 sustancias	3,193	27.5	2,574	27.3	619	28.6
4 sustancias	2,308	19.9	1,849	19.6	459	21.2
5 sustancias	1,686	14.5	1,391	14.8	295	13.6
6 sustancias	1,043	9.0	874	9.3	169	7.8
7 sustancias	683	5.9	584	6.2	99	4.6
8 sustancias	439	3.8	373	4.0	66	3.0
9 sustancias	274	2.4	237	2.5	37	1.7
10 sustancias	151	1.3	131	1.4	20	0.9
11-17 sustancias	180	1.6	154	1.6	26	1.2
Total	11,596	100.0	9,428	100.0	2,168	100.0
Media (DE)	4.4 (2.2) drogas		4.4 (2.2) drogas		4.1 (2.0) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,328	37.3	3,433	36.4	895	41.3
2 sustancias	2,638	22.7	2,113	22.4	525	24.2
3 sustancias	1,782	15.4	1,463	15.5	319	14.7
4 sustancias	1,086	9.4	911	9.7	175	8.1
5 sustancias	701	6.0	599	6.4	102	4.7
6 sustancias	441	3.8	376	4.0	65	3.0
7 sustancias	284	2.4	245	2.6	39	1.8
8 sustancias	155	1.3	133	1.4	22	1.0
9 sustancias	87	0.8	76	0.8	11	0.5
10 sustancias	43	0.4	31	0.3	12	0.6
11-15 sustancias	51	0.4	48	0.5	3	0.1
Total	11,596	100.0	9,428	100.0	2,168	100.0
Media (DE)	2.6 (2.0) drogas		2.7 (2.0) drogas		2.4 (1.8) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	9,892	85.3	8,120	86.1	1,772	81.7
Alcohol	10,263	88.5	8,384	88.9	1,879	86.7
Cannabis	10,025	86.5	8,251	87.5	1,774	81.8
Mariguana	10,021	86.4	8,247	87.5	1,774	81.8
Hachís	701	6.0	605	6.4	96	4.4
Cocaína	5,355	46.2	4,525	48.0	830	38.3
Cocaína (Clorhidrato)	4,681	40.4	3,944	41.8	737	34.0
<i>Crack</i>	2,312	19.9	2,040	21.6	272	12.5
Otra presentación de cocaína	119	1.0	102	1.1	17	0.8
Inhalables	2,498	21.5	2,106	22.3	392	18.1
Solventes o removedores	1,874	16.2	1,598	16.9	276	12.7
Pegamentos	641	5.5	552	5.9	89	4.1
Esmaltes o pinturas	343	3.0	264	2.8	79	3.6
Otros inhalables	104	0.9	89	0.9	15	0.7
Depresores	1,774	15.3	1,412	15.0	362	16.7
Benzodiazepinas	1,720	14.8	1,362	14.4	358	16.5
<i>Rohypnol</i>	66	0.6	63	0.7	3	0.1
Otros depresores	34	0.3	27	0.3	7	0.3
Estimulantes	4,657	40.2	3,767	40.0	890	41.1
Anfetamina	253	2.2	210	2.2	43	2.0
Metanfetaminas	4,130	35.6	3,345	35.5	785	36.2
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	754	6.5	591	6.3	163	7.5
Otros estimulantes	63	0.5	55	0.6	8	0.4
Drogas alucinógenas y disociativas	1,579	13.6	1,302	13.8	277	12.8
LSD	1,312	11.3	1,052	11.2	260	12.0
Plantas alucinógenas y derivados	538	4.6	480	5.1	58	2.7
Otras drogas alucinógenas y disoc.	53	0.5	45	0.5	8	0.4
Opiáceos	482	4.2	393	4.2	89	4.1
Heroína	287	2.5	241	2.6	46	2.1
Opioides sintéticos	152	1.3	122	1.3	30	1.4
Opio y otros opiáceos	74	0.6	57	0.6	17	0.8
Otras sustancias de abuso	264	2.3	201	2.1	63	2.9
Con utilidad médica	113	1.0	83	0.9	30	1.4
Otras sustancias de abuso	159	1.4	122	1.3	37	1.7

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	155	1.3	121	1.3	34	1.6
1 sustancia	1,057	9.1	812	8.6	245	11.3
2 sustancias	2,038	17.6	1,609	17.1	429	19.8
3 sustancias	3,467	29.9	2,863	30.4	604	27.9
4 sustancias	2,166	18.7	1,762	18.7	404	18.6
5 sustancias	1,192	10.3	980	10.4	212	9.8
6 sustancias	634	5.5	534	5.7	100	4.6
7 sustancias	371	3.2	310	3.3	61	2.8
8 sustancias	235	2.0	205	2.2	30	1.4
9 sustancias	132	1.1	107	1.1	25	1.2
10 sustancias	67	0.6	55	0.6	12	0.6
11-15 sustancias	82	0.7	70	0.7	12	0.6
Total	11,596	100.0	9,428	100.0	2,168	100.0
Media (DE)	3.6 (1.9) drogas		3.6 (1.9) drogas		3.4 (1.9) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	1 droga		2 drogas		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	857	7.4	684	7.3	173	8.0
1 sustancia	5,122	44.2	4,100	43.5	1,022	47.1
2 sustancias	2,655	22.9	2,189	23.2	466	21.5
3 sustancias	1,351	11.7	1,098	11.6	253	11.7
4 sustancias	682	5.9	572	6.1	110	5.1
5 sustancias	388	3.3	329	3.5	59	2.7
6 sustancias	245	2.1	213	2.3	32	1.5
7 sustancias	143	1.2	115	1.2	28	1.3
8 sustancias	70	0.6	57	0.6	13	0.6
9 sustancias	41	0.4	36	0.4	5	0.2
10 sustancias	19	0.2	14	0.1	5	0.2
11-13 sustancias	23	0.2	21	0.2	2	0.1
Total	11,596	100.0	9,428	100.0	2,168	100.0
Media (DE)	2.0 (1.6) drogas		2.0 (1.7) drogas		1.9 (1.6) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	8,820	76.1	7,245	76.8	1,575	72.6
Alcohol	9,447	81.5	7,735	82.0	1,712	79.0
Cannabis	8,345	72.0	6,884	73.0	1,461	67.4
Mariguana	8,343	71.9	6,882	73.0	1,461	67.4
Hachís	491	4.2	423	4.5	68	3.1
Cocaína	3,901	33.6	3,270	34.7	631	29.1
Cocaína (Clorhidrato)	3,190	27.5	2,649	28.1	541	25.0
<i>Crack</i>	1,688	14.6	1,482	15.7	206	9.5
Otra presentación de cocaína	88	0.8	76	0.8	12	0.6
Inhalables	1,626	14.0	1,347	14.3	279	12.9
Solventes y removedores	1,242	10.7	1,042	11.1	200	9.2
Pegamentos	353	3.0	296	3.1	57	2.6
Esmaltes o pinturas	184	1.6	134	1.4	50	2.3
Otros inhalables	57	0.5	47	0.5	10	0.5
Depresores	1,274	11.0	992	10.5	282	13.0
Benzodiazepinas	1,243	10.7	963	10.2	280	12.9
<i>Rohypnol</i>	25	0.2	24	0.3	1	0.0
Otros depresores	29	0.3	23	0.2	6	0.3
Estimulantes	4,010	34.6	3,242	34.4	768	35.4
Anfetamina	176	1.5	149	1.6	27	1.2
Metanfetaminas	3,639	31.4	2,947	31.3	692	31.9
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	459	4.0	357	3.8	102	4.7
Otros estimulantes	47	0.4	41	0.4	6	0.3
Drogas alucinógenas y disociativas	1,030	8.9	838	8.9	192	8.9
LSD	902	7.8	721	7.6	181	8.3
Plantas alucinógenas y derivados	247	2.1	216	2.3	31	1.4
Otras drogas alucinógenas y disoc.	28	0.2	22	0.2	6	0.3
Opiáceos	360	3.1	292	3.1	68	3.1
Heroína	202	1.7	169	1.8	33	1.5
Opioides sintéticos	124	1.1	100	1.1	24	1.1
Opio y otros opiáceos	52	0.4	39	0.4	13	0.6
Otras sustancias de abuso	197	1.7	149	1.6	48	2.2
Con utilidad médica	81	0.7	59	0.6	22	1.0
Otras sustancias de abuso	122	1.1	92	1.0	30	1.4

Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,137	9.8	10.0	882	9.4	9.5	255	11.8	12.0
Alcohol	1,788	15.4	15.7	1,416	15.0	15.3	372	17.2	17.5
Mariguana	4,748	40.9	41.6	4,033	42.8	43.4	715	33.0	33.7
Hachís	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Cocaína (Clorhidrato)	432	3.7	3.8	356	3.8	3.8	76	3.5	3.6
<i>Crack</i>	530	4.6	4.6	475	5.0	5.1	55	2.5	2.6
Otra presentación de cocaína	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Solventes y removedores	280	2.4	2.5	216	2.3	2.3	64	3.0	3.0
Pegamentos	37	0.3	0.3	27	0.3	0.3	10	0.5	0.5
Esmaltes o pinturas	23	0.2	0.2	15	0.2	0.2	8	0.4	0.4
Otros inhalables	7	0.1	0.1	4	0.0	0.0	3	0.1	0.1
Benzodiazepinas	113	1.0	1.0	73	0.8	0.8	40	1.8	1.9
<i>Rohypno</i> [®]	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores del SNC	8	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Anfetamina	46	0.4	0.4	38	0.4	0.4	8	0.4	0.4
Metanfetaminas	1,836	15.8	16.1	1,430	15.2	15.4	406	18.7	19.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	29	0.3	0.3	25	0.3	0.3	4	0.2	0.2
Otros estimulantes del SNC	17	0.1	0.1	10	0.1	0.1	7	0.3	0.3
LSD	45	0.4	0.4	33	0.4	0.4	12	0.6	0.6
Plantas alucinógenas y derivados	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disociativas.	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Heroína	111	1.0	1.0	97	1.0	1.0	14	0.6	0.7
Opioides sintéticos	29	0.3	0.3	18	0.2	0.2	11	0.5	0.5
Opio y otros opiáceos	6	0.1	0.1	3	0.0	0.0	3	0.1	0.1
Sustancias con utilidad médica	15	0.1	0.1	6	0.1	0.1	9	0.4	0.4
Otras sustancias de abuso	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Ninguna	134	1.2	1.2	92	1.0	1.0	42	1.9	2.0
<i>No consumió en el último año</i>	155	1.3	<i>Se omite</i>	121	1.3	<i>Se omite</i>	34	1.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	33	0.3	100.0	22	0.2	100.0	11	0.5	100.0
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0

Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	655	5.6	5.7	507	5.4	5.5	148	6.8	7.0
Alcohol	1,497	12.9	13.1	1,167	12.4	12.6	330	15.2	15.5
Mariguana	4,156	35.8	36.4	3,514	37.3	37.9	642	29.6	30.2
Hachís	15	0.1	0.1	11	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Cocaína (Clorhidrato)	563	4.9	4.9	466	4.9	5.0	97	4.5	4.6
<i>Crack</i>	702	6.1	6.2	625	6.6	6.7	77	3.6	3.6
Otra presentación de cocaína	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Solventes y removedores	379	3.3	3.3	303	3.2	3.3	76	3.5	3.6
Pegamentos	62	0.5	0.5	50	0.5	0.5	12	0.6	0.6
Esmaltes o pinturas	40	0.3	0.4	29	0.3	0.3	11	0.5	0.5
Otros inhalables	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Benzodiazepinas	182	1.6	1.6	118	1.3	1.3	64	3.0	3.0
<i>Rohypnol</i> [®]	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores del SNC	15	0.1	0.1	12	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Anfetamina	61	0.5	0.5	50	0.5	0.5	11	0.5	0.5
Metanfetaminas	2,615	22.6	22.9	2,090	22.2	22.5	525	24.2	24.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	39	0.3	0.3	30	0.3	0.3	9	0.4	0.4
Otros estimulantes del SNC	22	0.2	0.2	15	0.2	0.2	7	0.3	0.3
LSD	64	0.6	0.6	41	0.4	0.4	23	1.1	1.1
Plantas alucinógenas y derivados	10	0.1	0.1	10	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disociativas	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Heroína	123	1.1	1.1	106	1.1	1.1	17	0.8	0.8
Opioides sintéticos	34	0.3	0.3	24	0.3	0.3	10	0.5	0.5
Opio y otros opiáceos	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Sustancias con utilidad médica	17	0.1	0.1	6	0.1	0.1	11	0.5	0.5
Otras sustancias de abuso	13	0.1	0.1	8	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Ninguna	113	1.0	1.0	79	0.8	0.9	34	1.6	1.6
<i>No consumió en el último año</i>	155	1.3	<i>Se omite</i>	121	1.3	<i>Se omite</i>	34	1.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	34	0.3	100.0	23	0.2	100.0	11	0.5	100.0
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,280	36.9	45.5	3,566	37.8	46.3	714	32.9	42.1
No combinó drogas	5,126	44.2	54.5	4,143	43.9	53.7	983	45.3	57.9
<i>No aplica</i>	<i>2,190</i>	<i>18.9</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,719</i>	<i>18.2</i>	<i>Se omite</i>	<i>471</i>	<i>21.7</i>	<i>Se omite</i>
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,199	10.3	894	9.5	305	14.1
1 sustancia	2,722	23.5	2,158	22.9	564	26.0
2 sustancias	3,134	27.0	2,547	27.0	587	27.1
3 sustancias	2,793	24.1	2,380	25.2	413	19.0
4 sustancias	1,161	10.0	966	10.2	195	9.0
5 sustancias	370	3.2	303	3.2	67	3.1
6 sustancias	141	1.2	120	1.3	21	1.0
7 sustancias	51	0.4	39	0.4	12	0.6
8 sustancias	17	0.1	14	0.1	3	0.1
9 sustancias	5	0.0	4	0.0	1	0.0
10 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
11 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	11,596	100.0	9,428	100.0	2,168	100.0
Media (DE)	2.2 (1.4) drogas		2.2 (1.4) drogas		2.0 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Decil1	Ninguna		1 droga		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,487	30.1	2,711	28.8	776	35.8
1 sustancia	5,489	47.3	4,530	48.0	959	44.2
2 sustancias	1,834	15.8	1,548	16.4	286	13.2
3 sustancias	520	4.5	415	4.4	105	4.8
4 sustancias	176	1.5	152	1.6	24	1.1
5 sustancias	56	0.5	47	0.5	9	0.4
6 sustancias	25	0.2	18	0.2	7	0.3
7 sustancias	6	0.1	4	0.0	2	0.1
8 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	11,596	100.0	9,428	100.0	2,168	100.0
Media (DE)	1.0 (1.0) droga		1.0 (1.0) droga		0.9 (1.0) droga	
Mediana	1 droga		1 droga		1 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 drogas	
Decil1	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,894	59.5	5,707	60.5	1,187	54.8
Alcohol	6,466	55.8	5,361	56.9	1,105	51.0
Cannabis	5,559	47.9	4,683	49.7	876	40.4
Mariguana	5,555	47.9	4,680	49.6	875	40.4
Hachís	116	1.0	100	1.1	16	0.7
Cocaína	1,759	15.2	1,486	15.8	273	12.6
Cocaína (Clorhidrato)	1,128	9.7	926	9.8	202	9.3
<i>Crack</i>	849	7.3	753	8.0	96	4.4
Otra presentación de cocaína	28	0.2	25	0.3	3	0.1
Inhalables	674	5.8	547	5.8	127	5.9
Solventes y removedores	524	4.5	430	4.6	94	4.3
Pegamentos	109	0.9	88	0.9	21	1.0
Esmaltes o pinturas	63	0.5	50	0.5	13	0.6
Otros inhalables	8	0.1	4	0.0	4	0.2
Depresores	591	5.1	448	4.8	143	6.6
Benzodiazepinas	583	5.0	440	4.7	143	6.6
<i>Rohypnol</i>	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Otros depresores	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Estimulantes	2,368	20.4	1,922	20.4	446	20.6
Anfetamina	60	0.5	51	0.5	9	0.4
Metanfetaminas	2,246	19.4	1,827	19.4	419	19.3
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	88	0.8	68	0.7	20	0.9
Otros estimulantes	15	0.1	11	0.1	4	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	224	1.9	166	1.8	58	2.7
LSD	203	1.8	148	1.6	55	2.5
Plantas alucinógenas y derivados	21	0.2	19	0.2	2	0.1
Otras drogas alucinógenas y disoc.	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Opiáceos	192	1.7	159	1.7	33	1.5
Heroína	129	1.1	111	1.2	18	0.8
Opioides sintéticos	59	0.5	47	0.5	12	0.6
Opio y otros opiáceos	13	0.1	9	0.1	4	0.2
Otras sustancias de abuso	101	0.9	73	0.8	28	1.3
Con utilidad médica	43	0.4	30	0.3	13	0.6
Otras sustancias de abuso	60	0.5	44	0.5	16	0.7

Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	1,911	16.5	28.2	1,575	16.7	28.1	336	15.5	28.9
< de 1 vez a la semana	890	7.7	13.1	708	7.5	12.6	182	8.4	15.6
1 o 2 veces a la semana	773	6.7	11.4	638	6.8	11.4	135	6.2	11.6
Cada tercer día	470	4.1	6.9	390	4.1	7.0	80	3.7	6.9
Diario	2,727	23.5	40.3	2,296	24.4	40.9	431	19.9	37.0
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	4,702	40.5	<i>Se omite</i>	3,721	39.5	<i>Se omite</i>	981	45.2	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	123	1.1	100.0	100	1.1	100.0	23	1.1	100.0
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	1,191	10.3	18.8	961	10.2	18.3	230	10.6	21.2
< de 1 vez a la semana	2,315	20.0	36.5	1,909	20.2	36.3	406	18.7	37.5
1 o 2 veces a la semana	1,874	16.2	29.5	1,577	16.7	30.0	297	13.7	27.4
Cada tercer día	519	4.5	8.2	435	4.6	8.3	84	3.9	7.8
Diario	443	3.8	7.0	377	4.0	7.2	66	3.0	6.1
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	5,130	44.2	<i>Se omite</i>	4,067	43.1	<i>Se omite</i>	1,063	49.0	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	124	1.1	100.0	102	1.1	100.0	22	1.0	100.0
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,556	13.4	23.3	1,211	12.8	21.8	345	15.9	30.7
1 o 2 veces a la semana	1,350	11.6	20.2	1,151	12.2	20.7	199	9.2	17.7
Cada tercer día	1,093	9.4	16.4	937	9.9	16.9	156	7.2	13.9
Diario	2,680	23.1	40.1	2,258	23.9	40.6	422	19.5	37.6
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	3,487	30.1	<i>Se omite</i>	2,711	28.8	<i>Se omite</i>	776	35.8	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	1,430	12.3	100.0	1,160	12.3	100.0	270	12.5	100.0
Total	11,596	100.0	100.0	9,428	100.0	100.0	2,168	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

GLOSARIO

Droga ilícita de inicio	<p>Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.</p>
Droga de mayor impacto	<p>Sustancia por la que acuden los pacientes a tratamiento, a cuyo consumo los pacientes atribuyen problemas personales, de salud, familiares, escolares, laborales o sociales, en el transcurso del último año.</p>
Droga de preferencia	<p>Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.</p>
Estrato social	<p>Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.</p>
Tipo de consumo de drogas ilícitas	<p>Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.</p>
Total de drogas consumidas	<p>Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.</p>
Uso combinado de drogas	<p>Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.</p>