



**Centros de
Integración
Juvenil, A.C.**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL
CONSUMO DE DROGAS**

**CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES
DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE
INTEGRACIÓN JUVENIL**

DROGAS ILÍCITAS

PRIMER SEMESTRE DE 2020

Alma Delia Gutiérrez López

Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
México, septiembre del 2020

Informe de Investigación 20-09a

SIECD



DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Mtra. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

JEFE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA

Dr. Valeriano Raúl García Aurrecoechea

CONTENIDO	PÁG.
RESUMEN	4
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
RESULTADOS	8
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	28
GLOSARIO	52

ÍNDICE DE CUADROS		PÁG.
Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	29
Cuadro 2	Sexo	32
Cuadro 3	Persona que proporciona la información	32
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	32
Cuadro 5	Estado civil	33
Cuadro 6	Escolaridad	33
Cuadro 7	Ocupación	34
Cuadro 8	Estrato social	34
Cuadro 9	Motivos de consulta	35
Cuadro 10	Condicionantes de la solicitud de tratamiento	35
Cuadro 11	Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	36
Cuadro 12	Problemas asociados al consumo de sustancias	36
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de tabaco	37
Cuadro 14	Edad de inicio del consumo de alcohol	37
Cuadro 15	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	38
Cuadro 16	Drogas ilícitas de inicio según menciones	39
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 18	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 19	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	41
Cuadro 20	Tipo de consumo de drogas ilícitas	41
Cuadro 21	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	42
Cuadro 22	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	42
Cuadro 23	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	43
Cuadro 24	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	44
Cuadro 25	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	44
Cuadro 26	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	45
Cuadro 27	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 28	Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	47
Cuadro 29	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	48
Cuadro 30	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	48
Cuadro 31	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	49
Cuadro 32	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	50
Cuadro 33	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	51
Cuadro 34	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	51
Cuadro 35	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	51

RESUMEN

El presente informe se realizó con base en 8,567 registros clínicos de la entrevista inicial realizada a personas que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento por el consumo de drogas a Centros de Integración Juvenil (CIJ) entre enero y junio de 2020.

Los objetivos del estudio son: a) actualizar información de los solicitantes de tratamiento en cuanto al perfil sociodemográfico, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de sustancias; b) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas c) contribuir con los sistemas nacionales de información del consumo de drogas y d) generar información que oriente el desarrollo de estudios sobre el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias en México.

Los datos que se presentan revelan que el uso de drogas ilícitas sigue siendo un problema que afecta mayormente a la población masculina, en una proporción de cuatro hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 24.7 años. En promedio, los hombres y las mujeres ingresaron a tratamiento prácticamente a la misma edad (24.8 y 24.6 años, respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco y de alcohol fue a los 14.9 años y la de drogas ilícitas a los 16.7 años. Los hombres inician el consumo de tabaco (14.7 años), alcohol (14.8 años) y drogas ilícitas (16.4 años) de manera más temprana que las mujeres (tabaco: 15.3 años; alcohol: 15.5 años y drogas ilícitas, 18.0 años).

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (89.0%), cannabis (84.8%), tabaco (84.8%), cocaína/crack (48.5%), estimulantes (47.9%; principalmente metanfetaminas: 43.8% y éxtasis: 7.5%), inhalables (21.1%), depresores (16.9%), drogas alucinógenas y disociativas (14.8%) y opiáceos (4.2%, principalmente heroína: 2.3%). Las sustancias más utilizadas el mes previo al ingreso a tratamiento fueron: tabaco (60.9%), alcohol (55.8%), cannabis (44.9%), metanfetaminas (25.4%), cocaína/crack (15.2%), benzodiazepinas (5.7%) y inhalables (5.6%). Las sustancias reportadas como de mayor impacto fueron: marihuana (30.8%), metanfetaminas (30.2%), alcohol (13.2%), crack (5.7%), cocaína en polvo (5.4%) y tabaco (5.1%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los consultantes acudieron principalmente por recomendación de la familia (48.8%) o por iniciativa propia (48.4%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (88.2%), alcohol (42.2%) o tabaco (35.3%). Previo a su ingreso a tratamiento en CIJ, 31.5% de los solicitantes intentaron interrumpir el uso de sustancias de manera voluntaria y sin apoyo, mientras que 22.6% no habían realizado alguna acción para dejar el consumo. Los problemas asociados al consumo de drogas reportados con mayor frecuencia fueron los del ámbito familiar (81.2%), psicológicos (51.6%), de salud (49.1%), escolares (29.9%) y laborales (28.4%).

ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976¹. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso². Sin embargo, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática³. Posteriormente, se implementa el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha consolidado a través de los años y realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen en la toma de decisiones de los servicios institucionales. Además, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del uso de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)⁴ de la Secretaría de Salud, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente Muñiz*” (INPRF)⁵– y el Observatorio Mexicano de Drogas a cargo de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría Salud⁶.

El SIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, incluyendo el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo⁷, uso de drogas en mujeres⁸, población infantil⁹ o de acuerdo con las etapas de la vida¹⁰ y estudios de tendencias^{11,12,13,14}. Esta información permite enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que sustenta el diseño de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides^{15,16}.

La información reportada a través del sistema ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el 2006, el SIECD genera un informe de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol¹⁷, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores¹⁸; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática¹⁹ y que ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes²⁰.

Cabe destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales^{21,22,23} y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de

investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*²⁴ realizados por los CIJ a lo largo del país.

El presente informe se elaboró con base en información obtenida por el SIECD durante el segundo semestre del 2019 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: Censo, descriptivo, semestral.

Población: 8,567 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 106 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2020 (cuadro 1. Anexo).

Fuente de información: Formato de Entrevista Inicial aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 9 de julio de 2020 a las 11:24 hrs., con 8,498 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (69 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ) utilizado por el CIJ La Piedad.

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, droga ilícita de inicio, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en

los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta agrupada en 26 categorías de drogas y en algunos casos (consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes) se proporciona además información concentrada en diez grupos:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas (<i>crystal</i> o <i>ICE</i>), MDMA (<i>éxtasis</i>) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, Opioides sintéticos y opio y otros opiáceos
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

Procesamiento de datos. Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS^a

Sexo. La población se conformó por 6,864 hombres y 1,703 mujeres, lo cual representa 80.1% y 19.9%, respectivamente. Es decir, 4.0 hombres solicitan tratamiento en CIJ por cada mujer.

Persona que proporciona la información. 45.2% de los casos acudieron en compañía de familiares u otras personas. Los hombres llegan acompañados en mayor proporción que las mujeres (hombres: 46.4% y mujeres: 40.6%).

Edad de ingreso a tratamiento. Se observa un rango de edad de 7 a 77 años, con un promedio de 24.7 años (DE= 10.5 años); es decir, 6,893 de los usuarios de drogas tenía entre los 14 y 35 años de edad (alrededor del 80% de las personas atendidas); la edad mediana de la población fue de 22 años (31.6% de los casos fueron menores de edad; 2,706 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 17 años (662 casos atendidos).


Figura 1. Edad de ingreso según sexo

	 Años	 Años	No se observa gran diferencia entre los hombres y mujeres que solicitaron tratamiento en este periodo.
Rango	7 a 77	12 a 75	
Promedio (Desviación estándar)	24.8 (10.4)	24.6 (11.1)	
Mediana	22	21	
Moda	17	16	
Decil₁	15	14	

^a Cfr., Cuadros 1 a 8.


Estado civil. La mayor parte de la población refirió ser soltera (66.9%), mientras que 13.6% indicó que vivía en unión libre y 10.4% estaba casada.

Figura 2. Estado civil según sexo



Escolaridad. En términos generales, 37.5% había cursado al menos algún grado de educación secundaria, 37.6% algún grado de bachillerato, 14.6% tenía estudios superiores y 6.6% solo había cursado la primaria.


Figura 3. Escolaridad según sexo



Las mujeres cuentan, en mayor proporción que los hombres, con estudios superiores.


Ocupación. 38.8% desempeñaba alguna actividad laboral, 24.9% reportó ser estudiante y 26.3% estaba desempleado.

Figura 4. Principal ocupación según sexo



Estrato social. De acuerdo con la percepción de los terapeutas, la mitad de los pacientes (49.3%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 23.7% en un nivel bajo y 22.2% fue clasificado en el estrato medio.


Figura 5. Estrato social según sexo



FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO^b


Motivos de consulta. 44.7% de las personas atendidas reportaron más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.4% no expresó ninguno. 88.2% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 42.2% por uso de bebidas alcohólicas y 35.3% por uso de tabaco.

Figura 6. Motivos de consulta según sexo



Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 28.4% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 48.8% acudió por recomendación de la familia, 48.4% por iniciativa propia, 11.6% por condicionamiento o recomendación escolar, 8.8% por indicación médica y 6.4 % por condicionamiento legal.


Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo



^b Cfr. Cuadros 9 a 12.

Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. 31.5% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir voluntariamente el consumo sin otro tipo de apoyo, 14.7% señaló que había estado internado en algún anexo, 7.9% había acudido a algún grupo de ayuda mutua, 7.6% con tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico de tipo ambulatorio y 6.7% lo había hecho a través de juramento. Cabe señalar que 13.8% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 22.6% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo



Mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas para dejar el consumo de drogas o habían acudido a tratamientos psiquiátricos o psicoterapéuticos ambulatorios, mientras que los hombres en mayor proporción que las mujeres intentaron dejarlo de manera voluntaria, se internaron en algún anexo, participaron en grupos de ayuda mutua o por medio de juramento.

Problemas asociados al consumo de sustancias. 81.2% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 51.6% psicológicos, 49.1% de salud, 29.9% escolares, 28.4% laborales, 17.4% legales, 14.0% de conducta antisocial o delictiva y 14.8% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 79.7% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.6% no reportó ninguno.

Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo



Los problemas familiares son los más frecuentemente relacionados al consumo de drogas entre hombres y mujeres.

Sin embargo, las mujeres reportaron en mayor proporción que los hombres problemas psicológicos, mientras que los hombres rebasan el porcentaje de mujeres, al referir problemas de tipo laboral, legal, conducta antisocial y accidentes o lesiones.

CONSUMO DE DROGAS^c

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.9 años (DE =3.8 años), con una mediana y una moda de 15 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.9 años (DE =3.3 años) con una mediana y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio del uso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 16.7 años (DE =5.8 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas aparece antes de cumplir los 13 años (decil=12 años).

Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	14.7 (3.5)	14.8 (3.1)	16.4 (5.3)	15.5 (4.8)	15.3 (4.1)	18.0 (7.6)
Mediana	14	15	15	15	15	16
Moda	15	15	15	15	15	15
Decil₁	11	12	12	12	12	13


En cuanto a la edad de inicio del consumo de sustancias, las mujeres iniciaron el consumo un poco después que los hombres.

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias de inicio más reportadas fueron: marihuana (72.0%); cocaína (10.6%), tanto en forma de polvo blanco (8.6%) como crack (2.0%); estimulantes (7.8%), donde destacan las metanfetaminas (6.9%); seguidos por los inhalables (6.2%), mayormente en forma de solventes y removedores (4.8%); los

^c Cfr., Cuadros 13 a 35

depresores con utilidad médica como las benzodiacepinas (2.0%); y los opiáceos (0.4%), entre los cuales sobresalen los opioides sintéticos (18 casos) y la heroína (14 casos).

Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo



Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco, 10.2 años (DE=9.8 años), alcohol 10.2 años (DE=9.7 años) y drogas ilícitas 8.0 años (DE =8.7 años).

Cabe señalar que la mitad de los usuarios de alcohol y la mitad de los usuarios de tabaco dejaron pasar siete años desde que iniciaron el consumo hasta que acudieron a solicitar tratamiento; en tanto que los usuarios de drogas dejaron pasar cinco años.


Figura 12. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	10.4 (9.9)	10.5 (9.8)	8.4 (8.8)	9.3 (9.8)	9.2 (9.4)	6.5 (8.0)
Mediana	7	7	5	6	6	3
Moda	1	1	1	1	1	1
Decil₁	1	1	1	1	1	< un año

Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, 55.3% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 23.5% con consumo disfuncional, 10.7% con consumo social u ocasional, 7.4% con consumo experimental y 3.1% presentaba remisión del consumo.

Figura 13. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo




El patrón de consumo funcional y disfuncional es mayor en los hombres, mientras que, en comparación con los hombres, una mayor proporción de mujeres reporta el consumo de tipo ocasional y experimental.

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.5 drogas (95.8% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.6 drogas (90.1% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.2 drogas (68.4% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.8 drogas (66.9% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 2.0 drogas (50.9% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.1 droga (24.5% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 14. Promedio de drogas consumidas según sexo




Mujeres y hombres han consumido prácticamente el mismo número de sustancias.

Consumo de drogas alguna vez en la vida.^d Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias en seguimiento fueron: alcohol (89.0%), *cannabis* (84.8%), tabaco (84.8%), cocaína (48.5%), estimulantes (47.9%), inhalables (21.1%), depresores (16.9%), drogas alucinógenas y disociativas (14.8%), opiáceos (4.2%) y otras sustancias de abuso (1.8%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (84.8%), metanfetaminas (43.8%), cocaína en polvo (43.2%), *crack* (19.9%), benzodiazepinas (16.4%), solventes y removedores (16.0%) y LSD (12.3%); en menor proporción se reportó el consumo de éxtasis y otras metanfetaminas alucinógenas (7.5%), hachís (5.6%), pegamentos (5.3%) y plantas alucinógenas y derivados (5.1%).

Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo




En general, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de drogas; Pero ellas reportaron en mayor proporción que los hombres el consumo de benzodiazepinas y éxtasis.

^d Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 98.4% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (81.1%), tabaco (75.6%), cannabis (69.0%), estimulantes (41.8%), cocaína (32.9%), inhalables (13.0%), depresores (11.8%), drogas alucinógenas y disociativas (9.0%); opiáceos (2.9%) y otras sustancias de abuso (1.3%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores, destacaron: marihuana (68.9%), metanfetaminas (38.8%), cocaína en polvo (27.2%), crack (13.8%), benzodiacepinas (11.5%) y solventes y removedores (10.2%) y LSD (7.8%).


Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y marihuana; las mujeres usaron en mayor proporción que los hombres: éxtasis y benzodiacepinas.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: mariguana (37.7%), metanfetaminas (21.9%), alcohol (15.3%) y tabaco (8.9%).

Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo




Los hombres reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el uso de mariguana, cocaína en polvo, y crack; mientras que en las mujeres la preferencia fue mayor que en los hombres por el tabaco, alcohol, inhalables, metanfetaminas, benzodiazepinas y alucinógenos.

No obstante, cabe resaltar que la mariguana y las metanfetaminas son las drogas preferidas tanto por hombres como por mujeres.

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses. Las principales sustancias reportadas por los pacientes a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: mariguana (30.8%), metanfetaminas (30.2%) y alcohol (13.2%); en menor medida se mencionó al crack (5.7%), cocaína en polvo (5.4%) y tabaco (5.1%).

Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo




Los hombres acuden a tratamiento principalmente por el consumo de marihuana y las mujeres por el consumo de metanfetaminas.

Ellos acuden en mayor proporción que las mujeres por los efectos asociados al consumo de marihuana, crack y cocaína en polvo; mientras que ellas por los del uso de tabaco, alcohol, metanfetaminas, benzodiacepinas, inhalables y alucinógenos.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.^e Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, casi la mitad de la población (49.0%) reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo



Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el uso de dos o más sustancias (no se incluye el consumo de tabaco) en un mismo día.


^e No se toman en cuenta 1,597 casos (18.6%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 17.8% de los hombres y 21.8% de las mujeres (ver anexo, cuadro 29).

Consumo de drogas en los últimos 30 días. Incluyendo alcohol y tabaco, 89.60% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las prevalencias de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (60.9%), alcohol (55.8%), cannabis (44.9%), estimulantes (26.6%), cocaína (15.2%), depresores (5.8%), inhalables (5.6%), drogas alucinógenas y disociativas (1.8%), opiáceos (1.4%) y otras sustancias de abuso (0.7%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 44.9%, seguida de metanfetaminas (25.4%), cocaína (10.2%), crack (6.8%), benzodiacepinas (5.7%) y solventes/removedores (4.6%); en menor proporción se registró el consumo de LSD (1.6%) y éxtasis (1.2%).


Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo



Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol, marihuana y metanfetaminas—los hombres en mayor proporción—. Las mujeres reportaron mayor consumo de benzodiacepinas, alucinógenos y heroína.

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 43.4% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Asimismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (36.5) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana o una o dos veces a la semana (29.6%). Por otra parte, 42.9% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 20.4% menos de una vez a la semana, 19.9% una a dos veces a la semana y 16.8% cada tercer día.

Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



En general, los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso de drogas ilícitas, tabaco y alcohol que las mujeres.

REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado de http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/info_sisvea/informes_sisvea_2006.pdf
5. Ortiz A, Martínez R., Meza D. (2019). Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 63, Noviembre de 2017. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México. Recuperado de http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep_63_pdf.pdf
6. Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019). *Observatorio Mexicano de Drogas*. Recuperado de <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/observatorio-mexicano-de-drogas-omd>
7. García-Aurrecoechea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Díaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de*

- estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007.* México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
8. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. Recuperado de <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
 9. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 10. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 11. García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
 12. Gutiérrez López, AD. (2020). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 2° semestre de 2019. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 20-08e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/20-08e.pdf>
 13. Gutiérrez, A. D. (2020). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 2° semestre de 2019. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 20-08f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/20-08f.pdf>
 14. Gutiérrez, A. D. (2020). *Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 2° semestre de 2019. (Nivel nacional y entidades*

- federativas*) [Informe de Investigación 20-08g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/20-08g.pdf>
15. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 16. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 17. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
 18. Velázquez, M.; Gutiérrez, A. D. (2020). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Tabaco y alcohol. Segundo semestre del 2018.* (Informe de Investigación 20-08d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/20-08d.pdf>
 19. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.* México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
 20. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
 21. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y

- Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
22. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
23. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas*. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
24. Centros de Integración Juvenil, A.C. (2019). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2018*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/Index.html>

Cuadros

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2020

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTH)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	45	0.5	33	0.5	12	0.7	2.8:1
Álvaro Obregón Oriente	38	0.4	30	0.4	8	0.5	3.8:1
Atizapán	84	1.0	67	1.0	17	1.0	3.9:1
Azcapotzalco	86	1.0	70	1.0	16	0.9	4.4:1
Benito Juárez	61	0.7	51	0.7	10	0.6	5.1:1
Chalco	105	1.2	87	1.3	18	1.1	4.8:1
Coyoacán	109	1.3	88	1.3	21	1.2	4.2:1
Cuajimalpa	48	0.6	37	0.5	11	0.6	3.4:1
Cuauhtémoc Oriente	70	0.8	54	0.8	16	0.9	3.4:1
Cuauhtémoc Poniente	98	1.1	72	1.0	26	1.5	2.8:1
Ecatepec	132	1.5	109	1.6	23	1.4	4.7:1
Gustavo A. Madero Aragón	159	1.9	136	2.0	23	1.4	5.9:1
Gustavo A. Madero Norte	102	1.2	86	1.3	16	0.9	5.4:1
Gustavo A. Madero Oriente	13	0.2	12	0.2	1	0.1	12.0:1
Iztapalapa Oriente	292	3.4	250	3.6	42	2.5	6.0:1
Iztapalapa Poniente	54	0.6	43	0.6	11	0.6	3.9:1
Miguel Hidalgo	72	0.8	55	0.8	17	1.0	3.2:1
Naucalpan	81	0.9	68	1.0	13	0.8	5.2:1
Nezahualcóyotl	200	2.3	171	2.5	29	1.7	5.9:1
Texcoco	75	0.9	66	1.0	9	0.5	7.3:1
Tlalnepantla	170	2.0	138	2.0	32	1.9	4.3:1
Tlalpan	146	1.7	128	1.9	18	1.1	7.1:1
Venustiano Carranza	89	1.0	71	1.0	18	1.1	3.9:1
UH Ecatepec	22	0.3	21	0.3	1	0.1	21.0:1
UH Iztapalapa	55	0.6	43	0.6	12	0.7	3.6:1
UH Naucalpan	19	0.2	15	0.2	4	0.2	3.8:1
Acapulco	117	1.4	92	1.3	25	1.5	3.7:1
Aguascalientes	180	2.1	139	2.0	41	2.4	3.4:1
Cancún	43	0.5	33	0.5	10	0.6	3.3:1
Cd. del Carmen	34	0.4	25	0.4	9	0.5	2.8:1
Cd. Juárez Norte	89	1.0	65	0.9	24	1.4	2.7:1
Cd. Victoria	18	0.2	12	0.2	6	0.4	2.0:1
Celaya	166	1.9	137	2.0	29	1.7	4.7:1
Chetumal	31	0.4	24	0.3	7	0.4	3.4:1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chihuahua	209	2.4	162	2.4	47	2.8	3.4:1
Chilpancingo	52	0.6	35	0.5	17	1.0	2.1:1
Colima	100	1.2	83	1.2	17	1.0	4.9:1
Cozumel	37	0.4	28	0.4	9	0.5	3.1:1
Cuernavaca	102	1.2	83	1.2	19	1.1	4.4:1
Culiacán	104	1.2	88	1.3	16	0.9	5.5:1
Durango	70	0.8	61	0.9	9	0.5	6.8:1
Escuinapa	32	0.4	29	0.4	3	0.2	9.7:1
Fresnillo	37	0.4	27	0.4	10	0.6	2.7:1
Guadalajara Centro	204	2.4	154	2.2	50	2.9	3.1:1
Guadalajara Sur	100	1.2	76	1.1	24	1.4	3.2:1
Guadalupe	75	0.9	59	0.9	16	0.9	3.7:1
Guadalupe Zacatecas	6	0.1	5	0.1	1	0.1	5.0:1
Guamúchil	52	0.6	48	0.7	4	0.2	12.0:1
Guasave	48	0.6	43	0.6	5	0.3	8.6:1
Hermosillo	80	0.9	67	1.0	13	0.8	5.2:1
Huatulco	14	0.2	11	0.2	3	0.2	3.7:1
Ixtapa Zihuatanejo	58	0.7	47	0.7	11	0.6	4.3:1
La Paz	26	0.3	22	0.3	4	0.2	5.5:1
La Piedad	69	0.8	47	0.7	22	1.3	2.1:1
Laguna Durango	72	0.8	58	0.8	14	0.8	4.1:1
León	203	2.4	160	2.3	43	2.5	3.7:1
Los Cabos	49	0.6	26	0.4	23	1.4	1.1:1
Los Mochis	89	1.0	62	0.9	27	1.6	2.3:1
Manzanillo	40	0.5	31	0.5	9	0.5	3.4:1
Mazatlán	83	1.0	69	1.0	14	0.8	4.9:1
Mérida	64	0.7	51	0.7	13	0.8	3.9:1
Mexicali	82	1.0	63	0.9	19	1.1	3.3:1
Monterrey	141	1.6	117	1.7	24	1.4	4.9:1
Morelia	106	1.2	85	1.2	21	1.2	4.0:1
Nogales	88	1.0	55	0.8	33	1.9	1.7:1
Oaxaca	91	1.1	75	1.1	16	0.9	4.7:1
Pachuca	147	1.7	119	1.7	28	1.6	4.3:1
Playa del Carmen	50	0.6	35	0.5	15	0.9	2.3:1
Poza Rica	32	0.4	26	0.4	6	0.4	4.3:1
Puebla	89	1.0	79	1.2	10	0.6	7.9:1
Puerto Vallarta	69	0.8	59	0.9	10	0.6	5.9:1
Querétaro	162	1.9	135	2.0	27	1.6	5.0:1
Reynosa	19	0.2	12	0.2	7	0.4	1.7:1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Salamanca	50	0.6	36	0.5	14	0.8	2.6:1
Saltillo	176	2.1	133	1.9	43	2.5	3.1:1
San Luis Potosí	164	1.9	136	2.0	28	1.6	4.9:1
San Nicolás de los Garza	112	1.3	94	1.4	18	1.1	5.2:1
Tampico	78	0.9	62	0.9	16	0.9	3.9:1
Tapachula	38	0.4	30	0.4	8	0.5	3.8:1
Tecomán	45	0.5	40	0.6	5	0.3	8.0:1
Tehuacán	98	1.1	84	1.2	14	0.8	6.0:1
Tepic	20	0.2	15	0.2	5	0.3	3.0:1
Tijuana Guaycura	146	1.7	112	1.6	34	2.0	3.3:1
Tijuana Soler	137	1.6	98	1.4	39	2.3	2.5:1
Tlaquepaque	152	1.8	126	1.8	26	1.5	4.8:1
Tlaxcala	45	0.5	37	0.5	8	0.5	4.6:1
Toluca	167	1.9	143	2.1	24	1.4	6.0:1
Torreón Oriente	196	2.3	147	2.1	49	2.9	3.0:1
Tuxtla Gutiérrez	62	0.7	54	0.8	8	0.5	6.8:1
Villa Victoria	10	0.1	10	0.1	0	0.0	---
Villahermosa	37	0.4	34	0.5	3	0.2	11.3:1
Xalapa	72	0.8	53	0.8	19	1.1	2.8:1
Yucatán	30	0.4	20	0.3	10	0.6	2.0:1
Zacatecas	69	0.8	51	0.7	18	1.1	2.8:1
Zamora	87	1.0	73	1.1	14	0.8	5.2:1
Zapopan Kena Moreno	3	0.0	1	0.0	2	0.1	0.5:1
Zapopan Norte	165	1.9	129	1.9	36	2.1	3.6:1
UH Cd. Juárez	16	0.2	10	0.1	6	0.4	1.7:1
UH Culiacán	10	0.1	10	0.1	0	0.0	---
UH Nuevo León	31	0.4	22	0.3	9	0.5	2.4:1
UH Punta Diamante	24	0.3	21	0.3	3	0.2	7.0:1
UH Tijuana	24	0.3	18	0.3	6	0.4	3.0:1
UH Zapopan	23	0.3	20	0.3	3	0.2	6.7:1
UH Zapotlán el Grande	15	0.2	15	0.2	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	6	0.1	5	0.1	1	0.1	5.0:1
UTUH Tijuana	5	0.1	5	0.1	0	0.0	---
Total	8,567	100.0	6,864	100.0	1,703	100.0	4.0:1

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Cuadro 2. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	6,864	80.1	
Mujeres	1,703	19.9	4.0 : 1
Total	8,567	100.0	

Cuadro 3. Persona que proporciona la información

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Usuario de drogas	3,852	45.0	3,012	43.9	840	49.3
Usuario de drogas y familiares u otras personas	3,876	45.2	3,184	46.4	692	40.6
<i>Sin Información</i>	839	9.8	668	9.7	171	10.0
Total	8,567	100.0	6,864	100.0	1,703	100.0

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	807	9.4	9.4	606	8.8	8.8	201	11.8	11.8
15 a 19 años	2,752	32.1	32.1	2,206	32.1	32.1	546	32.1	32.1
20 a 24 años	1,601	18.7	18.7	1,292	18.8	18.8	309	18.1	18.2
25 a 29 años	1,145	13.4	13.4	921	13.4	13.4	224	13.2	13.2
30 a 34 años	805	9.4	9.4	656	9.6	9.6	149	8.7	8.8
35 a 39 años	575	6.7	6.7	486	7.1	7.1	89	5.2	5.2
40 a 44 años	359	4.2	4.2	303	4.4	4.4	56	3.3	3.3
45 años y más	519	6.1	6.1	391	5.7	5.7	128	7.5	7.5
<i>Sin información</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0
Media (DE)	24.7 (10.5) años			24.8 (10.4) años			24.6 (11.1) años		
Mediana	22 años			22 años			21 años		
Moda	17 años			17 años			16 años		
Decil1	15 años			15 años			14 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	5,728	66.9	66.9	4,609	67.1	67.2	1,119	65.7	65.8
Casado	893	10.4	10.4	790	11.5	11.5	103	6.0	6.1
Unión libre	1,166	13.6	13.6	885	12.9	12.9	281	16.5	16.5
Separado	616	7.2	7.2	475	6.9	6.9	141	8.3	8.3
Divorciado	128	1.5	1.5	85	1.2	1.2	43	2.5	2.5
Viudo	29	0.3	0.3	15	0.2	0.2	14	0.8	0.8
<i>Sin información</i>	7	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.1	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	32	0.4	0.4	23	0.3	0.3	9	0.5	0.5
Ninguna (sabe leer y escribir)	18	0.2	0.2	14	0.2	0.2	4	0.2	0.2
Primaria incompleta	175	2.0	2.0	140	2.0	2.0	35	2.1	2.1
Primaria completa	394	4.6	4.6	314	4.6	4.6	80	4.7	4.7
Secundaria incompleta	1,559	18.2	18.2	1,227	17.9	17.9	332	19.5	19.5
Secundaria completa	1,654	19.3	19.3	1,343	19.6	19.6	311	18.3	18.3
Estudios técnicos o comerciales incompletos	112	1.3	1.3	92	1.3	1.3	20	1.2	1.2
Estudios técnicos o comerciales completos	90	1.1	1.1	62	0.9	0.9	28	1.6	1.6
Bachillerato incompleto	2,316	27.0	27.0	1,886	27.5	27.5	430	25.2	25.3
Bachillerato completo	903	10.5	10.5	752	11.0	11.0	151	8.9	8.9
Estudios superiores incompletos	821	9.6	9.6	645	9.4	9.4	176	10.3	10.3
Estudios superiores completos	432	5.0	5.0	323	4.7	4.7	109	6.4	6.4
Estudios de posgrado incompletos	14	0.2	0.2	9	0.1	0.1	5	0.3	0.3
Estudios de posgrado completos	45	0.5	0.5	33	0.5	0.5	12	0.7	0.7
<i>Sin información</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,252	26.3	26.3	1,844	26.9	26.9	408	24.0	24.0
Estudiante	2,132	24.9	24.9	1,613	23.5	23.5	519	30.5	30.5
Estudiante que trabaja	411	4.8	4.8	360	5.2	5.2	51	3.0	3.0
Trabaja	3,319	38.7	38.8	2,904	42.3	42.3	415	24.4	24.4
Tareas del hogar	410	4.8	4.8	106	1.5	1.5	304	17.9	17.9
Pensionado	40	0.5	0.5	36	0.5	0.5	4	0.2	0.2
<i>Sin información</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0

Cuadro 8. Estrato social

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	20	0.2	0.2	19	0.3	0.3	1	0.1	0.1
Medio alto	335	3.9	3.9	262	3.8	3.8	73	4.3	4.3
Medio	1,902	22.2	22.2	1,490	21.7	21.7	412	24.2	24.2
Medio bajo	4,222	49.3	49.3	3,434	50.0	50.1	788	46.3	46.4
Bajo	2,031	23.7	23.7	1,619	23.6	23.6	412	24.2	24.2
Pobreza extrema o marginación	47	0.5	0.5	34	0.5	0.5	13	0.8	0.8
<i>Sin información</i>	10	0.1	<i>Se omite</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2020

Cuadro 9. Motivos de consulta

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	7,554	88.2	6,154	89.7	1,400	82.2
Consumo de bebidas alcohólicas	3,614	42.2	2,910	42.4	704	41.3
Consumo de tabaco	3,024	35.3	2,438	35.5	586	34.4
Otro motivo	245	2.9	185	2.7	60	3.5
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	32	0.4	15	0.2	17	1.0
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	3,826	44.7	3,116	45.4	710	41.7

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,146	48.4	3,325	48.4	821	48.2
Por condicionamiento o recomendación familiar	4,184	48.8	3,431	50.0	753	44.2
Por recomendación de pares	102	1.2	78	1.1	24	1.4
Por condicionamiento o recomendación escolar	991	11.6	802	11.7	189	11.1
Por condicionamiento legal	545	6.4	440	6.4	105	6.2
Por condicionamiento o recomendación laboral	155	1.8	143	2.1	12	0.7
Por indicación médica	752	8.8	589	8.6	163	9.6
Por solicitud de novia(o)	20	0.2	18	0.3	2	0.1
Otros condicionantes de solicitud de tratamiento	159	1.9	95	1.4	64	3.8
<i>Ningún condicionante reportado</i>	159	1.9	124	1.8	35	2.1
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	2,429	28.4	2,008	29.3	421	24.7
	8,567	100.0	6,864	100.0	1,703	100.0

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	572	6.7	506	7.4	66	3.9
Grupo de ayuda mutua	676	7.9	578	8.4	98	5.8
Internamiento en anexo	1,260	14.7	1,077	15.7	183	10.7
Intervención de emergencia	71	0.8	57	0.8	14	0.8
Programa de mantenimiento	36	0.4	27	0.4	9	0.5
Tratamiento médico no especializado	78	0.9	59	0.9	19	1.1
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	654	7.6	512	7.5	142	8.3
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	186	2.2	141	2.1	45	2.6
Medicina tradicional o alternativa	46	0.5	36	0.5	10	0.6
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	2,696	31.5	2,191	31.9	505	29.7
Otras acciones	1,983	23.1	1,532	22.3	451	26.5
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>1,935</i>	<i>22.6</i>	<i>1,537</i>	<i>22.4</i>	<i>398</i>	<i>23.4</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,181</i>	<i>13.8</i>	<i>1,002</i>	<i>14.6</i>	<i>179</i>	<i>10.5</i>

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,203	49.1	3,364	49.0	839	49.3
Accidentes o lesiones	1,270	14.8	1,063	15.5	207	12.2
Problemas familiares	6,957	81.2	5,619	81.9	1,338	78.6
Problemas escolares	2,561	29.9	2,074	30.2	487	28.6
Problemas laborales	2,431	28.4	2,122	30.9	309	18.1
Problemas psicológicos	4,418	51.6	3,485	50.8	933	54.8
Problemas legales	1,492	17.4	1,291	18.8	201	11.8
Conducta antisocial o delictiva	1,203	14.0	1,035	15.1	168	9.9
Otros problemas	426	5.0	338	4.9	88	5.2
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>392</i>	<i>4.6</i>	<i>290</i>	<i>4.2</i>	<i>102</i>	<i>6.0</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>6,829</i>	<i>79.7</i>	<i>5,522</i>	<i>80.4</i>	<i>1,307</i>	<i>76.7</i>

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A
TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2020**

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	233	2.7	3.2	205	3.0	3.5	28	1.6	2.0
10 a 14 años	3,365	39.3	46.3	2,731	39.8	46.7	634	37.2	44.8
15 a 19 años	3,168	37.0	43.6	2,556	37.2	43.7	612	35.9	43.2
20 a 24 años	328	3.8	4.5	242	3.5	4.1	86	5.0	6.1
25 a 29 años	87	1.0	1.2	68	1.0	1.2	19	1.1	1.3
30 a 34 años	38	0.4	0.5	25	0.4	0.4	13	0.8	0.9
35 a 39 años	24	0.3	0.3	13	0.2	0.2	11	0.6	0.8
40 a 44 años	17	0.2	0.2	6	0.1	0.1	11	0.6	0.8
45 años y más	4	0.0	0.1	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
<i>No consumió</i>	<i>1,301</i>	<i>15.2</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,014</i>	<i>14.8</i>	<i>Se omite</i>	<i>287</i>	<i>16.9</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>2</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>2</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0
Media (DE)	14.9 (3.8) años			14.7 (3.5) años			15.5 (4.8) años		
Mediana	15 años			14 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			11 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	277	3.2	3.6	236	3.4	3.9	41	2.4	2.7
10 a 14 años	3,063	35.8	40.2	2,439	35.5	39.9	624	36.6	41.4
15 a 19 años	3,876	45.2	50.9	3,156	46.0	51.6	720	42.3	47.7
20 a 24 años	285	3.3	3.7	212	3.1	3.5	73	4.3	4.8
25 a 29 años	72	0.8	0.9	48	0.7	0.8	24	1.4	1.6
30 a 34 años	26	0.3	0.3	14	0.2	0.2	12	0.7	0.8
35 a 39 años	13	0.2	0.2	5	0.1	0.1	8	0.5	0.5
40 a 44 años	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0	5	0.3	0.3
45 años y más	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.1	0.1
<i>No consumió</i>	<i>946</i>	<i>11.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>751</i>	<i>10.9</i>	<i>Se omite</i>	<i>195</i>	<i>11.5</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>2</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>2</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0
Media (DE)	14.9 (3.3) años			14.8 (3.1) años			15.3 (4.1) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	99	1.2	1.2	89	1.3	1.3	10	0.6	0.6
10 a 14 años	3,075	35.9	36.0	2,503	36.5	36.5	572	33.6	33.6
15 a 19 años	3,978	46.4	46.5	3,233	47.1	47.2	745	43.7	43.8
20 a 24 años	720	8.4	8.4	575	8.4	8.4	145	8.5	8.5
25 a 29 años	315	3.7	3.7	225	3.3	3.3	90	5.3	5.3
30 a 34 años	156	1.8	1.8	102	1.5	1.5	54	3.2	3.2
35 a 39 años	102	1.2	1.2	64	0.9	0.9	38	2.2	2.2
40 a 44 años	52	0.6	0.6	31	0.5	0.5	21	1.2	1.2
45 años y más	54	0.6	0.6	28	0.4	0.4	26	1.5	1.5
<i>Sin información</i>	16	0.2	<i>Se omite</i>	14	0.2	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0
Media (DE)	16.7 (5.8) años			16.4 (5.3) años			18 (7.6) años		
Mediana	15 años			15 años			16 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			13 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio, según menciones

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mariguana	6,161	71.9	5,053	73.6	1,108	65.1
Hachís	7	0.1	6	0.1	1	0.1
Cocaína (Clorhidrato)	740	8.6	608	8.9	132	7.8
<i>Crack</i>	170	2.0	146	2.1	24	1.4
Otra presentación de cocaína	1	0.0	0	0.0	1	0.1
Solventes y removedores	408	4.8	321	4.7	87	5.1
Pegamentos	71	0.8	54	0.8	17	1.0
Esmaltes o pinturas	38	0.4	30	0.4	8	0.5
Otros inhalables	17	0.2	16	0.2	1	0.1
Benzodiazepinas	174	2.0	85	1.2	89	5.2
<i>Rohypnol</i> [®]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otros depresores del SNC	7	0.1	2	0.0	5	0.3
Anfetamina	42	0.5	32	0.5	10	0.6
Metanfetaminas	592	6.9	425	6.2	167	9.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	27	0.3	18	0.3	9	0.5
Otros estimulantes del SNC	5	0.1	3	0.0	2	0.1
LSD	23	0.3	16	0.2	7	0.4
Plantas alucinógenas y derivados	12	0.1	11	0.2	1	0.1
Otras drogas alucinógenas y disociativas	1	0.0	0	0.0	1	0.1
Heroína	14	0.2	9	0.1	5	0.3
Opioides sintéticos	18	0.2	11	0.2	7	0.4
Opio y otros opiáceos	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Sustancias con utilidad médica	14	0.2	6	0.1	8	0.5
Otras sustancias de abuso	21	0.2	10	0.1	11	0.6
Total	8,567	100.0	6,864	100.0	1,703	100.0

Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	346	4.0	4.8	249	3.6	4.3	97	5.7	6.9
1 a 5 años	2,737	31.9	37.7	2,165	31.5	37.0	572	33.6	40.4
6 a 10 años	1,524	17.8	21.0	1,231	17.9	21.0	293	17.2	20.7
11 a 15 años	964	11.3	13.3	779	11.3	13.3	185	10.9	13.1
16 a 20 años	632	7.4	8.7	535	7.8	9.1	97	5.7	6.9
21 a 25 años	442	5.2	6.1	381	5.6	6.5	61	3.6	4.3
26 o más años	618	7.2	8.5	508	7.4	8.7	110	6.5	7.8
No consumió	1,301	15.2	Se omite	1,014	14.8	Se omite	287	16.9	Se omite
Sin información	3	0.0	Se omite	2	0.0	Se omite	1	0.1	Se omite
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0
Media (DE)	10.2 (9.8) años			10.4 (9.9) años			9.3 (9.8) años		
Mediana	7 años			7 años			6 años		
Moda	1 años			1 años			1 años		
Decil1	1 años			1 años			1 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	351	4.1	4.6	264	3.8	4.3	87	5.1	5.8
1 a 5 años	2,876	33.6	37.8	2,250	32.8	36.8	626	36.8	41.5
6 a 10 años	1,511	17.6	19.8	1,210	17.6	19.8	301	17.7	20.0
11 a 15 años	1,053	12.3	13.8	863	12.6	14.1	190	11.2	12.6
16 a 20 años	724	8.5	9.5	594	8.7	9.7	130	7.6	8.6
21 a 25 años	468	5.5	6.1	397	5.8	6.5	71	4.2	4.7
26 o más años	635	7.4	8.3	533	7.8	8.7	102	6.0	6.8
No consumió	946	11.0	Se omite	751	10.9	Se omite	195	11.5	Se omite
Sin información	3	0.0	Se omite	2	0.0	Se omite	1	0.1	Se omite
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0
Media (DE)	10.2 (9.7) años			10.5 (9.8) años			9.2 (9.4) años		
Mediana	7 años			7 años			6 años		
Moda	1 años			1 años			1 años		
Decil1	1 años			1 años			1 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	895	10.4	10.5	657	9.6	9.6	238	14.0	14.0
1 a 5 años	3,678	42.9	43.0	2,863	41.7	41.8	815	47.9	47.9
6 a 10 años	1,621	18.9	19.0	1,339	19.5	19.5	282	16.6	16.6
11 a 15 años	934	10.9	10.9	774	11.3	11.3	160	9.4	9.4
16 a 20 años	590	6.9	6.9	496	7.2	7.2	94	5.5	5.5
21 a 25 años	389	4.5	4.5	343	5.0	5.0	46	2.7	2.7
26 o más años	443	5.2	5.2	378	5.5	5.5	65	3.8	3.8
<i>Sin información</i>	17	0.2	<i>Se omite</i>	14	0.2	<i>Se omite</i>	3	0.2	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0
Media (DE)	8 (8.7) años			8.4 (8.8) años			6.5 (8.0) años		
Mediana	5 años			5 años			3 años		
Moda	1 años			1 años			1 años		
Decil1	< 1 años			1 años			< 1 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	630	7.4	7.4	452	6.6	6.6	178	10.5	10.5
Social u ocasional	913	10.7	10.7	681	9.9	9.9	232	13.6	13.7
Funcional	4,730	55.2	55.3	3,868	56.4	56.4	862	50.6	50.7
Disfuncional	2,011	23.5	23.5	1,648	24.0	24.0	363	21.3	21.4
En remisión	268	3.1	3.1	204	3.0	3.0	64	3.8	3.8
<i>Sin información</i>	15	0.2	<i>Se omite</i>	11	0.2	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	356	4.2	270	3.9	86	5.0
2 sustancias	791	9.2	620	9.0	171	10.0
3 sustancias	2,138	25.0	1,664	24.2	474	27.8
4 sustancias	1,782	20.8	1,402	20.4	380	22.3
5 sustancias	1,290	15.1	1,049	15.3	241	14.2
6 sustancias	822	9.6	661	9.6	161	9.5
7 sustancias	560	6.5	474	6.9	86	5.0
8 sustancias	349	4.1	309	4.5	40	2.3
9 sustancias	205	2.4	174	2.5	31	1.8
10 sustancias	120	1.4	108	1.6	12	0.7
11-18 sustancias	154	1.8	133	1.9	21	1.2
Total	8,567	100.0	6,864	100.0	1,703	100.0
Media (DE)	4.5 (2.2) drogas		4.6 (2.2) drogas		4.2 (2.0) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	2,832	33.1	2,191	31.9	641	37.6
2 sustancias	2,073	24.2	1,634	23.8	439	25.8
3 sustancias	1,382	16.1	1,122	16.3	260	15.3
4 sustancias	862	10.1	692	10.1	170	10.0
5 sustancias	576	6.7	489	7.1	87	5.1
6 sustancias	353	4.1	311	4.5	42	2.5
7 sustancias	211	2.5	181	2.6	30	1.8
8 sustancias	124	1.4	111	1.6	13	0.8
9 sustancias	72	0.8	61	0.9	11	0.6
10 sustancias	48	0.6	45	0.7	3	0.2
11-16 sustancias	34	0.4	27	0.4	7	0.6
Total	8,567	100.0	6,864	100.0	1,703	100.0
Media (DE)	2.8 (2) drogas		2.8 (2) drogas		2.5 (1.8) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	1 drogas		1 drogas		1 drogas	
Decil1	1 drogas		1 drogas		1 drogas	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	7,266	84.8	5,850	85.2	1,416	83.1
Alcohol	7,621	89.0	6,113	89.1	1,508	88.5
Cannabis	7,263	84.8	5,908	86.1	1,355	79.6
Mariguana	7,261	84.8	5,907	86.1	1,354	79.5
Hachís	477	5.6	409	6.0	68	4.0
Cocaína	4,154	48.5	3,491	50.9	663	38.9
Cocaína (Clorhidrato)	3,702	43.2	3,104	45.2	598	35.1
<i>Crack</i>	1,706	19.9	1,485	21.6	221	13.0
Otra presentación de cocaína	58	0.7	49	0.7	9	0.5
Inhalables	1,804	21.1	1,524	22.2	280	16.4
Solventes o removedores	1,374	16.0	1,171	17.1	203	11.9
Pegamentos	453	5.3	383	5.6	70	4.1
Esmaltes o pinturas	242	2.8	196	2.9	46	2.7
Otros inhalables	90	1.1	78	1.1	12	0.7
Depresores	1,444	16.9	1,107	16.1	337	19.8
Benzodiacepinas	1,404	16.4	1,074	15.6	330	19.4
<i>Rohypnol</i>	37	0.4	36	0.5	1	0.1
Otros depresores	32	0.4	22	0.3	10	0.6
Estimulantes	4,102	47.9	3,310	48.2	792	46.5
Anfetamina	193	2.3	159	2.3	34	2.0
Metanfetaminas	3,752	43.8	3,043	44.3	709	41.6
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	642	7.5	506	7.4	136	8.0
Otros estimulantes	39	0.5	31	0.5	8	0.5
Drogas alucinógenas y disociativas	1,268	14.8	1,039	15.1	229	13.4
LSD	1,051	12.3	848	12.4	203	11.9
Plantas alucinógenas y derivados	441	5.1	385	5.6	56	3.3
Otras drogas alucinógenas y disoc.	71	0.8	62	0.9	9	0.5
Opiáceos	364	4.2	295	4.3	69	4.1
Heroína	195	2.3	158	2.3	37	2.2
Opioides sintéticos	134	1.6	112	1.6	22	1.3
Opio y otros opiáceos	60	0.7	47	0.7	13	0.8
Otras sustancias de abuso	156	1.8	116	1.7	40	2.3
Con utilidad médica	57	0.7	39	0.6	18	1.1
Otras sustancias de abuso	102	1.2	79	1.2	23	1.4

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	135	1.6	108	1.6	27	1.6
1 sustancia	709	8.3	547	8.0	162	9.5
2 sustancias	1,548	18.1	1,192	17.4	356	20.9
3 sustancias	2,474	28.9	1,988	29.0	486	28.5
4 sustancias	1,658	19.4	1,336	19.5	322	18.9
5 sustancias	926	10.8	749	10.9	177	10.4
6 sustancias	516	6.0	426	6.2	90	5.3
7 sustancias	252	2.9	213	3.1	39	2.3
8 sustancias	158	1.8	141	2.1	17	1.0
9 sustancias	84	1.0	68	1.0	16	0.9
10 sustancias	48	0.6	44	0.6	4	0.2
11-16 sustancias	59	0.7	52	0.8	7	0.4
Total	8,567	100.0	6,864	100.0	1,703	100.0
Media (DE)	3.6 (1.9) drogas		3.6 (1.9) drogas		3.4 (1.7) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	2 drogas		2 drogas		1 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	654	7.6	500	7.3	154	9.0
1 sustancia	3,558	41.5	2,819	41.1	739	43.4
2 sustancias	2,122	24.8	1,701	24.8	421	24.7
3 sustancias	1,027	12.0	830	12.1	197	11.6
4 sustancias	567	6.6	464	6.8	103	6.0
5 sustancias	280	3.3	236	3.4	44	2.6
6 sustancias	159	1.9	141	2.1	18	1.1
7 sustancias	91	1.1	75	1.1	16	0.9
8 sustancias	50	0.6	46	0.7	4	0.2
9 sustancias	32	0.4	28	0.4	4	0.2
10 sustancias	15	0.2	14	0.2	1	0.1
11-14 sustancias	12	0.1	10	0.1	2	0.1
Total	8,567	100.0	6,864	100.0	1,703	100.0
Media (DE)	2.0 (1.6) drogas		2.0 (1.6) drogas		1.8 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		1 drogas	
Moda	1 drogas		1 drogas		1 drogas	
Decil1	1 drogas		1 drogas		1 drogas	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,475	75.6	5,227	76.2	1,248	73.3
Alcohol	6,949	81.1	5,602	81.6	1,347	79.1
Cannabis	5,910	69.0	4,812	70.1	1,098	64.5
Mariguana	5,904	68.9	4,807	70.0	1,097	64.4
Hachís	289	3.4	251	3.7	38	2.2
Cocaína	2,822	32.9	2,379	34.7	443	26.0
Cocaína (Clorhidrato)	2,332	27.2	1,954	28.5	378	22.2
<i>Crack</i>	1,183	13.8	1,041	15.2	142	8.3
Otra presentación de cocaína	38	0.4	31	0.5	7	0.4
Inhalables	1,111	13.0	924	13.5	187	11.0
Solventes y removedores	878	10.2	736	10.7	142	8.3
Pegamentos	219	2.6	183	2.7	36	2.1
Esmaltes o pinturas	108	1.3	87	1.3	21	1.2
Otros inhalables	38	0.4	32	0.5	6	0.4
Depresores	1,010	11.8	752	11.0	258	15.1
Benzodiacepinas	986	11.5	734	10.7	252	14.8
<i>Rohypnol</i>	14	0.2	14	0.2	0	0.0
Otros depresores	20	0.2	12	0.2	8	0.5
Estimulantes	3,577	41.8	2,875	41.9	702	41.2
Anfetamina	115	1.3	94	1.4	21	1.2
Metanfetaminas	3,328	38.8	2,689	39.2	639	37.5
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	375	4.4	291	4.2	84	4.9
Otros estimulantes	18	0.2	14	0.2	4	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	770	9.0	623	9.1	147	8.6
LSD	672	7.8	538	7.8	134	7.9
Plantas alucinógenas y derivados	189	2.2	161	2.3	28	1.6
Otras drogas alucinógenas y disoc.	45	0.5	41	0.6	4	0.2
Opiáceos	246	2.9	197	2.9	49	2.9
Heroína	131	1.5	105	1.5	26	1.5
Opioides sintéticos	95	1.1	82	1.2	13	0.8
Opio y otros opiáceos	35	0.4	24	0.3	11	0.6
Otras sustancias de abuso	109	1.3	76	1.1	33	1.9
Con utilidad médica	45	0.5	29	0.4	16	0.9
Otras sustancias de abuso	64	0.7	47	0.7	17	1.0

Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	750	8.8	8.9	565	8.2	8.4	185	10.9	11.1
Alcohol	1,287	15.0	15.3	983	14.3	14.6	304	17.9	18.3
Mariguana	3,154	36.8	37.6	2,673	38.9	39.7	481	28.2	28.9
Hachís	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Cocaína (Clorhidrato)	342	4.0	4.1	291	4.2	4.3	51	3.0	3.1
<i>Crack</i>	380	4.4	4.5	340	5.0	5.0	40	2.3	2.4
Otra presentación de cocaína	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Solventes y removedores	186	2.2	2.2	143	2.1	2.1	43	2.5	2.6
Pegamentos	23	0.3	0.3	17	0.2	0.3	6	0.4	0.4
Esmaltes o pinturas	8	0.1	0.1	3	0.0	0.0	5	0.3	0.3
Otros inhalables	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.1	0.1
Benzodiacepinas	124	1.4	1.5	66	1.0	1.0	58	3.4	3.5
<i>Rohypno</i> [®]	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.1	0.1
Otros depresores del SNC	11	0.1	0.1	5	0.1	0.1	6	0.4	0.4
Anfetamina	27	0.3	0.3	22	0.3	0.3	5	0.3	0.3
Metanfetaminas	1,843	21.5	21.9	1,434	20.9	21.3	409	24.0	24.6
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	16	0.2	0.2	13	0.2	0.2	3	0.2	0.2
Otros estimulantes del SNC	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
LSD	35	0.4	0.4	27	0.4	0.4	8	0.5	0.5
Plantas alucinógenas y derivados	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.1	0.1
Otras drogas alucinógenas y disociativas.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Heroína	58	0.7	0.7	47	0.7	0.7	11	0.6	0.7
Opioides sintéticos	14	0.2	0.2	11	0.2	0.2	3	0.2	0.2
Opio y otros opiáceos	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.2	0.2
Sustancias con utilidad médica	7	0.1	0.1	3	0.0	0.0	4	0.2	0.2
Otras sustancias de abuso	11	0.1	0.1	6	0.1	0.1	5	0.3	0.3
Ninguna	83	1.0	1.0	55	0.8	0.8	28	1.6	1.7
<i>No consumió en el último año</i>	135	1.6	Se omite	108	1.6	Se omite	27	1.6	Se omite
<i>Sin Información</i>	33	0.4	Se omite	22	0.3	Se omite	11	0.6	Se omite
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0

Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	432	5.0	5.1	309	4.5	4.6	123	7.2	7.4
Alcohol	1,105	12.9	13.2	857	12.5	12.7	248	14.6	14.9
Mariguana	2,584	30.2	30.8	2,162	31.5	32.1	422	24.8	25.3
Hachís	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Cocaína (Clorhidrato)	453	5.3	5.4	378	5.5	5.6	75	4.4	4.5
<i>Crack</i>	480	5.6	5.7	430	6.3	6.4	50	2.9	3.0
Otra presentación de cocaína	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.1	0.1
Solventes y removedores	245	2.9	2.9	195	2.8	2.9	50	2.9	3.0
Pegamentos	31	0.4	0.4	24	0.3	0.4	7	0.4	0.4
Esmaltes o pinturas	10	0.1	0.1	5	0.1	0.1	5	0.3	0.3
Otros inhalables	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.1	0.1
Benzodiazepinas	168	2.0	2.0	99	1.4	1.5	69	4.1	4.1
<i>Rohypnol</i> [®]	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.1	0.1
Otros depresores del SNC	18	0.2	0.2	8	0.1	0.1	10	0.6	0.6
Anfetamina	28	0.3	0.3	23	0.3	0.3	5	0.3	0.3
Metanfetaminas	2,539	29.6	30.2	2,019	29.4	30.0	520	30.5	31.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	23	0.3	0.3	17	0.2	0.3	6	0.4	0.4
Otros estimulantes del SNC	11	0.1	0.1	9	0.1	0.1	2	0.1	0.1
LSD	46	0.5	0.5	36	0.5	0.5	10	0.6	0.6
Plantas alucinógenas y derivados	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.1	0.1
Otras drogas alucinógenas y disociativas	6	0.1	0.1	3	0.0	0.0	3	0.2	0.2
Heroína	72	0.8	0.9	58	0.8	0.9	14	0.8	0.8
Opioides sintéticos	15	0.2	0.2	12	0.2	0.2	3	0.2	0.2
Opio y otros opiáceos	12	0.1	0.1	8	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Sustancias con utilidad médica	9	0.1	0.1	3	0.0	0.0	6	0.4	0.4
Otras sustancias de abuso	13	0.2	0.2	8	0.1	0.1	5	0.3	0.3
Ninguna	75	0.9	0.9	52	0.8	0.8	23	1.4	1.4
<i>No consumió en el último año</i>	135	1.6	<i>Se omite</i>	108	1.6	<i>Se omite</i>	27	1.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	34	0.4	<i>Se omite</i>	24	0.3	<i>Se omite</i>	10	0.6	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	3,414	39.9	49.0	2,825	41.2	50.1	589	34.6	44.3
No combinó drogas	3,556	41.5	51.0	2,814	41.0	49.9	742	43.6	55.7
<i>No aplica</i>	1,597	18.6	<i>Se omite</i>	1,225	17.8	<i>Se omite</i>	372	21.8	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	889	10.4	658	9.6	231	13.6
1 sustancia	1,820	21.2	1,403	20.4	417	24.5
2 sustancias	2,427	28.3	1,922	28.0	505	29.7
3 sustancias	2,024	23.6	1,703	24.8	321	18.8
4 sustancias	952	11.1	800	11.7	152	8.9
5 sustancias	311	3.6	251	3.7	60	3.5
6 sustancias	105	1.2	93	1.4	12	0.7
7 sustancias	30	0.4	26	0.4	4	0.2
8 sustancias	6	0.1	5	0.1	1	0.1
9 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
10 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	8,567	100.0	6,864	100.0	1,703	100.0
Media (DE)	2.2 (1.4) drogas		2.3 (1.4) drogas		2 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Decil1	0 drogas		1 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	2,498	29.2	1,886	27.5	612	35.9
1 sustancia	3,969	46.3	3,237	47.2	732	43.0
2 sustancias	1,506	17.6	1,250	18.2	256	15.0
3 sustancias	402	4.7	326	4.7	76	4.5
4 sustancias	135	1.6	115	1.7	20	1.2
5 sustancias	45	0.5	39	0.6	6	0.4
6 sustancias	8	0.1	7	0.1	1	0.1
7 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
8 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	8,567	100.0	6,864	100.0	1,703	100.0
Media (DE)	1.1 (1.0) drogas		1.1 (1.0) drogas		0.9 (0.9) drogas	
Mediana	1 drogas		1 drogas		1 drogas	
Moda	1 drogas		1 drogas		1 drogas	
Decil1	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	5,214	60.9	4,259	62.0	955	56.1
Alcohol	4,782	55.8	3,919	57.1	863	50.7
Cannabis	3,845	44.9	3,208	46.7	637	37.4
Mariguana	3,844	44.9	3,207	46.7	637	37.4
Hachís	69	0.8	55	0.8	14	0.8
Cocaína	1,303	15.2	1,132	16.5	171	10.0
Cocaína (Clorhidrato)	871	10.2	749	10.9	122	7.2
<i>Crack</i>	579	6.8	515	7.5	64	3.8
Otra presentación de cocaína	8	0.1	8	0.1	0	0.0
Inhalables	478	5.6	396	5.8	82	4.8
Solventes y removedores	390	4.6	321	4.7	69	4.1
Pegamentos	69	0.8	58	0.8	11	0.6
Esmaltes o pinturas	28	0.3	24	0.3	4	0.2
Otros inhalables	13	0.2	12	0.2	1	0.1
Depresores	495	5.8	341	5.0	154	9.0
Benzodiacepinas	486	5.7	336	4.9	150	8.8
<i>Rohypnol</i>	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otros depresores	11	0.1	5	0.1	6	0.4
Estimulantes	2,280	26.6	1,857	27.1	423	24.8
Anfetamina	41	0.5	33	0.5	8	0.5
Metanfetaminas	2,173	25.4	1,777	25.9	396	23.3
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	103	1.2	85	1.2	18	1.1
Otros estimulantes	5	0.1	2	0.0	3	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	153	1.8	118	1.7	35	2.1
LSD	135	1.6	102	1.5	33	1.9
Plantas alucinógenas y derivados	16	0.2	14	0.2	2	0.1
Otras drogas alucinógenas y disoc.	9	0.1	8	0.1	1	0.1
Opiáceos	116	1.4	91	1.3	25	1.5
Heroína	62	0.7	49	0.7	13	0.8
Opioides sintéticos	49	0.6	42	0.6	7	0.4
Opio y otros opiáceos	11	0.1	6	0.1	5	0.3
Otras sustancias de abuso	56	0.7	32	0.5	24	1.4
Con utilidad médica	22	0.3	9	0.1	13	0.8
Otras sustancias de abuso	34	0.4	23	0.3	11	0.6

Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	1,362	15.9	26.6	1,122	16.3	26.9	240	14.1	25.7
< de 1 vez a la semana	612	7.1	12.0	489	7.1	11.7	123	7.2	13.2
1 o 2 veces a la semana	567	6.6	11.1	448	6.5	10.7	119	7.0	12.7
Cada tercer día	350	4.1	6.8	286	4.2	6.8	64	3.8	6.8
Diario	2,221	25.9	43.4	1,832	26.7	43.9	389	22.8	41.6
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	3,353	39.1	<i>Se omite</i>	2,605	38.0	<i>Se omite</i>	748	43.9	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	102	1.2	<i>Se omite</i>	82	1.2	<i>Se omite</i>	20	1.2	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	825	9.6	17.6	641	9.3	16.7	184	10.8	21.8
< de 1 vez a la semana	1,712	20.0	36.5	1,430	20.8	37.2	282	16.6	33.4
1 o 2 veces a la semana	1,387	16.2	29.6	1,153	16.8	30.0	234	13.7	27.7
Cada tercer día	414	4.8	8.8	334	4.9	8.7	80	4.7	9.5
Diario	348	4.1	7.4	284	4.1	7.4	64	3.8	7.6
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	3,785	44.2	<i>Se omite</i>	2,945	42.9	<i>Se omite</i>	840	49.3	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	96	1.1	<i>Se omite</i>	77	1.1	<i>Se omite</i>	19	1.1	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,021	11.9	20.4	808	11.8	19.6	213	12.5	24.6
1 o 2 veces a la semana	993	11.6	19.9	838	12.2	20.3	155	9.1	17.9
Cada tercer día	840	9.8	16.8	709	10.3	17.2	131	7.7	15.1
Diario	2,143	25.0	42.9	1,775	25.9	43.0	368	21.6	42.4
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	2,498	29.2	<i>Se omite</i>	1,886	27.5	<i>Se omite</i>	612	35.9	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	1,072	12.5	<i>Se omite</i>	848	12.4	<i>Se omite</i>	224	13.2	<i>Se omite</i>
Total	8,567	100.0	100.0	6,864	100.0	100.0	1,703	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

GLOSARIO

Droga ilícita de inicio	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto	Sustancia por la que acuden los pacientes a tratamiento, a cuyo consumo los pacientes atribuyen problemas personales, de salud, familiares, escolares, laborales o sociales, en el transcurso del último año.
Droga de preferencia	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
Uso combinado de drogas	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.