



**Centros de
Integración
Juvenil, A.C.**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL
CONSUMO DE DROGAS**

**CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES
DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE
INTEGRACIÓN JUVENIL**

DROGAS ILÍCITAS

SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

Marina Velázquez Altamirano

Alma Delia Gutiérrez López

Dirección de Investigación y Enseñanza

Subdirección de Investigación

México, marzo del 2021

Informe de Investigación 21-07a

SIECD



DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Dra. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

| CONTENIDO | PÁG. |
|--|-------------|
| RESUMEN | 4 |
| ANTECEDENTES | 5 |
| MÉTODO | 6 |
| RESULTADOS | 8 |
| CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS | 8 |
| FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO | 11 |
| CONSUMO DE DROGAS | 14 |
| REFERENCIAS | 24 |
| CUADROS | 28 |
| GLOSARIO | 52 |

| ÍNDICE DE CUADROS | | PÁG. |
|--------------------------|---|-------------|
| Cuadro 1 | Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH) | 29 |
| Cuadro 2 | Sexo | 32 |
| Cuadro 3 | Persona que proporciona la información | 32 |
| Cuadro 4 | Edad de ingreso a tratamiento | 32 |
| Cuadro 5 | Estado civil | 33 |
| Cuadro 6 | Escolaridad | 33 |
| Cuadro 7 | Ocupación | 34 |
| Cuadro 8 | Estrato social | 34 |
| Cuadro 9 | Motivos de consulta | 35 |
| Cuadro 10 | Condicionantes de la solicitud de tratamiento | 35 |
| Cuadro 11 | Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias | 36 |
| Cuadro 12 | Problemas asociados al consumo de sustancias | 36 |
| Cuadro 13 | Edad de inicio del consumo de tabaco | 37 |
| Cuadro 14 | Edad de inicio del consumo de alcohol | 37 |
| Cuadro 15 | Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas | 38 |
| Cuadro 16 | Drogas ilícitas de inicio según menciones | 39 |
| Cuadro 17 | Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ | 40 |
| Cuadro 18 | Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ | 40 |
| Cuadro 19 | Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ | 41 |
| Cuadro 20 | Tipo de consumo de drogas ilícitas | 41 |
| Cuadro 21 | Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco) | 42 |
| Cuadro 22 | Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco) | 42 |
| Cuadro 23 | Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia | 43 |
| Cuadro 24 | Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco) | 44 |
| Cuadro 25 | Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco) | 44 |
| Cuadro 26 | Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia | 45 |
| Cuadro 27 | Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones | 46 |
| Cuadro 28 | Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones | 47 |
| Cuadro 29 | Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco) | 48 |
| Cuadro 30 | Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco) | 48 |
| Cuadro 31 | Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco) | 49 |
| Cuadro 32 | Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia | 50 |
| Cuadro 33 | Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días | 51 |
| Cuadro 34 | Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días | 51 |
| Cuadro 35 | Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días | 51 |

RESUMEN

El presente informe se realizó con base en 6,042 registros clínicos de la entrevista inicial realizada a personas que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento por el consumo de drogas a Centros de Integración Juvenil (CIJ) entre julio y diciembre de 2020.

Los objetivos del estudio son: a) actualizar información de los solicitantes de tratamiento en cuanto al perfil sociodemográfico, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de sustancias; b) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas c) contribuir con los sistemas nacionales de información del consumo de drogas y d) generar información que oriente el desarrollo de estudios sobre el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias en México.

Los datos que se presentan revelan que el uso de drogas ilícitas sigue siendo un problema que afecta mayormente a la población masculina, en una proporción de cuatro hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 26.8 años. En promedio, los hombres y las mujeres ingresaron a tratamiento prácticamente a la misma edad (27.0 y 26.1 años, respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco fue a los 15.2, de alcohol a los 15.3 y la de drogas ilícitas a los 17.5 años. Los hombres inician el consumo de tabaco (15.1 años), alcohol (15.2 años) y drogas ilícitas (17.0 años) de manera más temprana que las mujeres (tabaco: 15.8 años; alcohol: 15.6 años y drogas ilícitas, 19.3 años).

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (89.2%), tabaco (85.0%), cannabis (81.4%), cocaína/*crack* (51.8%), estimulantes (52.5%; principalmente metanfetaminas: 49.1% y *éxtasis*: 7.0%), inhalables (19.1%), depresores (15.4%), drogas alucinógenas y disociativas (14.1%) y opiáceos (3.4%, principalmente heroína: 2.1%). Las sustancias más utilizadas el mes previo al ingreso a tratamiento fueron: tabaco (62.8%), alcohol (57.6%), cannabis (40.2%), metanfetaminas (28.9%), cocaína/*crack* (14.6%), benzodiacepinas (4.7%) e inhalables (4.7%). Las sustancias reportadas como de mayor impacto fueron: metanfetaminas (35.9%), marihuana (23.5%), alcohol (16.1%), *crack* (5.9%), cocaína en polvo (5.4%) y tabaco (4.3%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los consultantes acudieron principalmente por iniciativa propia (53.1%) o por recomendación de la familia (49.4%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (86.3%), alcohol (47.1%) o tabaco (36.5%). Previo a su ingreso a tratamiento en CIJ, 30.7% de los solicitantes intentaron interrumpir el uso de sustancias de manera voluntaria y sin apoyo, mientras que 21.3% no habían realizado alguna acción para dejar el consumo. Los problemas asociados al consumo de drogas reportados con mayor frecuencia fueron los del ámbito familiar (82.6%), psicológicos (55.5%), de salud (50.9%) y laborales (33.0%).

ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976¹. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso². Sin embargo, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática³. Posteriormente, se implementa el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha consolidado a través de los años y realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen en la toma de decisiones de los servicios institucionales. Además, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del uso de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)⁴ de la Secretaría de Salud, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente Muñiz*” (INPRF)⁵– y el Observatorio Mexicano de Drogas a cargo de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría Salud⁶.

El SIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, incluyendo el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo⁷, uso de drogas en mujeres⁸, población infantil⁹ o de acuerdo con las etapas de la vida¹⁰ y estudios de tendencias^{11,12,13,14}. Esta información permite enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que sustenta el diseño de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides^{15,16}.

La información reportada a través del sistema ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el 2006, el SIECD genera un informe de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol¹⁷, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores¹⁸; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática¹⁹ y que ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes²⁰.

Cabe destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales^{21,22,23} y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de

investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*²⁴ realizados por los CIJ a lo largo del país.

El presente informe se elaboró con base en información obtenida por el SIECD durante el segundo semestre del 2020 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: Censo, descriptivo, semestral.

Población: 6,042 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 106 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre julio y diciembre de 2020 (cuadro 1. Anexo).

Fuente de información: Formato de Entrevista Inicial aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 22 de enero de 2021 a las 37:41 hrs., con 6,010 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (32 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ) utilizado por el CIJ La Piedad.

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, droga ilícita de inicio, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en

los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta agrupada en 26 categorías de drogas y en algunos casos (consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes) se proporciona además información concentrada en diez grupos:

| Grupo de Sustancias | Drogas en seguimiento |
|------------------------------------|--|
| Tabaco | Cigarrillos |
| Alcohol | Bebidas alcohólicas |
| <i>Cannabis</i> | Mariguana y hachís |
| Cocaína | Cocaína, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína |
| Inhalables | Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables |
| Depresores | Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores |
| Estimulantes | Anfetaminas, metanfetaminas (<i>crystal</i> o <i>ICE</i>), MDMA (<i>éxtasis</i>) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes |
| Drogas alucinógenas y disociativas | Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina) |
| Opiáceos | Heroína, Opioides sintéticos y opio y otros opiáceos |
| Otras sustancias de abuso | Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas |

Procesamiento de datos. Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.20.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS^a

Sexo. La población se conformó por 4,824 hombres y 1,218 mujeres, lo cual representa 79.8% y 20.2%, respectivamente. Es decir, 4.0 hombres solicitan tratamiento en CIJ por cada mujer.

Persona que proporciona la información. 32.5% de los casos acudieron en compañía de familiares u otras personas. Los hombres llegan acompañados en mayor proporción que las mujeres (33.7% y 27.8% respectivamente).

Edad de ingreso a tratamiento. Se observa un rango de edad de 9 a 73 años, con un promedio de 26.8 años (DE= 10.2 años); es decir, 4,684 de los usuarios de drogas tenía entre los 16 y 37 años de edad (77.5% de las personas atendidas); la edad mediana de la población fue de 25 años (19.0% de los casos fueron menores de edad; 1,151 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 17 años (386 casos atendidos).

Figura 1. Edad de ingreso según sexo


| |  Años |  Años | Los hombres ingresaron a tratamiento ligeramente a mayor edad que las mujeres. |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Rango | 9 a 73 | 11 a 73 | |
| Promedio (Desviación estándar) | 27.0 (10.2) | 26.1 (10.2) | |
| Mediana | 25 | 24 | |
| Moda | 17 | 19 | |
| Decil₁ | 16 | 16 | |

^a Cfr., Cuadros 1 a 8.

Estado civil. Más de la mitad de la población refirió ser soltera (59.1%), mientras que 17.2% indicó que vivía en unión libre, 12.2% eran casados y 9.3% separados.


Figura 2. Estado civil según sexo

Más mujeres que hombres tenían una relación de pareja en unión libre, se habían separado, divorciado o eran viudas; mientras que mayor proporción de hombres estaban casados.



Escolaridad. 35.2% de la población había cursado algún grado de bachillerato, 34.7% algún grado de educación secundaria, 17.7% tenía estudios superiores y 8.7% sólo había cursado la primaria.


Figura 3. Escolaridad según sexo



Las mujeres cuentan, en mayor proporción que los hombres, con estudios superiores.

Ocupación. 47.5% desempeñaba alguna actividad laboral, 30.0% estaba desempleado y 12.9% reportó ser estudiante.


Figura 4. Principal ocupación según sexo



Estrato social. De acuerdo con la percepción de los terapeutas, la mitad de los pacientes (50.5%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 25.4% en un nivel bajo y 19.0% fue clasificado en el estrato medio.

Figura 5. Estrato social según sexo


Según la percepción de los terapeutas, tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando el estrato medio bajo.



FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO^b


Motivos de consulta. 48.3% de las personas atendidas reportaron más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que el 1.0% no expresó ninguno. 86.3% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 47.1% por uso de bebidas alcohólicas y 36.5% por uso de tabaco.

Figura 6. Motivos de consulta según sexo



Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 27.2% de los casos expresaron dos o más condicionantes para solicitar tratamiento; principalmente acuden por: iniciativa propia (53.1%), recomendación familiar (49.4%), condicionamiento legal (10.6%) e indicación médica (6.9%).


Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo



^b Cfr. Cuadros 9 a 12.

Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. 30.7% de los pacientes intentaron interrumpir el consumo voluntariamente, 18.4% estuvieron internados en algún anexo, 8.7% acudieron a algún grupo de ayuda mutua, 8.1% acudieron a tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico de tipo ambulatorio y 6.9% realizaron juramento. Cabe señalar que 21.3% no había tomado ninguna medida para dejar el consumo de drogas, mientras que 15.1% intentó al menos dos de las acciones señaladas.


Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo



El porcentaje de mujeres que no habían intentado dejar el consumo de drogas previo al ingreso a CIJ o bien que habían acudido a tratamientos psiquiátricos o psicoterapéuticos ambulatorios, es superior al de los hombres. No obstante, ellos en mayor proporción intentaron dejar de consumir de manera voluntaria, se internaron en algún anexo, participaron en grupos de ayuda mutua o realizaron juramento.

Problemas asociados al consumo de sustancias. 82.6% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 55.5% psicológicos, 50.9% de salud, 33.0% laborales, 20.6% legales, 18.5% escolares, 13.7% de conducta antisocial o delictiva y 17.0% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 79.8% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.3% no reportó ninguno.

Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo



Los problemas familiares son los más frecuentemente relacionados al consumo de drogas entre hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres reportaron en mayor proporción que los hombres, problemas psicológicos, de salud y escolares; mientras que los hombres rebasan el porcentaje de mujeres, al referir problemas de tipo laboral, legal, conducta antisocial o delictiva y accidentes o lesiones.

CONSUMO DE DROGAS^c

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco fue a los 15.2 años (DE =4.1 años), mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 15.3 años (DE =3.4 años), la mediana y la moda de ambas sustancias fue a los 15 años. Mientras que, la edad promedio de inicio del uso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 17.5 años (DE =6.3 años), con una mediana de 16 y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que de tabaco y alcohol fue a los 12 años, mientras que de drogas ilícitas se presenta a los 13 años de edad.

Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo


| |  Años | | |  Años | | |
|--|---|----------------|------------------------|---|----------------|------------------------|
| | Tabaco | Alcohol | Drogas ilícitas | Tabaco | Alcohol | Drogas ilícitas |
| Promedio (Desviación estándar) | 15.1 (3.9) | 15.2 (3.3) | 17.0 (5.6) | 15.8 (4.7) | 15.6 (3.8) | 19.3 (8.2) |
| Mediana | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 |
| Moda | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Decil₁ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |

Hombres y mujeres no presentan diferencias en la edad de inicio del consumo de tabaco y alcohol. Si bien, las mujeres, iniciaron el consumo de drogas ilícitas a mayor edad que los hombres.

^c Cfr., Cuadros 13 a 35

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias de inicio más reportadas fueron: marihuana (67.6%); cocaína en forma de polvo blanco (11.1%) y de crack (2.3%); estimulantes (9.8%), donde destacan las metanfetaminas (9.2%); seguidos por los inhalables (5.9%), mayormente en forma de solventes y removedores (4.4%); los depresores con utilidad médica como las benzodiazepinas (2.0%); y los opiáceos (0.4%), entre los cuales sobresalen los opioides sintéticos (12 casos) y la heroína (8 casos).

Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo



Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento transcurrió de la siguiente manera: tabaco, 11.6 años (DE=9.5 años), alcohol 11.9 años (DE=9.6 años) y drogas ilícitas 9.3 años (DE =8.7 años).


Cabe señalar que la mitad de los usuarios de alcohol y de los usuarios de tabaco dejaron pasar nueve y diez años, respectivamente, desde que iniciaron el consumo hasta que acudieron a solicitar tratamiento; en tanto que los usuarios de drogas dejaron pasar siete años.

Figura 12. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

| |  Años | | |  Años | | |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------------|--|----------------|------------------------|
| | Tabaco | Alcohol | Drogas ilícitas | Tabaco | Alcohol | Drogas ilícitas |
| Promedio (Desviación estándar) | 12.0 (9.6) | 12.3 (9.8) | 9.9 (9.0) | 10.0 (8.6) | 10.2 (8.7) | 6.8 (6.9) |
| Mediana | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| Moda | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Decil₁ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |


Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, 60.4% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 23.8% con consumo disfuncional, 8.6% con consumo social u ocasional, 3.3% con consumo experimental y 3.9% presentaba remisión del consumo.



Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.5 drogas (96.5% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.5 drogas (91.1% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.2 drogas (69.1% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.7 drogas (69.2% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.9 drogas (50.8% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.0 droga (23.9% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 14. Promedio de drogas consumidas según sexo




Mujeres y hombres han consumido prácticamente el mismo número de sustancias.

Consumo de drogas alguna vez en la vida.^d Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias en seguimiento fueron: alcohol (89.2%), tabaco (85.0%), *cannabis* (81.4%), estimulantes (52.5%), cocaína (51.8%), inhalables (19.1%), depresores (15.4%), drogas alucinógenas y disociativas (14.1%), opiáceos (3.4%) y otras sustancias de abuso (2.5%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (81.4%), cocaína en polvo (45.9%), metanfetaminas (49.1%), *crack* (20.7%), benzodiacepinas (14.9%), solventes y removedores (14.2%) y LSD (12.0%); en menor proporción se reportó el consumo de *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (7.0%), pegamentos (5.1%), plantas alucinógenas y derivados (5.0%) y hachís (4.4%).

Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo




Los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de tabaco, alcohol, marihuana, inhalables, cocaína, crack y metanfetaminas. Ellas reportaron en mayor proporción el consumo de benzodiacepinas y éxtasis.

^d Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 98.7% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (81.8%), tabaco (76.0%), cannabis (63.1%), estimulantes (46.2%), cocaína (34.1%), inhalables (11.0%), depresores (10.3%), drogas alucinógenas y disociativas (7.8%); opiáceos (2.1%) y otras sustancias de abuso (1.7%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores, destacaron: marihuana (63.1%), metanfetaminas (43.8%), cocaína en polvo (28.4%), crack (13.2%), benzodiacepinas (10.0%) y solventes y removedores (8.5%) y LSD (6.9%).


Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y marihuana; las mujeres usaron en mayor proporción que los hombres: éxtasis, benzodiacepinas, alucinógenos y heroína, mientras que los hombres superaron en la frecuencia del uso de las demás sustancias.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: mariguana (31.2%), metanfetaminas (25.8%), alcohol (18.1%) y tabaco (9.1%).


Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo



Los hombres reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el uso de mariguana, cocaína en polvo, crack y heroína; mientras que en las mujeres la preferencia fue mayor que en los hombres por el tabaco, alcohol, inhalables, metanfetaminas, benzodiacepinas, éxtasis y alucinógenos.

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses. Las principales sustancias reportadas por los pacientes a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: metanfetaminas (35.9%), mariguana (23.5%) y alcohol (16.1%); en menor medida se mencionó al crack (5.9%), cocaína en polvo (5.4%) y tabaco (4.3%).


Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo



Las metanfetaminas son las principales sustancias por las que solicitan tratamiento hombres y mujeres; ellos acuden más por problemas asociados al consumo de marihuana, cocaína, crack y heroína; ellas acuden por lo que les ocasiona el uso de tabaco, alcohol, inhalables, metanfetaminas, éxtasis, benzodicepinas y alucinógenos.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.^e Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, la mitad de la población (51.1%) reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo



Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el uso de dos o más sustancias (no se incluye el consumo de tabaco) en un mismo día.


^e No se toman en cuenta 1,119 casos (18.5%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 17.8% de los hombres y 21.2% de las mujeres (ver anexo, cuadro 29).

Consumo de drogas en los últimos 30 días. Incluyendo alcohol y tabaco, 89.8% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las prevalencias de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (62.8%), alcohol (57.6%), cannabis (40.2%), estimulantes (29.8%), cocaína (14.6%), depresores (4.8%), inhalables (4.7%), drogas alucinógenas y disociativas (1.8%), opiáceos (1.3%) y otras sustancias de abuso (0.9%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 40.2%, seguida de metanfetaminas (28.9%), cocaína (9.8%) y crack (6.5%); en menor proporción se registró el consumo de benzodiacepinas (4.7%), solventes y removedores (3.8%) y LSD (1.4%).


Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo



Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol, marihuana—los hombres en mayor proporción—. Las mujeres predominaron en el consumo de éxtasis y benzodiacepinas.

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 44.3% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Asimismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (33.9%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana o una o dos veces a la semana (32.5%). Por otra parte, 44.9% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 19.9% una a dos veces a la semana, 17.8% menos de una vez a la semana y 17.4% cada tercer día.

Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



En general, los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso de drogas ilícitas, tabaco y alcohol que las mujeres.

REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado de http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/info_sisvea/informes_sisvea_2006.pdf
5. Ortiz A, Martínez R., Meza D. (2019). Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 63, Noviembre de 2017. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México. Recuperado de http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep_63_pdf.pdf
6. Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019). *Observatorio Mexicano de Drogas*. Recuperado de <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/observatorio-mexicano-de-drogas-omd>
7. García-Aurrecochea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Díaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de*

- estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007.* México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
8. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. Recuperado de <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
 9. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 10. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 11. García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
 12. Gutiérrez López, AD. (2019). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2º semestre de 2004 al 1er semestre de 2020. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 20-09e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/20-09e.pdf>
 13. Gutiérrez, A. D. (2019). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2º semestre de 2004 al 1er semestre de 2020. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 20-09f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/20-09f.pdf>
 14. Gutiérrez, A. D. (2019). *Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2º semestre de 2004 al 1er semestre de 2020. (Nivel nacional y entidades*

- federativas*) [Informe de Investigación 20-09g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/20-09g.pdf>
15. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 16. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 17. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
 18. Gutiérrez, A. D. (2019). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Tabaco y alcohol. Segundo semestre del 2018.* (Informe de Investigación 20-09d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/20-09d.pdf>
 19. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.* México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
 20. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
 21. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol.*

México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

22. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
23. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
24. Centros de Integración Juvenil, A.C. (2019). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2018*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/Index.html>

Cuadros

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)

| CIJ | General | | Hombres | | Mujeres | | Razón H:M |
|---------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % | |
| Álvaro Obregón Norte | 55 | 0.9 | 46 | 1.0 | 9 | 0.7 | 5.1 : 1 |
| Álvaro Obregón Oriente | 32 | 0.5 | 28 | 0.6 | 4 | 0.3 | 7.0 : 1 |
| Atizapán | 34 | 0.6 | 29 | 0.6 | 5 | 0.4 | 5.8 : 1 |
| Azcapotzalco | 43 | 0.7 | 37 | 0.8 | 6 | 0.5 | 6.2 : 1 |
| Benito Juárez | 55 | 0.9 | 43 | 0.9 | 12 | 1.0 | 3.6 : 1 |
| Chalco | 61 | 1.0 | 48 | 1.0 | 13 | 1.1 | 3.7 : 1 |
| Coyoacán | 71 | 1.2 | 64 | 1.3 | 7 | 0.6 | 9.1 : 1 |
| Cuajimalpa | 25 | 0.4 | 19 | 0.4 | 6 | 0.5 | 3.2 : 1 |
| Cuauhtémoc Oriente | 76 | 1.3 | 58 | 1.2 | 18 | 1.5 | 3.2 : 1 |
| Cuauhtémoc Poniente | 74 | 1.2 | 53 | 1.1 | 21 | 1.7 | 2.5 : 1 |
| Ecatepec | 113 | 1.9 | 90 | 1.9 | 23 | 1.9 | 3.9 : 1 |
| Gustavo A. Madero Aragón | 97 | 1.6 | 78 | 1.6 | 19 | 1.6 | 4.1 : 1 |
| Gustavo A. Madero Norte | 60 | 1.0 | 51 | 1.1 | 9 | 0.7 | 5.7 : 1 |
| Gustavo A. Madero Oriente | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1.0 : 1 |
| Iztapalapa Oriente | 246 | 4.1 | 202 | 4.2 | 44 | 3.6 | 4.6 : 1 |
| Iztapalapa Poniente | 43 | 0.7 | 37 | 0.8 | 6 | 0.5 | 6.2 : 1 |
| Miguel Hidalgo | 59 | 1.0 | 42 | 0.9 | 17 | 1.4 | 2.5 : 1 |
| Naucalpan | 30 | 0.5 | 24 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4.0 : 1 |
| Nezahualcóyotl | 127 | 2.1 | 103 | 2.1 | 24 | 2.0 | 4.3 : 1 |
| Texcoco | 54 | 0.9 | 47 | 1.0 | 7 | 0.6 | 6.7 : 1 |
| Tlalnepantla | 101 | 1.7 | 82 | 1.7 | 19 | 1.6 | 4.3 : 1 |
| Tlalpan | 88 | 1.5 | 74 | 1.5 | 14 | 1.1 | 5.3 : 1 |
| Venustiano Carranza | 71 | 1.2 | 57 | 1.2 | 14 | 1.1 | 4.1 : 1 |
| Xochimilco | 4 | 0.1 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3.0 : 1 |
| UH Ecatepec | 25 | 0.4 | 25 | 0.5 | 0 | 0.0 | --- |
| UH Iztapalapa | 41 | 0.7 | 35 | 0.7 | 6 | 0.5 | 5.8 : 1 |
| UH Naucalpan | 12 | 0.2 | 10 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5.0 : 1 |
| Acapulco | 66 | 1.1 | 47 | 1.0 | 19 | 1.6 | 2.5 : 1 |
| Aguascalientes | 130 | 2.2 | 104 | 2.2 | 26 | 2.1 | 4.0 : 1 |
| Apodaca | 9 | 0.1 | 6 | 0.1 | 3 | 0.2 | 2.0 : 1 |
| Cancún | 32 | 0.5 | 24 | 0.5 | 8 | 0.7 | 3.0 : 1 |
| Cd. del Carmen | 19 | 0.3 | 18 | 0.4 | 1 | 0.1 | 18.0 : 1 |
| Cd. Juárez Norte | 84 | 1.4 | 63 | 1.3 | 21 | 1.7 | 3.0 : 1 |
| Cd. Victoria | 8 | 0.1 | 7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 7.0 : 1 |
| Celaya | 105 | 1.7 | 86 | 1.8 | 19 | 1.6 | 4.5 : 1 |
| Chetumal | 16 | 0.3 | 12 | 0.2 | 4 | 0.3 | 3.0 : 1 |

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

| CIJ | General | | Hombres | | Mujeres | | Razón H:M |
|---------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % | |
| Chihuahua | 133 | 2.2 | 109 | 2.3 | 24 | 2.0 | 4.5 : 1 |
| Chilpancingo | 28 | 0.5 | 23 | 0.5 | 5 | 0.4 | 4.6 : 1 |
| Colima | 88 | 1.5 | 67 | 1.4 | 21 | 1.7 | 3.2 : 1 |
| Cozumel | 41 | 0.7 | 38 | 0.8 | 3 | 0.2 | 12.7 : 1 |
| Cuernavaca | 78 | 1.3 | 65 | 1.3 | 13 | 1.1 | 5.0 : 1 |
| Culiacán | 75 | 1.2 | 64 | 1.3 | 11 | 0.9 | 5.8 : 1 |
| Durango | 34 | 0.6 | 22 | 0.5 | 12 | 1.0 | 1.8 : 1 |
| Escuinapa | 30 | 0.5 | 22 | 0.5 | 8 | 0.7 | 2.8 : 1 |
| Fresnillo | 52 | 0.9 | 41 | 0.8 | 11 | 0.9 | 3.7 : 1 |
| Guadalajara Centro | 116 | 1.9 | 98 | 2.0 | 18 | 1.5 | 5.4 : 1 |
| Guadalajara Sur | 53 | 0.9 | 41 | 0.8 | 12 | 1.0 | 3.4 : 1 |
| Guadalupe | 46 | 0.8 | 35 | 0.7 | 11 | 0.9 | 3.2 : 1 |
| Guadalupe Zacatecas | 10 | 0.2 | 6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 1.5 : 1 |
| Guamúchil | 30 | 0.5 | 27 | 0.6 | 3 | 0.2 | 9.0 : 1 |
| Guasave | 61 | 1.0 | 44 | 0.9 | 17 | 1.4 | 2.6 : 1 |
| Hermosillo | 51 | 0.8 | 41 | 0.8 | 10 | 0.8 | 4.1 : 1 |
| Huatulco | 17 | 0.3 | 14 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4.7 : 1 |
| Ixtapa Zihuatanejo | 34 | 0.6 | 27 | 0.6 | 7 | 0.6 | 3.9 : 1 |
| La Paz | 25 | 0.4 | 15 | 0.3 | 10 | 0.8 | 1.5 : 1 |
| La Piedad | 71 | 1.2 | 47 | 1.0 | 24 | 2.0 | 2.0 : 1 |
| Laguna Durango | 38 | 0.6 | 29 | 0.6 | 9 | 0.7 | 3.2 : 1 |
| León | 185 | 3.1 | 167 | 3.5 | 18 | 1.5 | 9.3 : 1 |
| Los Cabos | 60 | 1.0 | 55 | 1.1 | 5 | 0.4 | 11.0 : 1 |
| Los Mochis | 113 | 1.9 | 106 | 2.2 | 7 | 0.6 | 15.1 : 1 |
| Manzanillo | 26 | 0.4 | 21 | 0.4 | 5 | 0.4 | 4.2 : 1 |
| Mazatlán | 66 | 1.1 | 45 | 0.9 | 21 | 1.7 | 2.1 : 1 |
| Mérida | 25 | 0.4 | 16 | 0.3 | 9 | 0.7 | 1.8 : 1 |
| Mexicali | 59 | 1.0 | 35 | 0.7 | 24 | 2.0 | 1.5 : 1 |
| Monterrey | 127 | 2.1 | 104 | 2.2 | 23 | 1.9 | 4.5 : 1 |
| Morelia | 58 | 1.0 | 46 | 1.0 | 12 | 1.0 | 3.8 : 1 |
| Nogales | 76 | 1.3 | 42 | 0.9 | 34 | 2.8 | 1.2 : 1 |
| Oaxaca | 61 | 1.0 | 54 | 1.1 | 7 | 0.6 | 7.7 : 1 |
| Pachuca | 81 | 1.3 | 64 | 1.3 | 17 | 1.4 | 3.8 : 1 |
| Piedras Negras | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | --- |
| Playa del Carmen | 33 | 0.5 | 26 | 0.5 | 7 | 0.6 | 3.7 : 1 |
| Poza Rica | 17 | 0.3 | 14 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4.7 : 1 |
| Puebla | 39 | 0.6 | 34 | 0.7 | 5 | 0.4 | 6.8 : 1 |
| Puerto Vallarta | 40 | 0.7 | 33 | 0.7 | 7 | 0.6 | 4.7 : 1 |
| Querétaro | 79 | 1.3 | 61 | 1.3 | 18 | 1.5 | 3.4 : 1 |

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

| CIJ | General | | Hombres | | Mujeres | | Razón H:M |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % | |
| Ramos Arizpe | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0 | 0.0 | --- |
| Reynosa | 11 | 0.2 | 8 | 0.2 | 3 | 0.2 | 2.7 |
| Salamanca | 27 | 0.4 | 25 | 0.5 | 2 | 0.2 | 12.5 |
| Saltillo | 132 | 2.2 | 100 | 2.1 | 32 | 2.6 | 3.1 |
| San Luis Potosí | 58 | 1.0 | 50 | 1.0 | 8 | 0.7 | 6.3 |
| San Nicolás de los Garza | 60 | 1.0 | 47 | 1.0 | 13 | 1.1 | 3.6 |
| Tampico | 47 | 0.8 | 35 | 0.7 | 12 | 1.0 | 2.9 |
| Tapachula | 23 | 0.4 | 17 | 0.4 | 6 | 0.5 | 2.8 |
| Tecomán | 51 | 0.8 | 45 | 0.9 | 6 | 0.5 | 7.5 |
| Tehuacán | 47 | 0.8 | 38 | 0.8 | 9 | 0.7 | 4.2 |
| Tepic | 24 | 0.4 | 19 | 0.4 | 5 | 0.4 | 3.8 |
| Tijuana Guaycura | 123 | 2.0 | 79 | 1.6 | 44 | 3.6 | 1.8 |
| Tijuana Soler | 100 | 1.7 | 71 | 1.5 | 29 | 2.4 | 2.4 |
| Tlaquepaque | 89 | 1.5 | 76 | 1.6 | 13 | 1.1 | 5.8 |
| Tlaxcala | 32 | 0.5 | 28 | 0.6 | 4 | 0.3 | 7.0 |
| Toluca | 96 | 1.6 | 77 | 1.6 | 19 | 1.6 | 4.1 |
| Torreón Oriente | 121 | 2.0 | 94 | 1.9 | 27 | 2.2 | 3.5 |
| Tuxtla Gutiérrez | 31 | 0.5 | 29 | 0.6 | 2 | 0.2 | 14.5 |
| Villa Victoria | 9 | 0.1 | 7 | 0.1 | 2 | 0.2 | 3.5 |
| Villahermosa | 33 | 0.5 | 24 | 0.5 | 9 | 0.7 | 2.7 |
| Xalapa | 75 | 1.2 | 60 | 1.2 | 15 | 1.2 | 4.0 |
| Yucatán | 38 | 0.6 | 25 | 0.5 | 13 | 1.1 | 1.9 |
| Zacatecas | 59 | 1.0 | 47 | 1.0 | 12 | 1.0 | 3.9 |
| Zamora | 80 | 1.3 | 69 | 1.4 | 11 | 0.9 | 6.3 |
| Zapopan Norte | 119 | 2.0 | 92 | 1.9 | 27 | 2.2 | 3.4 |
| UH Cd. Juárez | 17 | 0.3 | 13 | 0.3 | 4 | 0.3 | 3.3 |
| UH Culiacán | 11 | 0.2 | 11 | 0.2 | 0 | 0.0 | --- |
| UH Ixbalanqué | 15 | 0.2 | 13 | 0.3 | 2 | 0.2 | 6.5 |
| UH Nuevo León | 37 | 0.6 | 24 | 0.5 | 13 | 1.1 | 1.8 |
| UH Punta Diamante | 17 | 0.3 | 17 | 0.4 | 0 | 0.0 | --- |
| UH Tijuana | 12 | 0.2 | 11 | 0.2 | 1 | 0.1 | 11.0 |
| UH Zapopan | 10 | 0.2 | 8 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4.0 |
| UH Zapotlán el Grande | 3 | 0.0 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | --- |
| UTUH Cd. Juárez | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | --- |
| UTUH Tijuana | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0 | 0.0 | --- |
| Total | 6,042 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 4.0 : 1 |

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Cuadro 2. Sexo

| | Frec. | % | Razón H:M |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Hombres | 4,824 | 79.8 | |
| Mujeres | 1,218 | 20.2 | 4.0 : 1 |
| Total | 6,042 | 100.0 | |

Cuadro 3. Persona que proporciona la información

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Usuario de drogas | 4,077 | 67.5 | 3,198 | 66.3 | 879 | 72.2 |
| Usuario de drogas y familiares u otras personas | 1,965 | 32.5 | 1,626 | 33.7 | 339 | 27.8 |
| Total | 6,042 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 1,218 | 100.0 |

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|---------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Hasta 9 años | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 a 14 años | 205 | 3.4 | 3.4 | 155 | 3.2 | 3.2 | 50 | 4.1 | 4.1 |
| 15 a 19 años | 1,526 | 25.3 | 25.3 | 1,217 | 25.2 | 25.2 | 309 | 25.4 | 25.4 |
| 20 a 24 años | 1,271 | 21.0 | 21.0 | 979 | 20.3 | 20.3 | 292 | 24.0 | 24.0 |
| 25 a 29 años | 1,037 | 17.2 | 17.2 | 818 | 17.0 | 17.0 | 219 | 18.0 | 18.0 |
| 30 a 34 años | 737 | 12.2 | 12.2 | 604 | 12.5 | 12.5 | 133 | 10.9 | 10.9 |
| 35 a 39 años | 515 | 8.5 | 8.5 | 425 | 8.8 | 8.8 | 90 | 7.4 | 7.4 |
| 40 a 44 años | 326 | 5.4 | 5.4 | 275 | 5.7 | 5.7 | 51 | 4.2 | 4.2 |
| 45 años y más | 424 | 7.0 | 7.0 | 350 | 7.3 | 7.3 | 74 | 6.1 | 6.1 |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |
| Media (DE) | 26.8 (10.2) años | | | 27.0 (10.2) años | | | 26.1 (10.2) años | | |
| Mediana | 25 años | | | 25 años | | | 24 años | | |
| Moda | 17 años | | | 17 años | | | 19 años | | |
| Decil1 | 16 años | | | 16 años | | | 16 años | | |

DE= Desviación Estándar

Cuadro 5. Estado civil

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Soltero | 3,565 | 59.0 | 59.1 | 2,846 | 59.0 | 59.1 | 719 | 59.0 | 59.1 |
| Casado | 734 | 12.1 | 12.2 | 637 | 13.2 | 13.2 | 97 | 8.0 | 8.0 |
| Unión libre | 1,035 | 17.1 | 17.2 | 814 | 16.9 | 16.9 | 221 | 18.1 | 18.2 |
| Separado | 562 | 9.3 | 9.3 | 422 | 8.7 | 8.8 | 140 | 11.5 | 11.5 |
| Divorciado | 112 | 1.9 | 1.9 | 87 | 1.8 | 1.8 | 25 | 2.1 | 2.1 |
| Viudo | 24 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.2 | 0.2 | 14 | 1.1 | 1.2 |
| <i>Sin información</i> | 10 | 0.2 | <i>Se omite</i> | 8 | 0.2 | <i>Se omite</i> | 2 | 0.2 | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |

Cuadro 6. Escolaridad

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Ninguna (no sabe leer ni escribir) | 17 | 0.3 | 0.3 | 14 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.2 | 0.2 |
| Ninguna (sabe leer y escribir) | 13 | 0.2 | 0.2 | 8 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| Primaria incompleta | 165 | 2.7 | 2.7 | 135 | 2.8 | 2.8 | 30 | 2.5 | 2.5 |
| Primaria completa | 363 | 6.0 | 6.0 | 298 | 6.2 | 6.2 | 65 | 5.3 | 5.3 |
| Secundaria incompleta | 766 | 12.7 | 12.7 | 605 | 12.5 | 12.5 | 161 | 13.2 | 13.2 |
| Secundaria completa | 1,331 | 22.0 | 22.0 | 1,082 | 22.4 | 22.4 | 249 | 20.4 | 20.4 |
| Estudios técnicos o comerciales incompletos | 56 | 0.9 | 0.9 | 45 | 0.9 | 0.9 | 11 | 0.9 | 0.9 |
| Estudios técnicos o comerciales completos | 77 | 1.3 | 1.3 | 55 | 1.1 | 1.1 | 22 | 1.8 | 1.8 |
| Bachillerato incompleto | 1,317 | 21.8 | 21.8 | 1,085 | 22.5 | 22.5 | 232 | 19.0 | 19.0 |
| Bachillerato completo | 811 | 13.4 | 13.4 | 651 | 13.5 | 13.5 | 160 | 13.1 | 13.1 |
| Estudios superiores incompletos | 644 | 10.7 | 10.7 | 469 | 9.7 | 9.7 | 175 | 14.4 | 14.4 |
| Estudios superiores completos | 421 | 7.0 | 7.0 | 330 | 6.8 | 6.8 | 91 | 7.5 | 7.5 |
| Estudios de posgrado incompletos | 17 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| Estudios de posgrado completos | 44 | 0.7 | 0.7 | 35 | 0.7 | 0.7 | 9 | 0.7 | 0.7 |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |

Cuadro 7. Ocupación

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Desempleado(a) | 1,811 | 30.0 | 30.0 | 1,497 | 31.0 | 31.0 | 314 | 25.8 | 25.8 |
| Estudiante | 781 | 12.9 | 12.9 | 563 | 11.7 | 11.7 | 218 | 17.9 | 17.9 |
| Estudiante que trabaja | 242 | 4.0 | 4.0 | 199 | 4.1 | 4.1 | 43 | 3.5 | 3.5 |
| Trabaja | 2,872 | 47.5 | 47.5 | 2,484 | 51.5 | 51.5 | 388 | 31.9 | 31.9 |
| Tareas del hogar | 311 | 5.1 | 5.1 | 61 | 1.3 | 1.3 | 250 | 20.5 | 20.5 |
| Pensionado | 23 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| <i>Sin información</i> | 2 | 0.0 | <i>Se omite</i> | 2 | 0.0 | <i>Se omite</i> | 0 | 0.0 | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |

Cuadro 8. Estrato social

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Alto | 13 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.2 |
| Medio alto | 234 | 3.9 | 3.9 | 196 | 4.1 | 4.1 | 38 | 3.1 | 3.1 |
| Medio | 1,149 | 19.0 | 19.0 | 902 | 18.7 | 18.7 | 247 | 20.3 | 20.3 |
| Medio bajo | 3,052 | 50.5 | 50.5 | 2,453 | 50.8 | 50.9 | 599 | 49.2 | 49.2 |
| Bajo | 1,535 | 25.4 | 25.4 | 1,218 | 25.2 | 25.3 | 317 | 26.0 | 26.0 |
| Pobreza extrema o marginación | 56 | 0.9 | 0.9 | 43 | 0.9 | 0.9 | 13 | 1.1 | 1.1 |
| <i>Sin información</i> | 3 | 0.0 | <i>Se omite</i> | 2 | 0.0 | <i>Se omite</i> | 1 | 0.1 | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

Cuadro 9. Motivos de consulta

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|--|---------|------|---------|------|---------|------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Consumo de drogas ilícitas | 5,215 | 86.3 | 4,216 | 87.4 | 999 | 82.0 |
| Consumo de bebidas alcohólicas | 2,846 | 47.1 | 2,283 | 47.3 | 563 | 46.2 |
| Consumo de tabaco | 2,208 | 36.5 | 1,755 | 36.4 | 453 | 37.2 |
| Otro motivo | 178 | 2.9 | 136 | 2.8 | 42 | 3.4 |
| <i>Ningún motivo específico reportado</i> | 58 | 1.0 | 36 | 0.7 | 22 | 1.8 |
| <i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i> | 2,920 | 48.3 | 2,352 | 48.8 | 568 | 46.6 |

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|---|---------|------|---------|------|---------|------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Por propia iniciativa | 3,211 | 53.1 | 2,539 | 52.6 | 672 | 55.2 |
| Por condicionamiento o recomendación familiar | 2,982 | 49.4 | 2,461 | 51.0 | 521 | 42.8 |
| Por recomendación de pares | 98 | 1.6 | 68 | 1.4 | 30 | 2.5 |
| Por condicionamiento o recomendación escolar | 42 | 0.7 | 35 | 0.7 | 7 | 0.6 |
| Por condicionamiento legal | 641 | 10.6 | 512 | 10.6 | 129 | 10.6 |
| Por condicionamiento o recomendación laboral | 105 | 1.7 | 98 | 2.0 | 7 | 0.6 |
| Por indicación médica | 415 | 6.9 | 307 | 6.4 | 108 | 8.9 |
| Por solicitud de novia(o) | 24 | 0.4 | 22 | 0.5 | 2 | 0.2 |
| Otros condicionantes de solicitud de tratamiento | 205 | 3.4 | 129 | 2.7 | 76 | 6.2 |
| <i>Ningún condicionante reportado</i> | 87 | 1.4 | 75 | 1.6 | 12 | 1.0 |
| <i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i> | 1,643 | 27.2 | 1,316 | 27.3 | 327 | 26.8 |

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Juramento | 418 | 6.9 | 365 | 7.6 | 53 | 4.4 |
| Grupo de ayuda mutua | 528 | 8.7 | 441 | 9.1 | 87 | 7.1 |
| Internamiento en anexo | 1,114 | 18.4 | 969 | 20.1 | 145 | 11.9 |
| Intervención de emergencia | 66 | 1.1 | 52 | 1.1 | 14 | 1.1 |
| Programa de mantenimiento | 28 | 0.5 | 24 | 0.5 | 4 | 0.3 |
| Tratamiento médico no especializado | 48 | 0.8 | 36 | 0.7 | 12 | 1.0 |
| Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio | 490 | 8.1 | 374 | 7.8 | 116 | 9.5 |
| Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial | 131 | 2.2 | 104 | 2.2 | 27 | 2.2 |
| Medicina tradicional o alternativa | 27 | 0.4 | 23 | 0.5 | 4 | 0.3 |
| Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo | 1,853 | 30.7 | 1,489 | 30.9 | 364 | 29.9 |
| Otras acciones | 1,288 | 21.3 | 1,003 | 20.8 | 285 | 23.4 |
| <i>Ninguna acción previa reportada</i> | <i>1,284</i> | <i>21.3</i> | <i>975</i> | <i>20.2</i> | <i>309</i> | <i>25.4</i> |
| <i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i> | <i>910</i> | <i>15.1</i> | <i>759</i> | <i>15.7</i> | <i>151</i> | <i>12.4</i> |

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Problemas de salud | 3,074 | 50.9 | 2,435 | 50.5 | 639 | 52.5 |
| Accidentes o lesiones | 1,025 | 17.0 | 848 | 17.6 | 177 | 14.5 |
| Problemas familiares | 4,989 | 82.6 | 4,015 | 83.2 | 974 | 80.0 |
| Problemas escolares | 1,117 | 18.5 | 873 | 18.1 | 244 | 20.0 |
| Problemas laborales | 1,993 | 33.0 | 1,744 | 36.2 | 249 | 20.4 |
| Problemas psicológicos | 3,351 | 55.5 | 2,604 | 54.0 | 747 | 61.3 |
| Problemas legales | 1,243 | 20.6 | 1,087 | 22.5 | 156 | 12.8 |
| Conducta antisocial o delictiva | 830 | 13.7 | 724 | 15.0 | 106 | 8.7 |
| Otros problemas | 338 | 5.6 | 245 | 5.1 | 93 | 7.6 |
| <i>Ningún problema asociado reportado</i> | <i>257</i> | <i>4.3</i> | <i>203</i> | <i>4.2</i> | <i>54</i> | <i>4.4</i> |
| <i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i> | <i>4,824</i> | <i>79.8</i> | <i>3,874</i> | <i>80.3</i> | <i>950</i> | <i>78.0</i> |

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Hasta 9 años | 174 | 2.9 | 3.4 | 146 | 3.0 | 3.5 | 28 | 2.3 | 2.7 |
| 10 a 14 años | 2,099 | 34.7 | 40.9 | 1,703 | 35.3 | 41.4 | 396 | 32.5 | 38.9 |
| 15 a 19 años | 2,430 | 40.2 | 47.3 | 1,952 | 40.5 | 47.4 | 478 | 39.2 | 46.9 |
| 20 a 24 años | 287 | 4.8 | 5.6 | 218 | 4.5 | 5.3 | 69 | 5.7 | 6.8 |
| 25 a 29 años | 76 | 1.3 | 1.5 | 50 | 1.0 | 1.2 | 26 | 2.1 | 2.6 |
| 30 a 34 años | 30 | 0.5 | 0.6 | 20 | 0.4 | 0.5 | 10 | 0.8 | 1.0 |
| 35 a 39 años | 15 | 0.2 | 0.3 | 10 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.4 | 0.5 |
| 40 a 44 años | 14 | 0.2 | 0.3 | 10 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.3 | 0.4 |
| 45 años y más | 8 | 0.1 | 0.2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0.3 |
| <i>No consumió</i> | <i>904</i> | <i>15.0</i> | <i>Se omite</i> | <i>706</i> | <i>14.6</i> | <i>Se omite</i> | <i>198</i> | <i>16.3</i> | <i>Se omite</i> |
| <i>Sin información</i> | <i>5</i> | <i>0.1</i> | <i>Se omite</i> | <i>4</i> | <i>0.1</i> | <i>Se omite</i> | <i>1</i> | <i>0.1</i> | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |
| Media (DE) | 15.2 (4.1) años | | | 15.1 (3.9) años | | | 15.8 (4.7) años | | |
| Mediana | 15 años | | | 15 años | | | 15 años | | |
| Moda | 15 años | | | 15 años | | | 15 años | | |
| Decil1 | 12 años | | | 12 años | | | 12 años | | |

DE= Desviación Estándar

Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Hasta 9 años | 167 | 2.8 | 3.1 | 134 | 2.8 | 3.1 | 33 | 2.7 | 3.0 |
| 10 a 14 años | 1,900 | 31.4 | 35.3 | 1,536 | 31.8 | 35.7 | 364 | 29.9 | 33.6 |
| 15 a 19 años | 2,931 | 48.5 | 54.4 | 2,350 | 48.7 | 54.6 | 581 | 47.7 | 53.7 |
| 20 a 24 años | 280 | 4.6 | 5.2 | 214 | 4.4 | 5.0 | 66 | 5.4 | 6.1 |
| 25 a 29 años | 76 | 1.3 | 1.4 | 45 | 0.9 | 1.0 | 31 | 2.5 | 2.9 |
| 30 a 34 años | 19 | 0.3 | 0.4 | 15 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 0.4 |
| 35 a 39 años | 3 | 0.0 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 a 44 años | 5 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 |
| 45 años y más | 3 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| <i>No consumió</i> | <i>655</i> | <i>10.8</i> | <i>Se omite</i> | <i>519</i> | <i>10.8</i> | <i>Se omite</i> | <i>136</i> | <i>11.2</i> | <i>Se omite</i> |
| <i>Sin información</i> | <i>3</i> | <i>0.0</i> | <i>Se omite</i> | <i>3</i> | <i>0.1</i> | <i>Se omite</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |
| Media (DE) | 15.3 (3.4) años | | | 15.2 (3.3) años | | | 15.6 (3.8) años | | |
| Mediana | 15 años | | | 15 años | | | 15 años | | |
| Moda | 15 años | | | 15 años | | | 15 años | | |
| Decil1 | 12 años | | | 12 años | | | 12 años | | |

DE= Desviación Estándar

Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Hasta 9 años | 76 | 1.3 | 1.3 | 67 | 1.4 | 1.4 | 9 | 0.7 | 0.7 |
| 10 a 14 años | 1,746 | 28.9 | 29.0 | 1,439 | 29.8 | 29.9 | 307 | 25.2 | 25.4 |
| 15 a 19 años | 2,930 | 48.5 | 48.7 | 2,399 | 49.7 | 49.9 | 531 | 43.6 | 43.9 |
| 20 a 24 años | 664 | 11.0 | 11.0 | 514 | 10.7 | 10.7 | 150 | 12.3 | 12.4 |
| 25 a 29 años | 270 | 4.5 | 4.5 | 183 | 3.8 | 3.8 | 87 | 7.1 | 7.2 |
| 30 a 34 años | 144 | 2.4 | 2.4 | 91 | 1.9 | 1.9 | 53 | 4.4 | 4.4 |
| 35 a 39 años | 91 | 1.5 | 1.5 | 65 | 1.3 | 1.4 | 26 | 2.1 | 2.1 |
| 40 a 44 años | 42 | 0.7 | 0.7 | 22 | 0.5 | 0.5 | 20 | 1.6 | 1.7 |
| 45 años y más | 55 | 0.9 | 0.9 | 28 | 0.6 | 0.6 | 27 | 2.2 | 2.2 |
| <i>Sin información</i> | 24 | 0.4 | <i>Se omite</i> | 16 | 0.3 | <i>Se omite</i> | 8 | 0.7 | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |
| Media (DE) | 17.5 (6.3) años | | | 17.0 (5.6) años | | | 19.3 (8.2) años | | |
| Mediana | 16 años | | | 16 años | | | 17 años | | |
| Moda | 15 años | | | 15 años | | | 15 años | | |
| Decil1 | 13 años | | | 12 años | | | 13 años | | |

DE= Desviación Estándar

Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio, según menciones

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Mariguana | 4,082 | 67.6 | 3,325 | 68.9 | 757 | 62.2 |
| Hachís | 5 | 0.1 | 4 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Cocaína en polvo blanco | 669 | 11.1 | 569 | 11.8 | 100 | 8.2 |
| <i>Crack</i> | 138 | 2.3 | 116 | 2.4 | 22 | 1.8 |
| Otra presentación de cocaína | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Solventes y removedores | 263 | 4.4 | 217 | 4.5 | 46 | 3.8 |
| Pegamentos | 61 | 1.0 | 40 | 0.8 | 21 | 1.7 |
| Esmaltes o pinturas | 28 | 0.5 | 23 | 0.5 | 5 | 0.4 |
| Otros inhalables | 6 | 0.1 | 5 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Benzodiazepinas | 118 | 2.0 | 50 | 1.0 | 68 | 5.6 |
| <i>Rohypno</i> [®] | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Otros depresores del SNC | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Anfetamina | 19 | 0.3 | 13 | 0.3 | 6 | 0.5 |
| Metanfetaminas | 553 | 9.2 | 393 | 8.1 | 160 | 13.1 |
| Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas | 17 | 0.3 | 13 | 0.3 | 4 | 0.3 |
| Otros estimulantes del SNC | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| LSD | 13 | 0.2 | 8 | 0.2 | 5 | 0.4 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| Otras drogas alucinógenas y disociativas | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Heroína | 8 | 0.1 | 7 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Opioides sintéticos | 12 | 0.2 | 7 | 0.1 | 5 | 0.4 |
| Opio y otros opiáceos | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| Sustancias con utilidad médica | 10 | 0.2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.4 |
| Otras sustancias de abuso | 19 | 0.3 | 9 | 0.2 | 10 | 0.8 |
| Total | 6,042 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 1,218 | 100.0 |

Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| < de un año | 134 | 2.2 | 2.6 | 106 | 2.2 | 2.6 | 28 | 2.3 | 2.7 |
| 1 a 5 años | 1,521 | 25.2 | 29.6 | 1,166 | 24.2 | 28.3 | 355 | 29.1 | 34.8 |
| 6 a 10 años | 1,197 | 19.8 | 23.3 | 925 | 19.2 | 22.5 | 272 | 22.3 | 26.7 |
| 11 a 15 años | 853 | 14.1 | 16.6 | 702 | 14.6 | 17.1 | 151 | 12.4 | 14.8 |
| 16 a 20 años | 555 | 9.2 | 10.8 | 466 | 9.7 | 11.3 | 89 | 7.3 | 8.7 |
| 21 a 25 años | 398 | 6.6 | 7.8 | 331 | 6.9 | 8.0 | 67 | 5.5 | 6.6 |
| 26 o más años | 475 | 7.9 | 9.3 | 418 | 8.7 | 10.2 | 57 | 4.7 | 5.6 |
| <i>No consumió</i> | <i>904</i> | <i>15.0</i> | <i>Se omite</i> | <i>706</i> | <i>14.6</i> | <i>Se omite</i> | <i>198</i> | <i>16.3</i> | <i>Se omite</i> |
| <i>Sin información</i> | <i>5</i> | <i>0.1</i> | <i>Se omite</i> | <i>4</i> | <i>0.1</i> | <i>Se omite</i> | <i>1</i> | <i>0.1</i> | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |
| Media (DE) | 11.6 (9.5) años | | | 12.0 (9.6) años | | | 10.0 (8.6) años | | |
| Mediana | 9 años | | | 10 años | | | 8 años | | |
| Moda | 2 años | | | 2 años | | | 2 años | | |
| Decil1 | 2 años | | | 2 años | | | 2 años | | |

DE= Desviación Estándar

Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| < de un año | 141 | 2.3 | 2.6 | 108 | 2.2 | 2.5 | 33 | 2.7 | 3.0 |
| 1 a 5 años | 1,555 | 25.7 | 28.9 | 1,199 | 24.9 | 27.9 | 356 | 29.2 | 32.9 |
| 6 a 10 años | 1,178 | 19.5 | 21.9 | 893 | 18.5 | 20.8 | 285 | 23.4 | 26.3 |
| 11 a 15 años | 936 | 15.5 | 17.4 | 775 | 16.1 | 18.0 | 161 | 13.2 | 14.9 |
| 16 a 20 años | 628 | 10.4 | 11.7 | 517 | 10.7 | 12.0 | 111 | 9.1 | 10.3 |
| 21 a 25 años | 422 | 7.0 | 7.8 | 351 | 7.3 | 8.2 | 71 | 5.8 | 6.6 |
| 26 o más años | 524 | 8.7 | 9.7 | 459 | 9.5 | 10.7 | 65 | 5.3 | 6.0 |
| <i>No consumió</i> | <i>655</i> | <i>10.8</i> | <i>Se omite</i> | <i>519</i> | <i>10.8</i> | <i>Se omite</i> | <i>136</i> | <i>11.2</i> | <i>Se omite</i> |
| <i>Sin información</i> | <i>3</i> | <i>0.0</i> | <i>Se omite</i> | <i>3</i> | <i>0.1</i> | <i>Se omite</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |
| Media (DE) | 11.9 (9.6) años | | | 12.3 (9.8) años | | | 10.2 (8.7) años | | |
| Mediana | 10 años | | | 10 años | | | 8 años | | |
| Moda | 2 años | | | 2 años | | | 2 años | | |
| Decil1 | 2 años | | | 2 años | | | 2 años | | |

DE= Desviación Estándar

Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| < de un año | 343 | 5.7 | 5.7 | 229 | 4.7 | 4.8 | 114 | 9.4 | 9.4 |
| 1 a 5 años | 2,286 | 37.8 | 38.0 | 1,725 | 35.8 | 35.9 | 561 | 46.1 | 46.4 |
| 6 a 10 años | 1,339 | 22.2 | 22.2 | 1,073 | 22.2 | 22.3 | 266 | 21.8 | 22.0 |
| 11 a 15 años | 849 | 14.1 | 14.1 | 708 | 14.7 | 14.7 | 141 | 11.6 | 11.7 |
| 16 a 20 años | 483 | 8.0 | 8.0 | 416 | 8.6 | 8.7 | 67 | 5.5 | 5.5 |
| 21 a 25 años | 359 | 5.9 | 6.0 | 326 | 6.8 | 6.8 | 33 | 2.7 | 2.7 |
| 26 o más años | 359 | 5.9 | 6.0 | 331 | 6.9 | 6.9 | 28 | 2.3 | 2.3 |
| <i>Sin información</i> | 24 | 0.4 | <i>Se omite</i> | 16 | 0.3 | <i>Se omite</i> | 8 | 0.7 | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |
| Media (DE) | 9.3 (8.7) años | | | 9.9 (9.0) años | | | 6.8 (6.9) años | | |
| Mediana | 7 años | | | 7 años | | | 5 años | | |
| Moda | 1 años | | | 1 años | | | 1 años | | |
| Decil1 | 1 años | | | 1 años | | | 1 años | | |

DE= Desviación Estándar

Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Experimental | 198 | 3.3 | 3.3 | 151 | 3.1 | 3.1 | 47 | 3.9 | 3.9 |
| Social u ocasional | 520 | 8.6 | 8.6 | 399 | 8.3 | 8.3 | 121 | 9.9 | 10.0 |
| Funcional | 3,635 | 60.2 | 60.4 | 2,908 | 60.3 | 60.5 | 727 | 59.7 | 60.1 |
| Disfuncional | 1,432 | 23.7 | 23.8 | 1,164 | 24.1 | 24.2 | 268 | 22.0 | 22.1 |
| En remisión | 234 | 3.9 | 3.9 | 187 | 3.9 | 3.9 | 47 | 3.9 | 3.9 |
| <i>Sin información</i> | 23 | 0.4 | <i>Se omite</i> | 15 | 0.3 | <i>Se omite</i> | 8 | 0.7 | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| 1 sustancia | 213 | 3.5 | 160 | 3.3 | 53 | 4.4 |
| 2 sustancias | 536 | 8.9 | 403 | 8.4 | 133 | 10.9 |
| 3 sustancias | 1,465 | 24.2 | 1,135 | 23.5 | 330 | 27.1 |
| 4 sustancias | 1,346 | 22.3 | 1,079 | 22.4 | 267 | 21.9 |
| 5 sustancias | 994 | 16.5 | 820 | 17.0 | 174 | 14.3 |
| 6 sustancias | 583 | 9.6 | 467 | 9.7 | 116 | 9.5 |
| 7 sustancias | 380 | 6.3 | 308 | 6.4 | 72 | 5.9 |
| 8 sustancias | 234 | 3.9 | 197 | 4.1 | 37 | 3.0 |
| 9 sustancias | 132 | 2.2 | 111 | 2.3 | 21 | 1.7 |
| 10 sustancias | 70 | 1.2 | 64 | 1.3 | 6 | 0.5 |
| 11-19 sustancias | 89 | 1.5 | 80 | 1.7 | 9 | 0.7 |
| Total | 6,042 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 1,218 | 100.0 |
| Media (DE) | 4.5 (2.1) drogas | | 4.5 (2.1) drogas | | 4.2 (2.0) drogas | |
| Mediana | 4 drogas | | 4 drogas | | 4 drogas | |
| Moda | 3 drogas | | 3 drogas | | 3 drogas | |
| Decil1 | 2 drogas | | 2 drogas | | 2 drogas | |

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| 1 sustancia | 1,858 | 30.8 | 1,405 | 29.1 | 453 | 37.2 |
| 2 sustancias | 1,566 | 25.9 | 1,261 | 26.1 | 305 | 25.0 |
| 3 sustancias | 1,073 | 17.8 | 877 | 18.2 | 196 | 16.1 |
| 4 sustancias | 613 | 10.1 | 495 | 10.3 | 118 | 9.7 |
| 5 sustancias | 393 | 6.5 | 321 | 6.7 | 72 | 5.9 |
| 6 sustancias | 243 | 4.0 | 207 | 4.3 | 36 | 3.0 |
| 7 sustancias | 135 | 2.2 | 112 | 2.3 | 23 | 1.9 |
| 8 sustancias | 72 | 1.2 | 66 | 1.4 | 6 | 0.5 |
| 9 sustancias | 43 | 0.7 | 39 | 0.8 | 4 | 0.3 |
| 10 sustancias | 28 | 0.5 | 26 | 0.5 | 2 | 0.2 |
| 11-17 sustancias | 18 | 0.3 | 15 | 0.3 | 3 | 0.2 |
| Total | 6,042 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 1,218 | 100.0 |
| Media (DE) | 2.7 (1.9) drogas | | 2.8 (1.9) drogas | | 2.5 (1.7) drogas | |
| Mediana | 2 drogas | | 2 drogas | | 2 drogas | |
| Moda | 1 drogas | | 1 drogas | | 1 drogas | |
| Decil1 | 1 drogas | | 1 drogas | | 1 drogas | |

DE= Desviación Estándar

Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Tabaco | 5,138 | 85.0 | 4,118 | 85.4 | 1,020 | 83.7 |
| Alcohol | 5,387 | 89.2 | 4,305 | 89.2 | 1,082 | 88.8 |
| Cannabis | 4,921 | 81.4 | 3,989 | 82.7 | 932 | 76.5 |
| Mariguana | 4,918 | 81.4 | 3,987 | 82.6 | 931 | 76.4 |
| Hachís | 264 | 4.4 | 228 | 4.7 | 36 | 3.0 |
| Cocaína | 3,130 | 51.8 | 2,624 | 54.4 | 506 | 41.5 |
| Cocaína (Clorhidrato) | 2,772 | 45.9 | 2,313 | 47.9 | 459 | 37.7 |
| <i>Crack</i> | 1,251 | 20.7 | 1,081 | 22.4 | 170 | 14.0 |
| Otra presentación de cocaína | 36 | 0.6 | 25 | 0.5 | 11 | 0.9 |
| Inhalables | 1,156 | 19.1 | 973 | 20.2 | 183 | 15.0 |
| Solventes o removedores | 855 | 14.2 | 732 | 15.2 | 123 | 10.1 |
| Pegamentos | 311 | 5.1 | 254 | 5.3 | 57 | 4.7 |
| Esmaltes o pinturas | 127 | 2.1 | 103 | 2.1 | 24 | 2.0 |
| Otros inhalables | 60 | 1.0 | 55 | 1.1 | 5 | 0.4 |
| Depresores | 928 | 15.4 | 710 | 14.7 | 218 | 17.9 |
| Benzodiacepinas | 901 | 14.9 | 685 | 14.2 | 216 | 17.7 |
| <i>Rohypnol</i> | 34 | 0.6 | 32 | 0.7 | 2 | 0.2 |
| Otros depresores | 8 | 0.1 | 8 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| Estimulantes | 3,175 | 52.5 | 2,528 | 52.4 | 647 | 53.1 |
| Anfetamina | 116 | 1.9 | 94 | 1.9 | 22 | 1.8 |
| Metanfetaminas | 2,965 | 49.1 | 2,377 | 49.3 | 588 | 48.3 |
| <i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas | 420 | 7.0 | 331 | 6.9 | 89 | 7.3 |
| Otros estimulantes | 32 | 0.5 | 28 | 0.6 | 4 | 0.3 |
| Drogas alucinógenas y disociativas | 853 | 14.1 | 691 | 14.3 | 162 | 13.3 |
| LSD | 723 | 12.0 | 576 | 11.9 | 147 | 12.1 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 301 | 5.0 | 260 | 5.4 | 41 | 3.4 |
| Otras drogas alucinógenas y disoc. | 38 | 0.6 | 34 | 0.7 | 4 | 0.3 |
| Opiáceos | 206 | 3.4 | 174 | 3.6 | 32 | 2.6 |
| Heroína | 124 | 2.1 | 107 | 2.2 | 17 | 1.4 |
| Opioides sintéticos | 62 | 1.0 | 48 | 1.0 | 14 | 1.1 |
| Opio y otros opiáceos | 36 | 0.6 | 32 | 0.7 | 4 | 0.3 |
| Otras sustancias de abuso | 150 | 2.5 | 108 | 2.2 | 42 | 3.4 |
| Con utilidad médica | 47 | 0.8 | 33 | 0.7 | 14 | 1.1 |
| Otras sustancias de abuso | 104 | 1.7 | 76 | 1.6 | 28 | 2.3 |

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Ninguna | 81 | 1.3 | 62 | 1.3 | 19 | 1.6 |
| 1 sustancia | 459 | 7.6 | 346 | 7.2 | 113 | 9.3 |
| 2 sustancias | 1,150 | 19.0 | 895 | 18.6 | 255 | 20.9 |
| 3 sustancias | 1,796 | 29.7 | 1,440 | 29.9 | 356 | 29.2 |
| 4 sustancias | 1,223 | 20.2 | 1,006 | 20.9 | 217 | 17.8 |
| 5 sustancias | 654 | 10.8 | 526 | 10.9 | 128 | 10.5 |
| 6 sustancias | 330 | 5.5 | 263 | 5.5 | 67 | 5.5 |
| 7 sustancias | 160 | 2.6 | 130 | 2.7 | 30 | 2.5 |
| 8 sustancias | 80 | 1.3 | 65 | 1.3 | 15 | 1.2 |
| 9 sustancias | 61 | 1.0 | 50 | 1.0 | 11 | 0.9 |
| 10 sustancias | 20 | 0.3 | 18 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| 11-13 sustancias | 28 | 0.5 | 23 | 0.5 | 5 | 0.4 |
| Total | 6,042 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 1,218 | 100.0 |
| Media (DE) | 3.5 (1.8) drogas | | 3.5 (1.8) drogas | | 3.4 (1.8) drogas | |
| Mediana | 3 drogas | | 3 drogas | | 3 drogas | |
| Moda | 3 drogas | | 3 drogas | | 3 drogas | |
| Decil1 | 2 drogas | | 2 drogas | | 1 drogas | |

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Ninguna | 518 | 8.6 | 402 | 8.3 | 116 | 9.5 |
| 1 sustancia | 2,451 | 40.6 | 1,916 | 39.7 | 535 | 43.9 |
| 2 sustancias | 1,597 | 26.4 | 1,316 | 27.3 | 281 | 23.1 |
| 3 sustancias | 735 | 12.2 | 585 | 12.1 | 150 | 12.3 |
| 4 sustancias | 371 | 6.1 | 300 | 6.2 | 71 | 5.8 |
| 5 sustancias | 171 | 2.8 | 140 | 2.9 | 31 | 2.5 |
| 6 sustancias | 88 | 1.5 | 73 | 1.5 | 15 | 1.2 |
| 7 sustancias | 61 | 1.0 | 49 | 1.0 | 12 | 1.0 |
| 8 sustancias | 22 | 0.4 | 20 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| 9 sustancias | 16 | 0.3 | 13 | 0.3 | 3 | 0.2 |
| 10 sustancias | 11 | 0.2 | 10 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 11 sustancias | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| Total | 6,042 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 1,218 | 100.0 |
| Media (DE) | 1.9 (1.5) drogas | | 1.9 (1.5) drogas | | 1.8 (1.5) drogas | |
| Mediana | 2 drogas | | 2 drogas | | 1 drogas | |
| Moda | 1 drogas | | 1 drogas | | 1 drogas | |
| Decil1 | 1 drogas | | 1 drogas | | 1 drogas | |

DE= Desviación Estándar

Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Tabaco | 4,593 | 76.0 | 3,693 | 76.6 | 900 | 73.9 |
| Alcohol | 4,941 | 81.8 | 3,957 | 82.0 | 984 | 80.8 |
| Cannabis | 3,814 | 63.1 | 3,101 | 64.3 | 713 | 58.5 |
| Mariguana | 3,812 | 63.1 | 3,100 | 64.3 | 712 | 58.5 |
| Hachís | 153 | 2.5 | 125 | 2.6 | 28 | 2.3 |
| Cocaína | 2,061 | 34.1 | 1,713 | 35.5 | 348 | 28.6 |
| Cocaína en polvo blanco | 1,716 | 28.4 | 1,413 | 29.3 | 303 | 24.9 |
| <i>Crack</i> | 799 | 13.2 | 684 | 14.2 | 115 | 9.4 |
| Otra presentación de cocaína | 20 | 0.3 | 13 | 0.3 | 7 | 0.6 |
| Inhalables | 663 | 11.0 | 546 | 11.3 | 117 | 9.6 |
| Solventes y removedores | 513 | 8.5 | 429 | 8.9 | 84 | 6.9 |
| Pegamentos | 147 | 2.4 | 110 | 2.3 | 37 | 3.0 |
| Esmaltes o pinturas | 52 | 0.9 | 40 | 0.8 | 12 | 1.0 |
| Otros inhalables | 19 | 0.3 | 17 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| Depresores | 621 | 10.3 | 453 | 9.4 | 168 | 13.8 |
| Benzodiacepinas | 604 | 10.0 | 437 | 9.1 | 167 | 13.7 |
| <i>Rohypnol</i> | 15 | 0.2 | 14 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| Otros depresores | 6 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| Estimulantes | 2,789 | 46.2 | 2,222 | 46.1 | 567 | 46.6 |
| Anfetamina | 66 | 1.1 | 52 | 1.1 | 14 | 1.1 |
| Metanfetaminas | 2,644 | 43.8 | 2,119 | 43.9 | 525 | 43.1 |
| <i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas | 210 | 3.5 | 153 | 3.2 | 57 | 4.7 |
| Otros estimulantes | 23 | 0.4 | 21 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| Drogas alucinógenas y disociativas | 472 | 7.8 | 373 | 7.7 | 99 | 8.1 |
| LSD | 414 | 6.9 | 325 | 6.7 | 89 | 7.3 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 118 | 2.0 | 100 | 2.1 | 18 | 1.5 |
| Otras drogas alucinógenas y disoc. | 18 | 0.3 | 16 | 0.3 | 2 | 0.2 |
| Opiáceos | 126 | 2.1 | 107 | 2.2 | 19 | 1.6 |
| Heroína | 65 | 1.1 | 59 | 1.2 | 6 | 0.5 |
| Opioides sintéticos | 48 | 0.8 | 38 | 0.8 | 10 | 0.8 |
| Opio y otros opiáceos | 19 | 0.3 | 15 | 0.3 | 4 | 0.3 |
| Otras sustancias de abuso | 103 | 1.7 | 74 | 1.5 | 29 | 2.4 |
| Con utilidad médica | 34 | 0.6 | 22 | 0.5 | 12 | 1.0 |
| Otras sustancias de abuso | 70 | 1.2 | 53 | 1.1 | 17 | 1.4 |

Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Tabaco | 540 | 8.9 | 9.1 | 407 | 8.4 | 8.6 | 133 | 10.9 | 11.1 |
| Alcohol | 1,074 | 17.8 | 18.1 | 831 | 17.2 | 17.5 | 243 | 20.0 | 20.3 |
| Mariguana | 1,853 | 30.7 | 31.2 | 1,571 | 32.6 | 33.2 | 282 | 23.2 | 23.6 |
| Hachís | 2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Cocaína en polvo blanco | 257 | 4.3 | 4.3 | 218 | 4.5 | 4.6 | 39 | 3.2 | 3.3 |
| <i>Crack</i> | 269 | 4.5 | 4.5 | 235 | 4.9 | 5.0 | 34 | 2.8 | 2.8 |
| Otra presentación de cocaína | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Solventes y removedores | 123 | 2.0 | 2.1 | 96 | 2.0 | 2.0 | 27 | 2.2 | 2.3 |
| Pegamentos | 20 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0.3 | 0.3 | 7 | 0.6 | 0.6 |
| Esmaltes o pinturas | 7 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0.3 |
| Otros inhalables | 4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 0.3 |
| Benzodiacepinas | 60 | 1.0 | 1.0 | 24 | 0.5 | 0.5 | 36 | 3.0 | 3.0 |
| <i>Rohypno</i> [®] | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Otros depresores del SNC | 10 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 7 | 0.6 | 0.6 |
| Anfetamina | 26 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| Metanfetaminas | 1,530 | 25.3 | 25.8 | 1,195 | 24.8 | 25.2 | 335 | 27.5 | 28.0 |
| Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas | 8 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0.3 |
| Otros estimulantes del SNC | 7 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| LSD | 23 | 0.4 | 0.4 | 17 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.5 | 0.5 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Otras drogas alucinógenas y disociativas. | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Heroína | 38 | 0.6 | 0.6 | 36 | 0.7 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.2 |
| Opioides sintéticos | 8 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0.3 |
| Opio y otros opiáceos | 3 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0.2 |
| Sustancias con utilidad médica | 9 | 0.1 | 0.2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0.3 |
| Otras sustancias de abuso | 13 | 0.2 | 0.2 | 7 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.5 | 0.5 |
| Ninguna | 48 | 0.8 | 0.8 | 34 | 0.7 | 0.7 | 14 | 1.1 | 1.2 |
| <i>No consumió en el último año</i> | 81 | 1.3 | Se omite | 62 | 1.3 | Se omite | 19 | 1.6 | Se omite |
| <i>Sin Información</i> | 26 | 0.4 | Se omite | 23 | 0.5 | Se omite | 3 | 0.2 | Se omite |
| Total | 6,042 | 100.0 | 0.0 | 4,824 | 100.0 | 0.0 | 1,218 | 100.0 | 0.0 |

Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Tabaco | 253 | 4.2 | 4.3 | 184 | 3.8 | 3.9 | 69 | 5.7 | 5.8 |
| Alcohol | 958 | 15.9 | 16.1 | 742 | 15.4 | 15.7 | 216 | 17.7 | 18.1 |
| Mariguana | 1,397 | 23.1 | 23.5 | 1,161 | 24.1 | 24.5 | 236 | 19.4 | 19.7 |
| Hachís | 5 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Cocaína en polvo blanco | 320 | 5.3 | 5.4 | 270 | 5.6 | 5.7 | 50 | 4.1 | 4.2 |
| <i>Crack</i> | 350 | 5.8 | 5.9 | 313 | 6.5 | 6.6 | 37 | 3.0 | 3.1 |
| Otra presentación de cocaína | 3 | 0.0 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Solventes y removedores | 164 | 2.7 | 2.8 | 133 | 2.8 | 2.8 | 31 | 2.5 | 2.6 |
| Pegamentos | 21 | 0.3 | 0.4 | 11 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.8 | 0.8 |
| Esmaltes o pinturas | 8 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| Otros inhalables | 7 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0.3 |
| Benzodiacepinas | 95 | 1.6 | 1.6 | 46 | 1.0 | 1.0 | 49 | 4.0 | 4.1 |
| <i>Rohypnol</i> [®] | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Otros depresores del SNC | 10 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.5 | 0.5 |
| Anfetamina | 29 | 0.5 | 0.5 | 22 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0.6 | 0.6 |
| Metanfetaminas | 2,131 | 35.3 | 35.9 | 1,697 | 35.2 | 35.8 | 434 | 35.6 | 36.3 |
| Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas | 16 | 0.3 | 0.3 | 11 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| Otros estimulantes del SNC | 5 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| LSD | 30 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0.6 | 0.6 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 4 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Otras drogas alucinógenas y disociativas | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Heroína | 42 | 0.7 | 0.7 | 39 | 0.8 | 0.8 | 3 | 0.2 | 0.3 |
| Opioides sintéticos | 9 | 0.1 | 0.2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0.3 |
| Opio y otros opiáceos | 7 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 |
| Sustancias con utilidad médica | 14 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.3 | 0.3 |
| Otras sustancias de abuso | 15 | 0.2 | 0.3 | 9 | 0.2 | 0.2 | 6 | 0.5 | 0.5 |
| Ninguna | 41 | 0.7 | 0.7 | 32 | 0.7 | 0.7 | 9 | 0.7 | 0.8 |
| <i>No consumió en el último año</i> | 81 | 1.3 | <i>Se omite</i> | 62 | 1.3 | <i>Se omite</i> | 19 | 1.6 | <i>Se omite</i> |
| <i>Sin Información</i> | 25 | 0.4 | <i>Se omite</i> | 22 | 0.5 | <i>Se omite</i> | 3 | 0.2 | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 0.0 | 4,824 | 100.0 | 0.0 | 1,218 | 100.0 | 0.0 |

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Si combinó drogas | 2,516 | 41.6 | 51.1 | 2,062 | 42.7 | 52.0 | 454 | 37.3 | 47.3 |
| No combinó drogas | 2,407 | 39.8 | 48.9 | 1,901 | 39.4 | 48.0 | 506 | 41.5 | 52.7 |
| <i>No aplica</i> | 1,119 | 18.5 | <i>Se omite</i> | 861 | 17.8 | <i>Se omite</i> | 258 | 21.2 | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Ninguna | 615 | 10.2 | 468 | 9.7 | 147 | 12.1 |
| 1 sustancia | 1,251 | 20.7 | 957 | 19.8 | 294 | 24.1 |
| 2 sustancias | 1,705 | 28.2 | 1,351 | 28.0 | 354 | 29.1 |
| 3 sustancias | 1,549 | 25.6 | 1,278 | 26.5 | 271 | 22.2 |
| 4 sustancias | 657 | 10.9 | 551 | 11.4 | 106 | 8.7 |
| 5 sustancias | 193 | 3.2 | 162 | 3.4 | 31 | 2.5 |
| 6 sustancias | 48 | 0.8 | 39 | 0.8 | 9 | 0.7 |
| 7 sustancias | 16 | 0.3 | 13 | 0.3 | 3 | 0.2 |
| 8 sustancias | 6 | 0.1 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| 11-12 sustancias | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| Total | 6,042 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 1,218 | 100.0 |
| Media (DE) | 2.2 (1.3) drogas | | 2.3 (1.3) drogas | | 2.0 (1.4) drogas | |
| Mediana | 2 drogas | | 2 drogas | | 2 drogas | |
| Moda | 2 drogas | | 2 drogas | | 2 drogas | |
| Decil1 | 0 drogas | | 1 drogas | | 0 drogas | |

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Ninguna | 1,879 | 31.1 | 1,446 | 30.0 | 433 | 35.6 |
| 1 sustancia | 2,717 | 45.0 | 2,180 | 45.2 | 537 | 44.1 |
| 2 sustancias | 1,101 | 18.2 | 914 | 18.9 | 187 | 15.4 |
| 3 sustancias | 250 | 4.1 | 206 | 4.3 | 44 | 3.6 |
| 4 sustancias | 63 | 1.0 | 54 | 1.1 | 9 | 0.7 |
| 5 sustancias | 22 | 0.4 | 17 | 0.4 | 5 | 0.4 |
| 6 sustancias | 8 | 0.1 | 6 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| 9 sustancias | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| 10 sustancias | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 6,042 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 1,218 | 100.0 |
| Media (DE) | 1.0 (0.9) drogas | | 1.0 (0.9) drogas | | 0.9 (0.9) drogas | |
| Mediana | 1 drogas | | 1 drogas | | 1 drogas | |
| Moda | 1 drogas | | 1 drogas | | 1 drogas | |
| Decil1 | 0 drogas | | 0 drogas | | 0 drogas | |

DE= Desviación Estándar

Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

| | General | | Hombres | | Mujeres | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % |
| Tabaco | 3,794 | 62.8 | 3,088 | 64.0 | 706 | 58.0 |
| Alcohol | 3,480 | 57.6 | 2,815 | 58.4 | 665 | 54.6 |
| Cannabis | 2,429 | 40.2 | 2,010 | 41.7 | 419 | 34.4 |
| Mariguana | 2,427 | 40.2 | 2,008 | 41.6 | 419 | 34.4 |
| Hachís | 34 | 0.6 | 29 | 0.6 | 5 | 0.4 |
| Cocaína | 880 | 14.6 | 752 | 15.6 | 128 | 10.5 |
| Cocaína en polvo blanco | 591 | 9.8 | 496 | 10.3 | 95 | 7.8 |
| <i>Crack</i> | 391 | 6.5 | 347 | 7.2 | 44 | 3.6 |
| Otra presentación de cocaína | 6 | 0.1 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| Inhalables | 281 | 4.7 | 228 | 4.7 | 53 | 4.4 |
| Solventes y removedores | 227 | 3.8 | 188 | 3.9 | 39 | 3.2 |
| Pegamentos | 43 | 0.7 | 32 | 0.7 | 11 | 0.9 |
| Esmaltes o pinturas | 14 | 0.2 | 9 | 0.2 | 5 | 0.4 |
| Otros inhalables | 8 | 0.1 | 6 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| Depresores | 288 | 4.8 | 191 | 4.0 | 97 | 8.0 |
| Benzodiacepinas | 283 | 4.7 | 186 | 3.9 | 97 | 8.0 |
| <i>Rohypnol</i> | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Otros depresores | 3 | 0.0 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| Estimulantes | 1,802 | 29.8 | 1,445 | 30.0 | 357 | 29.3 |
| Anfetamina | 21 | 0.3 | 16 | 0.3 | 5 | 0.4 |
| Metanfetaminas | 1,744 | 28.9 | 1,408 | 29.2 | 336 | 27.6 |
| <i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas | 51 | 0.8 | 34 | 0.7 | 17 | 1.4 |
| Otros estimulantes | 10 | 0.2 | 9 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| Drogas alucinógenas y disociativas | 107 | 1.8 | 90 | 1.9 | 17 | 1.4 |
| LSD | 85 | 1.4 | 69 | 1.4 | 16 | 1.3 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 18 | 0.3 | 16 | 0.3 | 2 | 0.2 |
| Otras drogas alucinógenas y disoc. | 6 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| Opiáceos | 78 | 1.3 | 68 | 1.4 | 10 | 0.8 |
| Heroína | 36 | 0.6 | 34 | 0.7 | 2 | 0.2 |
| Opioides sintéticos | 32 | 0.5 | 26 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| Opio y otros opiáceos | 13 | 0.2 | 11 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| Otras sustancias de abuso | 53 | 0.9 | 34 | 0.7 | 19 | 1.6 |
| Con utilidad médica | 17 | 0.3 | 10 | 0.2 | 7 | 0.6 |
| Otras sustancias de abuso | 36 | 0.6 | 24 | 0.5 | 12 | 1.0 |

Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco¹ en los últimos 30 días

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Sin consumo abusivo | 953 | 15.8 | 25.6 | 752 | 15.6 | 24.8 | 201 | 16.5 | 28.8 |
| < de 1 vez a la semana | 451 | 7.5 | 12.1 | 366 | 7.6 | 12.1 | 85 | 7.0 | 12.2 |
| 1 o 2 veces a la semana | 406 | 6.7 | 10.9 | 323 | 6.7 | 10.7 | 83 | 6.8 | 11.9 |
| Cada tercer día | 265 | 4.4 | 7.1 | 216 | 4.5 | 7.1 | 49 | 4.0 | 7.0 |
| Diario | 1,651 | 27.3 | 44.3 | 1,370 | 28.4 | 45.3 | 281 | 23.1 | 40.2 |
| <i>No consumió en los últimos 30 días</i> | 2,248 | 37.2 | <i>Se omite</i> | 1,736 | 36.0 | <i>Se omite</i> | 512 | 42.0 | <i>Se omite</i> |
| <i>Sin información</i> | 68 | 1.1 | <i>Se omite</i> | 61 | 1.3 | <i>Se omite</i> | 7 | 0.6 | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Sin consumo abusivo | 499 | 8.3 | 14.7 | 386 | 8.0 | 14.1 | 113 | 9.3 | 17.3 |
| < de 1 vez a la semana | 1,151 | 19.0 | 33.9 | 899 | 18.6 | 32.8 | 252 | 20.7 | 38.6 |
| 1 o 2 veces a la semana | 1,104 | 18.3 | 32.5 | 916 | 19.0 | 33.4 | 188 | 15.4 | 28.8 |
| Cada tercer día | 353 | 5.8 | 10.4 | 297 | 6.2 | 10.8 | 56 | 4.6 | 8.6 |
| Diario | 290 | 4.8 | 8.5 | 246 | 5.1 | 9.0 | 44 | 3.6 | 6.7 |
| <i>No consumió en los últimos 30 días</i> | 2,562 | 42.4 | <i>Se omite</i> | 2,009 | 41.6 | <i>Se omite</i> | 553 | 45.4 | <i>Se omite</i> |
| <i>Sin información</i> | 83 | 1.4 | <i>Se omite</i> | 71 | 1.5 | <i>Se omite</i> | 12 | 1.0 | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

| | General | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| < de 1 vez a la semana | 615 | 10.2 | 17.8 | 466 | 9.7 | 16.7 | 149 | 12.2 | 22.2 |
| 1 o 2 veces a la semana | 687 | 11.4 | 19.9 | 562 | 11.7 | 20.2 | 125 | 10.3 | 18.6 |
| Cada tercer día | 603 | 10.0 | 17.4 | 504 | 10.4 | 18.1 | 99 | 8.1 | 14.7 |
| Diario | 1,553 | 25.7 | 44.9 | 1,254 | 26.0 | 45.0 | 299 | 24.5 | 44.5 |
| <i>No consumió en los últimos 30 días</i> | 1,879 | 31.1 | <i>Se omite</i> | 1,446 | 30.0 | <i>Se omite</i> | 433 | 35.6 | <i>Se omite</i> |
| <i>Sin información</i> | 705 | 11.7 | <i>Se omite</i> | 592 | 12.3 | <i>Se omite</i> | 113 | 9.3 | <i>Se omite</i> |
| Total | 6,042 | 100.0 | 100.0 | 4,824 | 100.0 | 100.0 | 1,218 | 100.0 | 100.0 |

¹ Consumo de cualquier dosis.

GLOSARIO

| | |
|---|--|
| Droga ilícita de inicio | <p>Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.</p> |
| Droga de mayor impacto | <p>Sustancia por la que acuden los pacientes a tratamiento, a cuyo consumo los pacientes atribuyen problemas personales, de salud, familiares, escolares, laborales o sociales, en el transcurso del último año.</p> |
| Droga de preferencia | <p>Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.</p> |
| Estrato social | <p>Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.</p> |
| Tipo de consumo de drogas ilícitas | <p>Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.</p> |
| Total de drogas consumidas | <p>Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.</p> |
| Uso combinado de drogas | <p>Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.</p> |