



**Centros de  
Integración  
Juvenil, A.C.**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL  
CONSUMO DE DROGAS**

**CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES  
DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE  
INTEGRACIÓN JUVENIL**

**DROGAS ILÍCITAS**

**PRIMER SEMESTRE DE 2021**

**Alma Delia Gutiérrez López  
Marina Velázquez Altamirano**

Dirección de Investigación y Enseñanza  
Subdirección de Investigación  
México, septiembre del 2021

**Informe de Investigación 21-08a**

**SIECD**



## **DIRECTORIO**

### **PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Roberto Tapia Conyer

### **FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL**

Sra. Kena Moreno

### **DIRECTORA GENERAL**

Dra. Carmen Fernández Cáceres

### **DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS**

Dr. José Ángel Prado García

### **DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD**

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

### **DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA**

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

### **SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN**

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁG.</b>
RESUMEN	4
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
RESULTADOS	9
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	9
CONSUMO DE DROGAS	12
NUEVAS SUSTANCIAS DE ABUSO O DE USO POCO COMÚN	23
ALERTA EPIDEMIOLÓGICA	25
REFERENCIAS	26
CUADROS	30
GLOSARIO	62

## ÍNDICE DE CUADROS

	PÁG.
Cuadro 1 Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	31
Cuadro 2 Sexo	34
Cuadro 3 Edad de ingreso a tratamiento	34
Cuadro 4 Estado civil	35
Cuadro 5 Escolaridad	35
Cuadro 6 Ocupación	36
Cuadro 7 Estrato social	36
Cuadro 8 Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones	37
Cuadro 9 Edad de inicio del consumo de tabaco	39
Cuadro 10 Edad de inicio del consumo de alcohol	39
Cuadro 11 Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	40
Cuadro 12 Drogas ilícitas de inicio según menciones	41
Cuadro 13 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	43
Cuadro 14 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	43
Cuadro 15 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	44
Cuadro 16 Tipo de consumo de drogas ilícitas	44
Cuadro 17 Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	45
Cuadro 18 Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	45
Cuadro 19 Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	46
Cuadro 20 Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	49
Cuadro 21 Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	49
Cuadro 22 Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	50
Cuadro 23 Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	53
Cuadro 24 Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	55
Cuadro 25 Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	55
Cuadro 26 Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	56
Cuadro 27 Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	57
Cuadro 28 Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	60
Cuadro 29 Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	60
Cuadro 30 Problemas asociados al consumo de sustancias	61

## RESUMEN

En el primer semestre de 2021 ingresaron 6,557 usuarios de drogas ilícitas a solicitar tratamiento por primera vez a Centros de Integración Juvenil (CIJ). La actualización de la información del perfil sociodemográfico y patrón de consumo de sustancias, objetivo del presente estudio, revela que el uso de drogas sigue siendo un problema que afecta mayormente a la población masculina, en una proporción de 3.7 hombres por cada mujer. Se advierte que en la edad media de ingreso a tratamiento (27.7 años), ellos tardaron casi dos años más (28.1) que las mujeres (26.3) para acudir a CIJ.

La edad promedio de inicio del uso de tabaco (15.3 años) y de alcohol (15.2 años) es similar en ambos sexos (15.2 y 15.2 años en los hombres - 15.7, 15.4 años en las mujeres, respectivamente). Si bien, en el consumo de drogas ilícitas (17.8 años) ellas tardan más para iniciar (19.0 años) que los hombres (17.5 años).

Las drogas de mayor impacto por las que se solicitó el tratamiento fueron: metanfetaminas (36.3%, esencialmente cristal: 35.5%), cannabis (22.2%; básicamente marihuana estándar: 21.6%) y alcohol (16.7%).

Las principales sustancias consumidas alguna vez fueron: alcohol (86.6%), cannabis (77.2%; principalmente marihuana estándar: 75.7%), tabaco (76.2%), metanfetaminas (50.0%; en cristal: 48.2%), clorhidrato de cocaína (42.0%), crack (17.1%), inhalables (16.1%; principalmente solventes y removedores: 9.3%), alucinógenos (12.3%; primordialmente LSD: 10.2% y plantas alucinógenas o disociativas: 4.3%) y benzodiacepinas (10.6%). Mientras que en el mes previo al ingreso a tratamiento se usó principalmente: alcohol (56.9%), tabaco (56.0%), cannabis (37.7%), metanfetaminas (28.5%), clorhidrato de cocaína (9.0%), crack (6.5%), inhalables (4.1%), benzodiacepinas (3.2%) y alucinógenos (1.5%).

Al analizar el registro de nuevas sustancias de abuso o de uso poco común se observa que 149 usuarios de drogas reportó el uso alguna vez en la vida de marihuana modificada con alto contenido de THC; 72 casos el uso de nicotina en dispositivos electrónicos; 53, salvia divinorum y otras variantes de salvia; 52, DMT y sustancias análogas; 32, hachís en aceite o miel; 23, ayahuasca; 19, drogas de diseño estimulantes; 7, Ketamina; 6, fenciclidina; 6, GHB; 5, fentanil; 2, sales de baño y 1 caso, fenitelinas.

El análisis de las tendencias evidencia la existencia de una transición epidemiológica del consumo de drogas y de la droga de mayor impacto (DMI) en los pacientes, debida a una tendencia creciente de las metanfetaminas los últimos años, que la ha posicionado como principal DMI en el nivel nacional y en algunos estados a alcanzar tasas superiores al 50%, siendo compensado, a partir de los semestres recientes, con un detrimento de proporciones similares de la marihuana.

Finalmente, los problemas asociados al consumo de drogas ilícitas más reportados por los pacientes fueron los accidentes o lesiones (85.4%), psicológicos (70.7%), de salud (57.0%), laborales (44.1%) y familiares (28.7%).

## ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976<sup>1</sup>. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso<sup>2</sup>. Sin embargo, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática<sup>3</sup>. Posteriormente, se implementa el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha consolidado a través de los años y realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen en la toma de decisiones de los servicios institucionales. Además, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del uso de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)<sup>4</sup> de la Secretaría de Salud, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente Muñiz*” (INPRF)<sup>5</sup>– y el Observatorio Mexicano de Drogas a cargo de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría Salud<sup>6</sup>.

El SIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, incluyendo el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo<sup>7</sup>, uso de drogas en mujeres<sup>8</sup>, población infantil<sup>9</sup> o de acuerdo con las etapas de la vida<sup>10</sup> y estudios de tendencias<sup>11,12,13,14</sup>. Esta información permite enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que sustenta el diseño de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides<sup>15,16</sup>.

La información reportada a través del sistema ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el 2006, el SIECD genera un informe de las características de los consumidores de tabaco y alcohol<sup>17</sup>, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores<sup>18</sup>; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática<sup>19</sup> y que ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes<sup>20</sup>.

Asimismo, la información generada por el SIECD durante más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales<sup>21,22,23</sup> y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios

clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de los *Estudios de la Comunidad Objetivo* (EBCO)<sup>24</sup> realizados por los CIJ a lo largo del país.

Cabe destacar que, considerando la proliferación de nuevas sustancias psicotrópicas de reciente creación o aparición en el mercado de drogas y que no están controladas por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 o la Convención de 1971, pero que pueden representar una amenaza para la salud pública<sup>25,26</sup>, a partir del primer semestre de 2021 CIJ inicia el registro y seguimiento de Nuevas Sustancias de Abuso (NSA) o de uso poco común.

El presente informe se elaboró con base en información obtenida por el SIECD durante el primer semestre del año 2021 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, el patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento y de los problemas asociados a su consumo de sustancias, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

## MÉTODO

**Diseño del estudio:** Censo, descriptivo, semestral.

**Población:** 6,557 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 111 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2021 (cuadro 1. Anexo).

**Fuente de información:** Formatos de Entrevista Inicial aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico del Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta (Sistema CIJ 3.0. Base de datos recuperada el día 17 de agosto de 2021 a las 13:01 hrs. con 6,290 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato electrónico del Expediente Clínico Electrónico (base de datos recuperada el día 6 de julio de 2021 a las 11:54 hrs., de donde se recuperaron 267 registros no contenidos en el Sistema CIJ 3.0).

**Variables de estudio:** Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de patrón de consumo incluyen: edad de inicio del consumo de sustancias, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a

tratamiento, droga ilícita de inicio, consumo alguna vez en la vida, consumo en el último año, consumo en los últimos 30 días; drogas de preferencia en el último año, droga de mayor impacto, uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso, total de drogas consumidas; así como problema(s) asociado(s) al consumo.

El registro del consumo de drogas comprende 82 sustancias, las cuales en el caso del consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes se clasifican en 25 categorías de sustancias:

<b>Grupo(s) de Sustancias</b>		<b>Sustancias</b>
Tabaco		Tabaco; Nicotina en dispositivo electrónico
Alcohol		Bebidas fermentadas; Bebidas destiladas; Alcohol puro (alc. del 96)
Cannabis		Mariguana "estándar"; Mariguana modificada, con alto nivel de THC; Hachís – Resina; Hachís - Aceite o miel
Sustancias asociadas al cannabis		"Mariguana" sintética; Medicamentos con compuestos cannábicos
Inhalables		Solventes y removedores; Pegamentos; Esmaltes y pinturas; Gasolinas y combustibles; Otros inhalables
Cocaína	Cocaína (clorhidrato)	Cocaína en polvo blanco
	Crack	Crack
	Otra presentación de cocaína	Basuco (pasta base de cocaína); Otras presentaciones de cocaína
Metanfetaminas		Metanfetaminas: cristal, Hielo; "Metas"
Otros estimulantes		Sales de baño; Anfetaminas y derivados; Anorexígenos; Drogas de diseño con efectos estimulantes; Otros estimulantes
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	Éxtasis (MDMA)
	Sust. con efectos similares al éxtasis	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis; Piperazinas con efectos similares al éxtasis; Aminoindanos
Benzodicepinas		Benzodicepinas y sustancias relacionadas; Rohypnol
Otros depresores		GHB o similares; Sedantes hipnóticos; Otros depresores del SNC
Alucinógenos	LSD/LSA	LSD; LSA
	Plantas alucinógenas o disociativas	Hongos alucinógenos; Peyote (mezcalina); Salvia divinorum u otras variedades de salvia; Ololiuhqui; Floripondio; Ayahuasca; Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos
	Otros alucinógenos	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel); Análogos del PCP; Ketamina; DMT; Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT; Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe; Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos; Otras sustancias con efectos psicodélicos

Continúa

<b>Grupo(s) de Sustancias</b>	<b>Sustancias</b>
Heroína	Heroína blanca; Heroína negra o morena
Opioides sintéticos	Oxicodona; Opiodes sintéticos; Fentanil y análogos; Dextrometorfano; Derivados opiodes combinados con analgésicos; Desomorfina
Opio y derivados	Opio; Morfina; Codeína
Sustancias con utilidad médica, utilizadas fuera de prescripción	Anticolinérgicos; Antiespasmódicos; Antiparkinsonianos; Anticonvulsivos; Antidepresivos; Antipsicóticos o neurolepticos; Antihistamínicos; Otras sustancias de abuso con utilidad médica
Otras sustancias de abuso	Nitritos; Anestésicos; Bebidas energizantes; Drogas o bebidas inteligentes; Esteroides anabólicos; Sustancias no clasificadas; Sustancias sin especificar

Las NSA o de uso poco común incluidas en la clasificación anterior son: Nicotina en dispositivo electrónico, Marihuana modificada -con alto nivel de THC-, Hachís - Aceite o miel, Marihuana" sintética, Sales de baño, Drogas de diseño con efectos estimulantes, Fenciclidina -PCP, polvo de ángel- y análogos del PCP, Ketamina, DMT y análogos, Fenitelininas -Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe-, GHB o similares, Fentanil y análogos y Desomorfina). El seguimiento de estas sustancias comprende el consumo alguna vez en la vida según sexo y la edad promedio de inicio.

**Procesamiento de datos.** Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.20.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos "sin información" y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio; y para contabilizar el total de sustancias consumidas se consideran las 82 sustancias en seguimiento.

## RESULTADOS

### CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS<sup>a</sup>

**Sexo.** La población se conformó por 5,161 hombres y 1,396 mujeres, lo cual representa 78.7% y 21.3%, respectivamente. Es decir, 3.7 hombres solicitan tratamiento en CIJ por cada mujer.

**Edad de ingreso a tratamiento.** Se observa un rango de edad de 10 a 77 años, con un promedio de 27.7 años (DE= 10.4 años); es decir, 4,524 de los usuarios de drogas tenía entre los 18 y 38 años de edad (69.0% de las personas atendidas); la edad mediana de la población fue de 26 años (15.4% de los casos fueron menores de edad; 1,007 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 17 años (353 casos atendidos).

**Figura 1. Edad de ingreso según sexo**


	 <b>Años</b>	 <b>Años</b>	
<b>Rango</b>	10 a 76	11 a 77	Los hombres ingresaron a tratamiento ligeramente a mayor edad que las mujeres.
<b>Promedio (Desviación estándar)</b>	28.1 (10.4)	26.3 (10.2)	
<b>Mediana</b>	26	24	
<b>Moda</b>	17	19	
<b>Decil<sub>1</sub></b>	17	16	

<sup>a</sup> Cfr., Cuadros 1 a 7.

**Estado civil.** Más de la mitad de la población refirió ser soltera (59.8%), mientras que 17.0% indicó que vivía en unión libre, 12.0% eran casados y 8.5% separados.


**Figura 2. Estado civil según sexo**

Más mujeres que hombres se encontraban solteras, se habían separado, divorciado o eran viudas; mientras que mayor proporción de hombres estaban casados.



**Escolaridad.** 35.3% de la población había cursado algún grado de bachillerato, 35.0% algún grado de educación secundaria, 17.8% tenía estudios superiores y 8.2% sólo había cursado estudios de primaria.


**Figura 3. Escolaridad según sexo**



Los hombres cuentan en mayor proporción que las mujeres, con estudios de secundaria o bachillerato, mientras que ellas cuentan, en mayor proporción que los hombres, con estudios de nivel superior.


**Ocupación.** 46.7% desempeñaba alguna actividad laboral, 26.3% estaba desempleado y 13.2% reportó ser estudiante de tiempo completo.

**Figura 4. Principal ocupación según sexo**



**Estrato social.** De acuerdo con la percepción de los terapeutas, más de la mitad de los casos (52.8%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 35.5% en un nivel bajo y 7.5% fue clasificado en el estrato medio alto.


**Figura 5. Estrato social según sexo**



## CONSUMO DE DROGAS<sup>b</sup>

**Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto).** Las principales sustancias a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: metanfetaminas (36.3%, esencialmente cristal: 35.5%), cannabis (22.2%; básicamente marihuana estándar: 21.6%) y alcohol (16.7%); en menor medida se mencionó a la cocaína (11.5%; en forma de crack: 6.2% y de clorhidrato de cocaína: 5.0%) y al tabaco (5.0%).

**Figura 6. Droga de mayor impacto según sexo**



Las metanfetaminas son las principales sustancias por las que solicitan tratamiento hombres y mujeres; ellos acuden en mayor proporción que las mujeres por problemas asociados al consumo de cannabis, inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas y heroína; ellas por lo que les ocasiona el uso de tabaco, alcohol, éxtasis, benzodiacepinas y alucinógenos.

<sup>b</sup> Cfr., Cuadros 8 a 30

**Edad de inicio del consumo de sustancias.** La edad promedio de inicio del consumo de tabaco fue a los 15.3 años (DE =4.2 años), mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 15.2 años (DE =3.4 años), la mediana y la moda de ambas sustancias fue a los 15 años. Mientras que, la edad promedio de inicio del uso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 17.8 años (DE =6.5 años), con una mediana de 16 y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que tanto para el tabaco y el alcohol y las drogas ilícitas se ubica en los 12 años.


**Figura 7. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo**

	 <b>Años</b>			 <b>Años</b>		
	<b>Tabaco</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Drogas ilícitas</b>	<b>Tabaco</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Drogas ilícitas</b>
<b>Promedio</b> (Desviación estándar)	15.2 (4.2)	15.2 (3.3)	17.5 (6.1)	15.7 (4.1)	15.4 (3.7)	19.0 (7.7)
<b>Mediana</b>	15	15	16	15	15	16
<b>Moda</b>	15	15	15	15	15	15
<b>Decil<sub>1</sub></b>	11	12	12	12	12	13

Hombres y mujeres no presentan diferencias en la edad de inicio del consumo de tabaco y alcohol, pero ellas inician el consumo de drogas ilícitas a mayor edad

**Drogas ilícitas de inicio.** Las sustancias de inicio más reportadas fueron: cannabis (64.5%, principalmente marihuana estándar: 63.2%); metanfetaminas (11.2%; cristal: 10.7%); cocaína (13.7%, básicamente en clorhidrato de cocaína: 11.1% y de crack: 2.4%); e inhalables (5.4%, mayormente en forma de solventes y removedores: 3.2%).

**Figura 8. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo**



El cannabis es la principal droga ilegal de inicio entre los hombres y las mujeres.

Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el haber iniciado el consumo de sustancias ilegales con cannabis, inhalables, cocaína y crack. En tanto que las mujeres en mayor proporción que ellos con el uso de metanfetaminas y triplican el inicio del consumo con benzodiacepinas en comparación con los hombres.

**Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ.** El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento transcurrió de la siguiente manera: tabaco, 12.4 años (DE=9.9 años), alcohol 12.8 años (DE=9.9 años) y drogas ilícitas 9.9 años (DE =9.0 años).


Cabe señalar que la mitad de los usuarios de drogas dejaron pasar diez años desde que iniciaron el consumo de tabaco o alcohol hasta que acudieron a solicitar tratamiento; en tanto que entre el inicio de drogas ilícitas y la solicitud de tratamiento fue de siete años.

**Figura 9. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo**

<p>Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.</p>	 <p><b>Años</b></p>			 <p><b>Años</b></p>		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio (Desviación estándar)</b>	12.9 (10.1)	13.4 (10.1)	10.7 (9.2)	10.4 (9.0)	10.6 (9.0)	7.3.(7.5)
<b>Mediana</b>	11	11	8	8	8	5
<b>Moda</b>	2	3	2	2	2	2
<b>Decil<sub>1</sub></b>	2	2	2	2	2	1

**Tipo de consumo de drogas ilícitas.** De acuerdo con los terapeutas, 55.4% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 24.1% con consumo disfuncional, 8.6% con consumo social u ocasional, 4.6% con consumo experimental y 7.3% presentaba remisión del consumo.


**Figura 10. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo**



**Total de drogas consumidas.** El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.3 drogas (94.4% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.1 drogas (86.4% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.1 drogas (66.9% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.5 drogas (65.5% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.6 drogas (41.8% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.0 droga (22.0% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

**Figura 11. Promedio de drogas consumidas según sexo**




Mujeres y hombres han consumido prácticamente el mismo número de sustancias.

**Consumo de drogas alguna vez en la vida.<sup>c</sup>** Las sustancias de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (86.6%), cannabis (77.2%; principalmente marihuana estándar: 75.7%), tabaco (76.2%), metanfetaminas (50.0%; en cristal: 48.2%) y cocaína (48.2%; clorhidrato de cocaína: 42.0%). Le siguió el uso de crack (17.1%), inhalables (16.1%; principalmente solventes y removedores: 9.3%), alucinógenos (12.3%; primordialmente LSD: 10.2% y plantas alucinógenas o disociativas: 4.3%) y benzodiacepinas (10.6%).

En menor medida se refirió el consumo de éxtasis y sustancias similares (3.3%), sustancias de uso médico sin prescripción (2.0%), anfetaminas y derivados (1.7%), heroína (1.6%; 1.1% reportó heroína negra o morena) y opioides (1.2%).

**Figura 12. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo**




Las mujeres reportaron en mayor proporción que los hombres el consumo de benzodiacepinas y éxtasis. Ellos reportaron en mayor proporción el consumo de tabaco, alcohol, marihuana, inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas, alucinógenos y heroína.

<sup>c</sup> Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

**Consumo de drogas en los últimos 12 meses.** 98.0% de las personas reportó haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

En este lapso, las sustancias más consumidas fueron: alcohol (76.9%), tabaco (65.1%), cannabis (54.1%; principalmente marihuana estándar: 52.8%), metanfetaminas (42.7%), clorhidrato de cocaína (19.9%) y crack (10.1%). En menor medida se reportó el uso de inhalables (7.1%), benzodiazepinas (6.0%), alucinógenos (5.2%; principalmente LSD: 4.4%), sustancias de uso médico sin prescripción (1.3%), éxtasis (1.1%) y heroína (0.9%).


**Figura 13. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo**



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y marihuana; las mujeres usaron en mayor proporción que los hombres: éxtasis, benzodiazepinas y alucinógenos; mientras que los hombres superaron en la frecuencia del uso de tabaco, alcohol, cannabis, cocaína en clorhidrato, crack, metanfetaminas y heroína.

**Droga de preferencia en los últimos 12 meses.** Los usuarios de drogas reportaron mayor preferencia por el consumo de: cannabis (29.2%; principalmente marihuana estándar: 28.2%), metanfetaminas (25.3%), alcohol (18.9%) y tabaco (10.0%).


**Figura 14. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo**



Los hombres reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el uso de cannabis, cocaína en polvo, crack y heroína; mientras que en las mujeres la preferencia fue mayor que en los hombres por el tabaco, alcohol, inhalables, metanfetaminas, benzodiacepinas, éxtasis y alucinógenos.

**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.<sup>d</sup>** De los usuarios de drogas que usaron sustancias en el último año, y sin tomar en cuenta el uso de tabaco, 66.2% reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

**Figura 15. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo**




Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el uso de dos o más sustancias (no se incluye el consumo de tabaco) en un mismo día.

<sup>d</sup> No se toman en cuenta 1,678 casos (25.6%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 23.9% de los hombres y 31.8% de las mujeres (ver anexo, cuadro 24).

**Consumo de drogas en los últimos 30 días.** En este lapso, 88.4% de los casos reportó el consumo de alcohol, tabaco o drogas ilícitas. Las sustancias más consumidas fueron: alcohol (56.9%), tabaco (56.0%), cannabis (37.7%; principalmente marihuana estándar: 36.7%), metanfetaminas (28.5%; en cristal: 27.6%), clorhidrato de cocaína (9.0%), crack (6.5%), inhalables (4.1%; principalmente solventes y removedores: 2.7%), benzodiazepinas (3.2%) y alucinógenos (1.5%; primordialmente LSD: 1.3%).

En menor medida se refirió el consumo de sustancias de uso médico sin prescripción (0.8%), éxtasis y sustancias similares (0.4%), heroína (0.6%) y opioides (0.5%).


**Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo**



Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol, cannabis, metanfetaminas, cocaína en clorhidrato y crack –los hombres en mayor proporción–. Las mujeres predominaron en el consumo de éxtasis, benzodiazepinas y alucinógenos.

**Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.** 34.0% de quienes reportaron consumo de alcohol en los últimos 30 día reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana y 31.8% de una o dos veces a la semana. Por otra parte, 38.5% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 23.0% menos de una vez a la semana, 22.5% de una a dos veces a la semana y 16.1% cada tercer día.


**Figura 17. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo**



En general, los hombres y las mujeres no presentan diferencias en cuanto al abuso diario de drogas ilegales; no obstante, los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso de alcohol que las mujeres.

**Problemas asociados al consumo de sustancias.** 85.4% de los usuarios de drogas refirió haber tenido accidentes o lesiones asociados al consumo de sustancias, 70.7% presentó problemas psicológicos, 57.0% de salud, 44.1% laborales, 28.7% de tipo familiar, 27.8% escolares, 24.4% legales y 23.1% de conducta antisocial o delictiva. Cabe señalar que 85.4% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.6% no reportó ninguno.

**Figura 18. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo**




Los accidentes y lesiones son las problemáticas más frecuentemente relacionadas al consumo de drogas entre hombres y mujeres.

Sin embargo, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres, problemas de tipo laboral, legal, conducta antisocial y delictiva, familiares, de salud y accidentes o lesiones; mientras que las mujeres rebasan el porcentaje de hombres, al referir problemas psicológicos.

## NUEVAS SUSTANCIAS DE ABUSO O DE USO POCO COMÚN (NSA)


Al retomar los datos del consumo de las NSA de reciente seguimiento, se observa que las principales sustancias consumidas alguna vez en la vida fueron: marihuana modificada (2.3%), seguida del uso de nicotina en dispositivos electrónicos (1.1%), salvia divinorum (0.8%), DMT y análogos (0.8%), hachís en presentación de aceite o miel (0.5%), ayahuasca (0.4%) y drogas de diseño estimulantes (0.3%).

**Figura 19. Consumo alguna vez en la vida de nuevas sustancias de abuso o de uso poco común según sexo**



En general, el inicio del consumo de las NSA de seguimiento se presenta en la edad adulta, con excepción de la nicotina en dispositivo electrónico, marihuana modificada, fenciclidina y fenitelaminas, iniciadas en edades menores o iguales a la edad del consumo de drogas ilícitas (17.8 años).


**Figura 20. Edad de inicio de las nuevas sustancias de abuso o de uso poco común**



## ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

El análisis de las tendencias evidencia la existencia de una transición epidemiológica del consumo de drogas y de la droga de mayor impacto (DMI) en los pacientes, debida a una tendencia creciente de las metanfetaminas los últimos años, que la ha posicionado como principal DMI en el nivel nacional (36.3%) y en algunos estados a alcanzar tasas superiores al 50%, como es el caso de Aguascalientes (51.2%), Baja California (53.2%), Baja California Sur (63.8%), Coahuila (50.5%), Colima (66.9%), Durango (51.3%), Guanajuato (51.1%), Jalisco (55%), Sinaloa (62.9%), Yucatán (51.2%) y Zacatecas (50.6%), lo cual se ha visto compensado, a partir de los semestres recientes, con un detrimento de proporciones similares de la marihuana (Cfr. Informe de investigación 21-18g).

**Figura 21. Principal droga de mayor impacto por entidad federativa, 1er semestre de 2021**



## REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado de [http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/info\\_sisvea/informes\\_sisvea\\_2006.pdf](http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/info_sisvea/informes_sisvea_2006.pdf)
5. Ortiz A, Martínez R., Meza D. (2019). Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 63, Noviembre de 2017. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México. Recuperado de [http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep\\_63\\_pdf.pdf](http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep_63_pdf.pdf)
6. Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019). *Observatorio Mexicano de Drogas*. Recuperado de <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/observatorio-mexicano-de-drogas-omd>
7. García-Aurrecochea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Díaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de*

- estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
8. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. Recuperado de <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
  9. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  10. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  11. García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
  12. Gutiérrez López, AD. (2021). Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2º semestre de 2004 al 2º semestre de 2020. (Nivel Nacional y Entidades Federativas) [Informe de Investigación 21-07e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/20-07e.pdf>
  13. Gutiérrez, A. D. (2021). Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2º semestre de 2004 al 2º semestre de 2020. (Nivel Nacional y Entidades Federativas) [Informe de Investigación 21-07f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/20-07f.pdf>
  14. Gutiérrez, A. D. (2021). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2º semestre de 2004 al 2º semestre de 2020. (Nivel nacional y entidades

- federativas) [Informe de Investigación 20-07g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/21-07g.pdf>
15. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  16. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  17. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
  18. Velázquez, M., Gutiérrez, A. D. (2021). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Tabaco y alcohol. Segundo semestre del 2020.* (Informe de Investigación 20-07d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/20-07d.pdf>
  19. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.* México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
  20. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
  21. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y

- Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
22. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
23. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas*. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
24. Centros de Integración Juvenil, A.C. (2019). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2018*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/Index.html>
25. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2018). *Informe Europeo sobre Drogas 2018: Tendencias y novedades*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.
26. United Nations Office on Drugs and Crime (2018). *World Drug Report 2018*. New York: United Nations.

---

# Cuadros

---

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021**

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTH)**

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	40	0.6	32	0.6	8	0.6	4.0 : 1
Álvaro Obregón Oriente	42	0.6	34	0.7	8	0.6	4.3 : 1
Atizapán	70	1.1	57	1.1	13	0.9	4.4 : 1
Azcapotzalco	53	0.8	48	0.9	5	0.4	9.6 : 1
Benito Juárez	52	0.8	42	0.8	10	0.7	4.2 : 1
Chalco	63	1.0	51	1.0	12	0.9	4.3 : 1
Coyoacán	86	1.3	74	1.4	12	0.9	6.2 : 1
Cuajimalpa	44	0.7	29	0.6	15	1.1	1.9 : 1
Cuauhtémoc Oriente	64	1.0	53	1.0	11	0.8	4.8 : 1
Cuauhtémoc Poniente	64	1.0	45	0.9	19	1.4	2.4 : 1
Ecatepec	118	1.8	87	1.7	31	2.2	2.8 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	88	1.3	72	1.4	16	1.1	4.5 : 1
Gustavo A. Madero Norte	94	1.4	72	1.4	22	1.6	3.3 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	3	0.0	2	0.0	1	0.1	2.0 : 1
Iztapalapa Oriente	215	3.3	187	3.6	28	2.0	6.7 : 1
Iztapalapa Poniente	47	0.7	34	0.7	13	0.9	2.6 : 1
Miguel Hidalgo	61	0.9	50	1.0	11	0.8	4.5 : 1
Naucalpan	44	0.7	36	0.7	8	0.6	4.5 : 1
Nezahualcóyotl	113	1.7	98	1.9	15	1.1	6.5 : 1
Texcoco	83	1.3	64	1.2	19	1.4	3.4 : 1
Tlalnepantla	108	1.6	93	1.8	15	1.1	6.2 : 1
Tlalpan	107	1.6	86	1.7	21	1.5	4.1 : 1
Venustiano Carranza	62	0.9	37	0.7	25	1.8	1.5 : 1
Xochimilco	3	0.0	1	0.0	2	0.1	0.5 : 1
UH Ecatepec	35	0.5	32	0.6	3	0.2	10.7 : 1
UH Iztapalapa	59	0.9	54	1.0	5	0.4	10.8 : 1
UH Naucalpan	17	0.3	15	0.3	2	0.1	7.5 : 1
Acapulco	101	1.5	81	1.6	20	1.4	4.0 : 1
Aguascalientes	125	1.9	100	1.9	25	1.8	4.0 : 1
Apodaca	17	0.3	15	0.3	2	0.1	7.5 : 1
Cancún	65	1.0	45	0.9	20	1.4	2.3 : 1
Cd. del Carmen	22	0.3	16	0.3	6	0.4	2.7 : 1
Cd. Juárez Norte	113	1.7	82	1.6	31	2.2	2.6 : 1
Cd. Victoria	22	0.3	19	0.4	3	0.2	6.3 : 1
Celaya	99	1.5	79	1.5	20	1.4	4.0 : 1
Chetumal	43	0.7	36	0.7	7	0.5	5.1 : 1

*Continúa*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chihuahua	141	2.2	107	2.1	34	2.4	3.1 : 1
Chilpancingo	46	0.7	32	0.6	14	1.0	2.3 : 1
Colima	64	1.0	43	0.8	21	1.5	2.0 : 1
Cozumel	36	0.5	24	0.5	12	0.9	2.0 : 1
Cuernavaca	66	1.0	57	1.1	9	0.6	6.3 : 1
Culiacán	72	1.1	57	1.1	15	1.1	3.8 : 1
Durango	40	0.6	34	0.7	6	0.4	5.7 : 1
Escuinapa	17	0.3	13	0.3	4	0.3	3.3 : 1
Fresnillo	38	0.6	31	0.6	7	0.5	4.4 : 1
Guadalajara Centro	143	2.2	117	2.3	26	1.9	4.5 : 1
Guadalajara Sur	64	1.0	50	1.0	14	1.0	3.6 : 1
Guadalupe	79	1.2	60	1.2	19	1.4	3.2 : 1
Guadalupe Zacatecas	4	0.1	4	0.1	0	0.0	---
Guamúchil	54	0.8	45	0.9	9	0.6	5.0 : 1
Guanajuato	20	0.3	19	0.4	1	0.1	19.0 : 1
Guasave	58	0.9	55	1.1	3	0.2	18.3 : 1
Hermosillo	65	1.0	48	0.9	17	1.2	2.8 : 1
Huatulco	18	0.3	18	0.3	0	0.0	---
Ixtapa Zihuatanejo	38	0.6	31	0.6	7	0.5	4.4 : 1
La Paz	20	0.3	16	0.3	4	0.3	4.0 : 1
La Piedad	71	1.1	49	0.9	22	1.6	2.2 : 1
Laguna Durango	40	0.6	27	0.5	13	0.9	2.1 : 1
León	149	2.3	125	2.4	24	1.7	5.2 : 1
Los Cabos	118	1.8	94	1.8	24	1.7	3.9 : 1
Los Mochis	146	2.2	140	2.7	6	0.4	23.3 : 1
Manzanillo	25	0.4	19	0.4	6	0.4	3.2 : 1
Mazatlán	54	0.8	44	0.9	10	0.7	4.4 : 1
Mérida	44	0.7	34	0.7	10	0.7	3.4 : 1
Mexicali	49	0.7	31	0.6	18	1.3	1.7 : 1
Monterrey	126	1.9	101	2.0	25	1.8	4.0 : 1
Morelia	50	0.8	38	0.7	12	0.9	3.2 : 1
Nogales	65	1.0	40	0.8	25	1.8	1.6 : 1
Oaxaca	54	0.8	43	0.8	11	0.8	3.9 : 1
Pachuca	96	1.5	75	1.5	21	1.5	3.6 : 1
Piedras Negras	1	0.0	1	0.0	0	0.0	---
Playa del Carmen	28	0.4	21	0.4	7	0.5	3.0 : 1
Poza Rica	31	0.5	19	0.4	12	0.9	1.6 : 1
Puebla	43	0.7	37	0.7	6	0.4	6.2 : 1
Puerto Vallarta	59	0.9	48	0.9	11	0.8	4.4 : 1
Querétaro	76	1.2	66	1.3	10	0.7	6.6 : 1

Continúa

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Ramos Arizpe	3	0.0%	3	0.1%	0	0.0%	---
Reynosa	28	0.4%	20	0.4%	8	0.6%	2.5 : 1
Salamanca	37	0.6%	32	0.6%	5	0.4%	6.4 : 1
Saltillo	130	2.0%	97	1.9%	33	2.4%	2.9 : 1
San Luis Potosí	74	1.1%	53	1.0%	21	1.5%	2.5 : 1
San Nicolás de los Garza	47	0.7%	31	0.6%	16	1.1%	1.9 : 1
Tampico	44	0.7%	33	0.6%	11	0.8%	3.0 : 1
Tapachula	24	0.4%	18	0.3%	6	0.4%	3.0 : 1
Tecomán	35	0.5%	31	0.6%	4	0.3%	7.8 : 1
Tehuacán	62	0.9%	43	0.8%	19	1.4%	2.3 : 1
Tepic	15	0.2%	10	0.2%	5	0.4%	2.0 : 1
Tijuana Guaycura	116	1.8%	72	1.4%	44	3.2%	1.6 : 1
Tijuana Soler	87	1.3%	63	1.2%	24	1.7%	2.6 : 1
Tlaquepaque	85	1.3%	71	1.4%	14	1.0%	5.1 : 1
Tlaxcala	38	0.6%	29	0.6%	9	0.6%	3.2 : 1
Toluca	101	1.5%	80	1.6%	21	1.5%	3.8 : 1
Torreón Oriente	151	2.3%	112	2.2%	39	2.8%	2.9 : 1
Tuxtla Gutiérrez	31	0.5%	26	0.5%	5	0.4%	5.2 : 1
Villa Victoria	12	0.2%	11	0.2%	1	0.1%	11.0 : 1
Villahermosa	38	0.6%	30	0.6%	8	0.6%	3.8 : 1
Xalapa	59	0.9%	47	0.9%	12	0.9%	3.9 : 1
Yucatán	38	0.6%	29	0.6%	9	0.6%	3.2 : 1
Zacatecas	47	0.7%	36	0.7%	11	0.8%	3.3 : 1
Zamora	74	1.1%	53	1.0%	21	1.5%	2.5 : 1
Zapopan Kena Moreno	11	0.2%	9	0.2%	2	0.1%	4.5 : 1
Zapopan Norte	128	2.0%	92	1.8%	36	2.6%	2.6 : 1
UH Cd. Juárez	15	0.2%	12	0.2%	3	0.2%	4.0 : 1
UH Culiacán	14	0.2%	14	0.3%	0	0.0%	---
UH Ixbalanqué	18	0.3%	15	0.3%	3	0.2%	5.0 : 1
UH Nuevo León	61	0.9%	50	1.0%	11	0.8%	4.5 : 1
UH Punta Diamante	23	0.4%	18	0.3%	5	0.4%	3.6 : 1
UH Tijuana	26	0.4%	19	0.4%	7	0.5%	2.7 : 1
UH Zapopan	8	0.1%	6	0.1%	2	0.1%	3.0 : 1
UH Zapotlán el Grande	11	0.2%	11	0.2%	0	0.0%	---
UTUH Cd. Juárez	12	0.2%	11	0.2%	1	0.1%	11.0 : 1
UTUH Tijuana	4	0.1%	3	0.1%	1	0.1%	3.0 : 1
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0%</b>	<b>3.7 : 1</b>

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

**Cuadro 2. Sexo**

	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>Razón H:M</b>
Hombres	5,161	78.7	
Mujeres	1,396	21.3	3.7 : 1
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	

**Cuadro 3 Edad de ingreso a tratamiento**

	<b>General</b>			<b>Hombres</b>			<b>Mujeres</b>		
	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>% válido</b>	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>% válido</b>	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>% válido</b>
Hasta 9 años	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	161	2.5	2.5	102	2.0	2.0	59	4.2	4.2
15 a 19 años	1,473	22.5	22.5	1,127	21.8	21.8	346	24.8	24.8
20 a 24 años	1,331	20.3	20.3	994	19.3	19.3	337	24.1	24.1
25 a 29 años	1,260	19.2	19.2	1,011	19.6	19.6	249	17.8	17.8
30 a 34 años	843	12.9	12.9	690	13.4	13.4	153	11.0	11.0
35 a 39 años	574	8.8	8.8	484	9.4	9.4	90	6.4	6.4
40 a 44 años	405	6.2	6.2	327	6.3	6.3	78	5.6	5.6
45 años y más	510	7.8	7.8	426	8.3	8.3	84	6.0	6.0
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	27.7 (10.4) años			28.1 (10.4) años			26.3 (10.2) años		
Mediana	26 años			26 años			24 años		
Moda	17 años			17 años			19 años		
Decil1	17 años			17 años			16 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 4 Estado civil**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	3,916	59.7	59.8	3,052	59.1	59.2	864	61.9	61.9
Casado	786	12.0	12.0	696	13.5	13.5	90	6.4	6.5
Unión libre	1,116	17.0	17.0	876	17.0	17.0	240	17.2	17.2
Separado	555	8.5	8.5	413	8.0	8.0	142	10.2	10.2
Divorciado	143	2.2	2.2	103	2.0	2.0	40	2.9	2.9
Viudo	32	0.5	0.5	13	0.3	0.3	19	1.4	1.4
<i>Sin información</i>	9	0.1	<i>Se omite</i>	8	0.2	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 5. Escolaridad**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin estudios	34	0.5	0.5	27	0.5	0.5	7	0.5	0.5
Primaria no concluida	186	2.8	2.8	137	2.7	2.7	49	3.5	3.5
Primaria concluida	354	5.4	5.4	276	5.3	5.3	78	5.6	5.6
Secundaria no concluida	794	12.1	12.1	633	12.3	12.3	161	11.5	11.5
Secundaria concluida	1,500	22.9	22.9	1,217	23.6	23.6	283	20.3	20.3
Estudios técnicos o comerciales no concluidos	44	0.7	0.7	33	0.6	0.6	11	0.8	0.8
Estudios técnicos o comerciales concluidos	102	1.6	1.6	75	1.5	1.5	27	1.9	1.9
Bachillerato no concluido	1,423	21.7	21.7	1,131	21.9	21.9	292	20.9	20.9
Bachillerato concluido	893	13.6	13.6	712	13.8	13.8	181	13.0	13.0
Estudios superiores no concluidos	730	11.1	11.1	546	10.6	10.6	184	13.2	13.2
Estudios superiores concluidos	439	6.7	6.7	328	6.4	6.4	111	8.0	8.0
Estudios de posgrado no concluidos	19	0.3	0.3	15	0.3	0.3	4	0.3	0.3
Estudios de posgrado concluidos	37	0.6	0.6	29	0.6	0.6	8	0.6	0.6
<i>Sin información</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 6. Ocupación**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	1,679	25.6	26.3	1,412	27.4	28.1	267	19.1	19.7
Estudiante	841	12.8	13.2	567	11.0	11.3	274	19.6	20.2
Estudiante que trabaja	414	6.3	6.5	322	6.2	6.4	92	6.6	6.8
Trabaja	2,981	45.5	46.7	2,592	50.2	51.6	389	27.9	28.6
Tareas del hogar	432	6.6	6.8	102	2.0	2.0	330	23.6	24.3
Pensionado	39	0.6	0.6	33	0.6	0.7	6	0.4	0.4
Sin información	171	2.6	<i>Se omite</i>	133	2.6	<i>Se omite</i>	38	2.7	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 7. Estrato social**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Alto	21	0.3	17	0.3	4	0.3
Medio alto	493	7.5	381	7.4	112	8.0
Medio	23	0.4	20	0.4	3	0.2
Medio bajo	3,463	52.8	2,717	52.6	746	53.4
Bajo	2,331	35.5	1,857	36.0	474	34.0
Muy bajo	226	3.4	169	3.3	57	4.1
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021**

**Cuadro 8. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones**

		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	Tabaco	328	5.0	222	4.3	106	7.6
	Nicotina en dispositivo electrónico	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Alcohol	Bebidas fermentadas	681	10.4	527	10.2	154	11.0
	Bebidas destiladas	389	5.9	286	5.5	103	7.4
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	29	0.4	25	0.5	4	0.3
Cannabis	Mariguana "estándar"	1,416	21.6	1,126	21.8	290	20.8
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	39	0.6	28	0.5	11	0.8
	Hachís - Resina	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sus. asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	12	0.2	10	0.2	2	0.1
	Medicamentos con compuestos cannábicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	139	2.1	112	2.2	27	1.9
	Pegamentos	34	0.5	26	0.5	8	0.6
	Esmaltes y pinturas	9	0.1	7	0.1	2	0.1
	Gasolinas y combustibles	3	0.0	3	0.1	0	0.0
	Otros inhalables	33	0.5	27	0.5	6	0.4
Cocaínas	Cocaína en polvo blanco	329	5.0	279	5.4	50	3.6
	Crack	407	6.2	366	7.1	41	2.9
	Basuco (pasta base de cocaína)	4	0.1	4	0.1	0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	10	0.2	9	0.2	1	0.1
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	2,325	35.5	1,859	36.0	466	33.4
	Metanfetaminas: hielo	42	0.6	35	0.7	7	0.5
	Metanfetaminas: "Metas"	13	0.2	11	0.2	2	0.1
Otros estimulantes	Sales de baño	3	0.0	1	0.0	2	0.1
	Anfetaminas y derivados	26	0.4	22	0.4	4	0.3
	Anorexígenos	2	0.0	1	0.0	1	0.1
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	3	0.0	2	0.0	1	0.1
	Otros estimulantes	5	0.1	4	0.1	1	0.1

*Continúa*

**Cuadro 8. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto),  
según menciones**  
(Continuación)

		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Alucinógenos	LSD	28	0.4	17	0.3	11	0.8
	Hongos alucinógenos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	Salvia divinorum u otras variedades de salvia	1	0.0	0	0.0	1	0.1
	Ayahuasca	2	0.0	0	0.0	2	0.1
	Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	1	0.0	0	0.0	1	0.1
	Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Otras sustancias con efectos psicodélicos	1	0.0	0	0.0	1	0.1
	Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	4	0.1	2	0.0	2
	Drogas de diseño con efectos similares	1	0.0	0	0.0	1	0.1
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	89	1.4	48	0.9	41	2.9
	Rohypnol	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	6	0.1	2	0.0	4	0.3
	Otros depresores del SNC	2	0.0	1	0.0	1	0.1
Heroína	Heroína blanca	13	0.2	10	0.2	3	0.2
	Heroína negra o morena	31	0.5	26	0.5	5	0.4
Opioides	Opioides sintéticos	8	0.1	6	0.1	2	0.1
	Fentanil y análogos	3	0.0	3	0.1	0	0.0
	Dextrometorfano	9	0.1	7	0.1	2	0.1
	Derivados opioides combinados con analgésicos	6	0.1	4	0.1	2	0.1
Opiáceos	Opio	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Morfina (uso fuera de prescripción)	4	0.1	2	0.0	2	0.1
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticonvulsivos	2	0.0	1	0.0	1	0.1
	Antidepresivos	18	0.3	9	0.2	9	0.6
	Antipsicóticos o neurolepticos	2	0.0	0	0.0	2	0.1
	Antihistamínicos	2	0.0	1	0.0	1	0.1
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	15	0.2	9	0.2	6	0.4
Otras sustancias de abuso	Bebidas energizantes	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Esteroides anabólicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Sustancias no clasificadas	4	0.1	2	0.0	2	0.1
	Sustancias sin especificar	6	0.1	4	0.1	2	0.1
Ninguna		6	0.1	4	0.1	2	0.1
<i>Sin información</i>		0	0.0	0	0.0	1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>		<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 9. Edad de inicio del consumo de tabaco**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	159	2.4	3.2	137	2.7	3.5	22	1.6	2.1
10 a 14 años	2,040	31.1	40.8	1,636	31.7	41.3	404	28.9	39.3
15 a 19 años	2,327	35.5	46.6	1,835	35.6	46.3	492	35.2	47.8
20 a 24 años	303	4.6	6.1	233	4.5	5.9	70	5.0	6.8
25 a 29 años	86	1.3	1.7	60	1.2	1.5	26	1.9	2.5
30 a 34 años	39	0.6	0.8	33	0.6	0.8	6	0.4	0.6
35 a 39 años	27	0.4	0.5	20	0.4	0.5	7	0.5	0.7
40 a 44 años	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1	2	0.1	0.2
45 años y más	8	0.1	0.2	8	0.2	0.2	0	0.0	0.0
<i>No consumió</i>	1,560	23.8	<i>Se omite</i>	1,193	23.1	<i>Se omite</i>	367	26.3	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	15.3 (4.2) años			15.2 (4.2) años			15.7 (4.1) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			11 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 10. Edad de inicio del consumo de alcohol**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	149	2.3	2.6	125	2.4	2.8	24	1.7	2.0
10 a 14 años	2,119	32.3	37.4	1,679	32.5	37.5	440	31.5	36.9
15 a 19 años	3,027	46.2	53.4	2,396	46.4	53.5	631	45.2	52.9
20 a 24 años	290	4.4	5.1	220	4.3	4.9	70	5.0	5.9
25 a 29 años	54	0.8	1.0	41	0.8	0.9	13	0.9	1.1
30 a 34 años	17	0.3	0.3	8	0.2	0.2	9	0.6	0.8
35 a 39 años	8	0.1	0.1	5	0.1	0.1	3	0.2	0.3
40 a 44 años	5	0.1	0.1	2	0.0	0.0	3	0.2	0.3
45 años y más	3	0.0	0.1	3	0.1	0.1	0	0.0	0.0
<i>No consumió</i>	881	13.4	<i>Se omite</i>	680	13.2	<i>Se omite</i>	201	14.4	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	4	0.1	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	15.2 (3.4) años			15.2 (3.3) años			15.4 (3.7) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 11. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	72	1.1	1.1	65	1.3	1.3	7	0.5	0.5
10 a 14 años	1,859	28.4	28.4	1,508	29.2	29.2	351	25.1	25.2
15 a 19 años	3,084	47.0	47.0	2,468	47.8	47.8	616	44.1	44.2
20 a 24 años	749	11.4	11.4	557	10.8	10.8	192	13.8	13.8
25 a 29 años	399	6.1	6.1	294	5.7	5.7	105	7.5	7.5
30 a 34 años	179	2.7	2.7	126	2.4	2.4	53	3.8	3.8
35 a 39 años	94	1.4	1.4	71	1.4	1.4	23	1.6	1.6
40 a 44 años	60	0.9	0.9	37	0.7	0.7	23	1.6	1.6
45 años y más	59	0.9	0.9	34	0.7	0.7	25	1.8	1.8
<i>Sin información</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	17.8 (6.5) años			17.5 (6.1) años			19.0 (7.7) años		
Mediana	16 años			16 años			16 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			13 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 12. Drogas ilícitas de inicio, según menciones**

		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	Mariguana "estándar"	4,146	63.2	3,294	63.8	852	61.0
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	84	1.3	66	1.3	18	1.3
	Hachís - Resina	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Hachís - Aceite o miel	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Sus. asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	23	0.4	20	0.4	3	0.2
	Medicamentos con compuestos cannábicos	6	0.1	5	0.1	1	0.1
Inhalables	Solventes y removedores	212	3.2	181	3.5	31	2.2
	Pegamentos	65	1.0	56	1.1	9	0.6
	Esmaltes y pinturas	35	0.5	27	0.5	8	0.6
	Gasolinas y combustibles	4	0.1	4	0.1	0	0.0
	Otros inhalables	42	0.6	34	0.7	8	0.6
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	725	11.1	616	11.9	109	7.8
	Crack	159	2.4	134	2.6	25	1.8
	Basuco (pasta base de cocaína)	6	0.1	6	0.1	0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	8	0.1	7	0.1	1	0.1
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	700	10.7	497	9.6	203	14.5
	Metanfetaminas: hielo	18	0.3	13	0.3	5	0.4
	Metanfetaminas: "Metas"	13	0.2	9	0.2	4	0.3
Otros estimulantes	Sales de baño	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Anfetaminas y derivados	32	0.5	24	0.5	8	0.6
	Anorexígenos	4	0.1	2	0.0	2	0.1
	Otros estimulantes	11	0.2	7	0.1	4	0.3
Alucinógenos	LSD	27	0.4	18	0.3	9	0.6
	Hongos alucinógenos	3	0.0	2	0.0	1	0.1
	Peyote (mezcalina)	3	0.0	3	0.1	0	0.0
	Salvia divinorum u otras variedades de salvia	1	0.0	0	0.0	1	0.1
	Ayahuasca	2	0.0	1	0.0	1	0.1
	Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	Otras sustancias con efectos psicodélicos	1	0.0	0	0.0	1	0.1

*Continúa*

**Cuadro 12. Drogas ilícitas de inicio, según menciones**  
(Continuación)

		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	8	0.1	5	0.1	3	0.2
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	1	0.0	0	0.0	1	0.1
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	107	1.6	56	1.1	51	3.7
	Rohypnol	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	10	0.2	6	0.1	4	0.3
	Otros depresores del SNC	5	0.1	2	0.0	3	0.2
Heroína	Heroína blanca	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	Heroína negra o morena	9	0.1	8	0.2	1	0.1
Opioides	Opioides sintéticos	2	0.0	1	0.0	1	0.1
	Fentanil y análogos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	Dextrometorfano	5	0.1	4	0.1	1	0.1
	Derivados opioides combinados con analgésicos	2	0.0	1	0.0	1	0.1
	Anticolinérgicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opiáceos	Opio	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Morfina	2	0.0	1	0.0	1	0.1
	Codeína	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticonvulsivos	2	0.0	1	0.0	1	0.1
	Antidepresivos	21	0.3	10	0.2	11	0.8
	Antipsicóticos o neurolépticos	2	0.0	0	0.0	2	0.1
	Antihistamínicos	2	0.0	1	0.0	1	0.1
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	11	0.2	7	0.1	4	0.3
Otras sustancias de abuso	Nitritos	3	0.0	3	0.1	0	0.0
	Anestésicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Bebidas energizantes	9	0.1	7	0.1	2	0.1
	Sustancias no clasificadas	4	0.1	2	0.0	2	0.1
	Sustancias sin especificar	7	0.1	5	0.1	2	0.1
<b>Total</b>		<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 13. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	85	1.3	1.7	63	1.2	1.6	22	1.6	2.1
1 a 5 años	1,379	21.0	27.6	1,025	19.9	25.8	354	25.4	34.4
6 a 10 años	1,141	17.4	22.8	880	17.1	22.2	261	18.7	25.4
11 a 15 años	870	13.3	17.4	708	13.7	17.9	162	11.6	15.7
16 a 20 años	550	8.4	11.0	463	9.0	11.7	87	6.2	8.5
21 a 25 años	415	6.3	8.3	351	6.8	8.9	64	4.6	6.2
26 o más años	555	8.5	11.1	476	9.2	12.0	79	5.7	7.7
No consumió	1,560	23.8	Se omite	1,193	23.1	Se omite	367	26.3	Se omite
Sin información	2	0.0	Se omite	2	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	12.4 (9.9) años			12.9 (10.1) años			10.4 (9.0) años		
Mediana	10 años			11 años			8 años		
Moda	2 años			2 años			2 años		
Decil1	2 años			2 años			2 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 14. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	72	1.1	1.3	48	0.9	1.1	24	1.7	2.0
1 a 5 años	1,514	23.1	26.7	1,114	21.6	24.9	400	28.7	33.5
6 a 10 años	1,259	19.2	22.2	950	18.4	21.2	309	22.1	25.9
11 a 15 años	1,024	15.6	18.1	825	16.0	18.4	199	14.3	16.7
16 a 20 años	657	10.0	11.6	556	10.8	12.4	101	7.2	8.5
21 a 25 años	493	7.5	8.7	423	8.2	9.4	70	5.0	5.9
26 o más años	653	10.0	11.5	563	10.9	12.6	90	6.4	7.5
No consumió	881	13.4	Se omite	680	13.2	Se omite	201	14.4	Se omite
Sin información	4	0.1	Se omite	2	0.0	Se omite	2	0.1	Se omite
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	12.8 (9.9) años			13.4 (10.1) años			10.6 (9.0) años		
Mediana	10 años			11 años			8 años		
Moda	3 años			3 años			2 años		
Decil1	2 años			2 años			2 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 15. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	205	3.1	3.1	138	2.7	2.7	67	4.8	4.8
1 a 5 años	2,500	38.1	38.1	1,805	35.0	35.0	695	49.8	49.8
6 a 10 años	1,463	22.3	22.3	1,154	22.4	22.4	309	22.1	22.2
11 a 15 años	930	14.2	14.2	781	15.1	15.1	149	10.7	10.7
16 a 20 años	589	9.0	9.0	512	9.9	9.9	77	5.5	5.5
21 a 25 años	401	6.1	6.1	347	6.7	6.7	54	3.9	3.9
26 o más años	467	7.1	7.1	423	8.2	8.2	44	3.2	3.2
<i>Sin información</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	9.9 (9.0) años			10.7 (9.2) años			7.3 (7.5) años		
Mediana	7 años			8 años			5 años		
Moda	2 años			2 años			2 años		
Decil1	1 año			2 años			1 año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 16. Tipo de consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	261	4.0	4.6	171	3.3	3.8	90	6.4	7.6
Social u ocasional	490	7.5	8.6	348	6.7	7.7	142	10.2	12.0
Funcional	3,172	48.4	55.4	2,567	49.7	56.6	605	43.3	51.1
Disfuncional	1,381	21.1	24.1	1,133	22.0	25.0	248	17.8	21.0
En remisión	417	6.4	7.3	319	6.2	7.0	98	7.0	8.3
<i>Sin información</i>	836	12.7	<i>Se omite</i>	623	12.1	<i>Se omite</i>	213	15.3	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 17. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	368	5.6	258	5.0	110	7.9
2 sustancias	701	10.7	534	10.3	167	12.0
3 sustancias	1,566	23.9	1,199	23.2	367	26.3
4 sustancias	1,486	22.7	1,165	22.6	321	23.0
5 sustancias	1,012	15.4	812	15.7	200	14.3
6 sustancias	622	9.5	517	10.0	105	7.5
7 sustancias	344	5.2	294	5.7	50	3.6
8 sustancias	223	3.4	176	3.4	47	3.4
9 sustancias	83	1.3	69	1.3	14	1.0
10 sustancias	54	0.8	49	0.9	5	0.4
11-25 sustancias	98	1.5	88	1.7	10	0.7
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	4.3 (2.1) drogas		4.3 (2.2) drogas		3.9 (1.9) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 18. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	2,263	34.5	1,675	32.5	588	42.1
2 sustancias	1,762	26.9	1,400	27.1	362	25.9
3 sustancias	1,143	17.4	917	17.8	226	16.2
4 sustancias	611	9.3	513	9.9	98	7.0
5 sustancias	355	5.4	299	5.8	56	4.0
6 sustancias	204	3.1	164	3.2	40	2.9
7 sustancias	73	1.1	62	1.2	11	0.8
8 sustancias	54	0.8	46	0.9	8	0.6
9 sustancias	38	0.6	37	0.7	1	0.1
10 sustancias	24	0.4	23	0.4	1	0.1
11-22 sustancias	30	0.5	25	0.5	5	0.4
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.5 (1.8) drogas		2.6 (1.9) drogas		2.2 (1.6) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 19. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>4,997</b>	<b>76.2</b>	<b>3,968</b>	<b>76.9</b>	<b>1,029</b>	<b>73.7</b>
Tabaco	4,934	75.2	3,921	76.0	1,013	72.6
Nicotina en dispositivo electrónico	72	1.1	52	1.0	20	1.4
<b>Alcohol</b>	<b>5,676</b>	<b>86.6</b>	<b>4,481</b>	<b>86.8</b>	<b>1,195</b>	<b>85.6</b>
Bebidas fermentadas	3,949	60.2	3,127	60.6	822	58.9
Bebidas destiladas	2,211	33.7	1,740	33.7	471	33.7
Alcohol puro ("alcohol del 96")	199	3.0	157	3.0	42	3.0
<b>Cannabis</b>	<b>5,065</b>	<b>77.2</b>	<b>4,007</b>	<b>77.6</b>	<b>1,058</b>	<b>75.8</b>
Mariguana "estándar"	4,966	75.7	3,929	76.1	1,037	74.3
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	149	2.3	114	2.2	35	2.5
Hachís - Resina	129	2.0	118	2.3	11	0.8
Hachís - Aceite o miel	32	0.5	30	0.6	2	0.1
<b>Sustancias similares al cannabis</b>	<b>58</b>	<b>0.9</b>	<b>46</b>	<b>0.9</b>	<b>12</b>	<b>0.9</b>
"Mariguana" sintética	44	0.7	37	0.7	7	0.5
Medicamentos con compuestos cannábicos	15	0.2	10	0.2	5	0.4
<b>Inhalables</b>	<b>1,054</b>	<b>16.1</b>	<b>894</b>	<b>17.3</b>	<b>160</b>	<b>11.5</b>
Solventes y removedores	609	9.3	516	10.0	93	6.7
Pegamentos	298	4.5	258	5.0	40	2.9
Esmaltes y pinturas	135	2.1	112	2.2	23	1.6
Gasolinas y combustibles	27	0.4	25	0.5	2	0.1
Otros inhalables	133	2.0	118	2.3	15	1.1
<b>Cocaína</b>	<b>3,162</b>	<b>48.2</b>	<b>2,661</b>	<b>51.6</b>	<b>501</b>	<b>35.9</b>
Cocaína (clorhidrato)	2,757	42.0	2,312	44.8	445	31.9
Crack	1,120	17.1	975	18.9	145	10.4
Otro tipo de cocaína	<b>86</b>	<b>1.3</b>	<b>81</b>	<b>1.6</b>	<b>5</b>	<b>0.4</b>
Basuco (pasta base de cocaína)	53	0.8	50	1.0	3	0.2
Otras presentaciones de cocaína	34	0.5	32	0.6	2	0.1
<b>Metanfetaminas</b>	<b>3,278</b>	<b>50.0</b>	<b>2,641</b>	<b>51.2</b>	<b>637</b>	<b>45.6</b>
Metanfetaminas: cristal	3,159	48.2	2,547	49.4	612	43.8
Metanfetaminas: hielo	63	1.0	53	1.0	10	0.7
Metanfetaminas: "Metas"	132	2.0	99	1.9	33	2.4
<b>Otros estimulantes del SNC</b>	<b>165</b>	<b>2.5</b>	<b>128</b>	<b>2.5</b>	<b>37</b>	<b>2.7</b>
Sales de baño	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	113	1.7	86	1.7	27	1.9
Anorexígenos	8	0.1	5	0.1	3	0.2
Drogas de diseño con efectos estimulantes	19	0.3	17	0.3	2	0.1
Otros estimulantes	25	0.4	19	0.4	6	0.4

*Continúa*

**Cuadro 19. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**  
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>MDMA y similares</b>	<b>215</b>	<b>3.3</b>	<b>168</b>	<b>3.3</b>	<b>47</b>	<b>3.4</b>
Éxtasis (MDMA)	207	3.2	161	3.1	46	3.3
<b>Sustancias con efectos similares a MDMA</b>	<b>10</b>	<b>0.2</b>	<b>8</b>	<b>0.2</b>	<b>2</b>	<b>0.1</b>
Drogas de diseño con efectos similares	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Piperazinas con efectos similares	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Benzodiacepinas</b>	<b>692</b>	<b>10.6</b>	<b>512</b>	<b>9.9</b>	<b>180</b>	<b>12.9</b>
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	675	10.3	497	9.6	178	12.8
Rohypnol	25	0.4	22	0.4	3	0.2
<b>Otros depresores del SNC</b>	<b>90</b>	<b>1.4</b>	<b>66</b>	<b>1.3</b>	<b>24</b>	<b>1.7</b>
GHB o similares	6	0.1	5	0.1	1	0.1
Sedantes hipnóticos	65	1.0	50	1.0	15	1.1
Otros depresores del SNC	21	0.3	13	0.3	8	0.6
<b>Alucinógenos</b>	<b>808</b>	<b>12.3</b>	<b>641</b>	<b>12.4</b>	<b>167</b>	<b>12.0</b>
LSD /LSA	677	10.3	534	10.3	143	10.2
LSD	672	10.2	532	10.3	140	10.0
LSA	10	0.2	6	0.1	4	0.3
<b>Plantas alucinógenas o disociativas</b>	<b>285</b>	<b>4.3</b>	<b>244</b>	<b>4.7</b>	<b>41</b>	<b>2.9</b>
Hongos alucinógenos	136	2.1	120	2.3	16	1.1
Peyote (mezcalina)	104	1.6	93	1.8	11	0.8
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	53	0.8	42	0.8	11	0.8
Ololiuhqui	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Floripondio	13	0.2	12	0.2	1	0.1
Ayahuasca	23	0.4	14	0.3	9	0.6
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	28	0.4	24	0.5	4	0.3
<b>Alucinógenos sintéticos</b>	<b>63</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>1.0</b>	<b>13</b>	<b>0.9</b>
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	6	0.1	6	0.1	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	7	0.1	7	0.1	0	0.0
DMT	49	0.7	37	0.7	12	0.9
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogos del DMT	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Grupo 2C x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	5	0.1	3	0.1	2	0.1
Otras sustancias con efectos psicodélicos	5	0.1	2	0.0	3	0.2

Continúa

**Cuadro 19. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**  
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Heroína</b>	<b>108</b>	<b>1.6</b>	<b>91</b>	<b>1.8</b>	<b>17</b>	<b>1.2</b>
Heroína blanca	41	0.6	35	0.7	6	0.4
Heroína negra o morena	71	1.1	60	1.2	11	0.8
<b>Opioides (uso fuera de prescripción)</b>	<b>80</b>	<b>1.2</b>	<b>60</b>	<b>1.2</b>	<b>20</b>	<b>1.4</b>
Oxicodona	2	0.0	1	0.0	1	0.1
Opioides sintéticos	16	0.2	11	0.2	5	0.4
Fentanil y análogos	5	0.1	5	0.1	0	0.0
Dextrometorfano	51	0.8	41	0.8	10	0.7
Derivados opioides combinados con analgésicos	13	0.2	8	0.2	5	0.4
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>23</b>	<b>0.4</b>	<b>17</b>	<b>0.3</b>	<b>6</b>	<b>0.4</b>
Opio	11	0.2	9	0.2	2	0.1
Morfina (uso fuera de prescripción)	9	0.1	6	0.1	3	0.2
Codeína (uso fuera de prescripción)	3	0.0	2	0.0	1	0.1
<b>Sustancias de uso médico</b>	<b>129</b>	<b>2.0</b>	<b>86</b>	<b>1.7</b>	<b>43</b>	<b>3.1</b>
Anticolinérgicos	8	0.1	7	0.1	1	0.1
Antiespasmódicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	8	0.1	5	0.1	3	0.2
Antidepresivos	62	0.9	40	0.8	22	1.6
Antipsicóticos o neurolepticos	6	0.1	4	0.1	2	0.1
Antihistamínicos	3	0.0	2	0.0	1	0.1
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	43	0.7	29	0.6	14	1.0
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>63</b>	<b>1.0</b>	<b>55</b>	<b>1.1</b>	<b>8</b>	<b>0.6</b>
Nitritos	8	0.1	8	0.2	0	0.0
Anestésicos	4	0.1	4	0.1	0	0.0
Bebidas energizantes	29	0.4	27	0.5	2	0.1
Drogas o bebidas inteligentes	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	9	0.1	6	0.1	3	0.2
Sustancias sin especificar	14	0.2	11	0.2	3	0.2

**Cuadro 20. Total de drogas consumidas en el último año  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	128	2.0	89	1.7	39	2.8
1 sustancia	762	11.6	549	10.6	213	15.3
2 sustancias	1,546	23.6	1,180	22.9	366	26.2
3 sustancias	1,891	28.8	1,543	29.9	348	24.9
4 sustancias	1,278	19.5	1,055	20.4	223	16.0
5 sustancias	558	8.5	446	8.6	112	8.0
6 sustancias	236	3.6	180	3.5	56	4.0
7 sustancias	85	1.3	61	1.2	24	1.7
8 sustancias	42	0.6	33	0.6	9	0.6
9 sustancias	19	0.3	18	0.3	1	0.1
10 sustancias	6	0.1	4	0.1	2	0.1
11-15 sustancias	5	0.1	2	0.0	3	0.2
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	3.1 (1.5) drogas		3.1 (1.5) drogas		2.9 (1.7) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		2 drogas	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 21. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	795	12.1	563	10.9	232	16.6
1 sustancia	3,020	46.1	2,373	46.0	647	46.3
2 sustancias	1,688	25.7	1,403	27.2	285	20.4
3 sustancias	653	10.0	511	9.9	142	10.2
4 sustancias	238	3.6	189	3.7	49	3.5
5 sustancias	96	1.5	72	1.4	24	1.7
6 sustancias	44	0.7	33	0.6	11	0.8
7 sustancias	13	0.2	12	0.2	1	0.1
8 sustancias	3	0.0	2	0.0	1	0.1
9 sustancias	2	0.0	1	0.0	1	0.1
10 sustancias	3	0.0	2	0.0	1	0.1
11-13 sustancias	2	0.0	0	0.0	2	0.1
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	1.6 (1.2) drogas		1.6 (1.1) drogas		1.5 (1.3) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 22. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>4,269</b>	<b>65.1</b>	<b>3,436</b>	<b>66.6</b>	<b>833</b>	<b>59.7</b>
Tabaco	4,218	64.3	3,396	65.8	822	58.9
Nicotina en dispositivo electrónico	58	0.9	44	0.9	14	1.0
<b>Alcohol</b>	<b>5,044</b>	<b>76.9</b>	<b>3,987</b>	<b>77.3</b>	<b>1,057</b>	<b>75.7</b>
Bebidas fermentadas	3,467	52.9	2,745	53.2	722	51.7
Bebidas destiladas	1,943	29.6	1,534	29.7	409	29.3
Alcohol puro ("alcohol del 96")	160	2.4	123	2.4	37	2.7
<b>Cannabis</b>	<b>3,549</b>	<b>54.1</b>	<b>2,823</b>	<b>54.7</b>	<b>726</b>	<b>52.0</b>
Mariguana "estándar"	3,463	52.8	2,756	53.4	707	50.6
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	120	1.8	92	1.8	28	2.0
Hachís - Resina	48	0.7	41	0.8	7	0.5
Hachís - Aceite o miel	15	0.2	14	0.3	1	0.1
<b>Sustancias similares al cannabis</b>	<b>41</b>	<b>0.6</b>	<b>32</b>	<b>0.6</b>	<b>9</b>	<b>0.6</b>
"Mariguana" sintética	31	0.5	26	0.5	5	0.4
Medicamentos con compuestos cannábicos	10	0.2	6	0.1	4	0.3
<b>Inhalables</b>	<b>466</b>	<b>7.1</b>	<b>372</b>	<b>7.2</b>	<b>94</b>	<b>6.7</b>
Solventes y removedores	285	4.3	232	4.5	53	3.8
Pegamentos	81	1.2	60	1.2	21	1.5
Esmaltes y pinturas	39	0.6	30	0.6	9	0.6
Gasolinas y combustibles	10	0.2	8	0.2	2	0.1
Otros inhalables	70	1.1	59	1.1	11	0.8
<b>Cocaína</b>	<b>1,738</b>	<b>26.5</b>	<b>1,471</b>	<b>28.5</b>	<b>267</b>	<b>19.1</b>
Cocaína (clorhidrato)	1,306	19.9	1,088	21.1	218	15.6
Crack	660	10.1	570	11.0	90	6.4
Otro tipo de cocaína	37	0.6	36	0.7	1	0.1
Basuco (pasta base de cocaína)	20	0.3	20	0.4	0	0.0
Otras presentaciones de cocaína	17	0.3	16	0.3	1	0.1
<b>Metanfetaminas</b>	<b>2,800</b>	<b>42.7</b>	<b>2,253</b>	<b>43.7</b>	<b>547</b>	<b>39.2</b>
Metanfetaminas: cristal	2,718	41.5	2,188	42.4	530	38.0
Metanfetaminas: hielo	54	0.8	44	0.9	10	0.7
Metanfetaminas: "Metas"	43	0.7	34	0.7	9	0.6
<b>Otros estimulantes del SNC</b>	<b>79</b>	<b>1.2</b>	<b>57</b>	<b>1.1</b>	<b>22</b>	<b>1.6</b>
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	55	0.8	39	0.8	16	1.1
Anorexígenos	5	0.1	3	0.1	2	0.1
Drogas de diseño con efectos estimulantes	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Otros estimulantes	12	0.2	10	0.2	2	0.1

*Continúa*

**Cuadro 22. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**  
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>MDMA y similares</b>	<b>72</b>	<b>1.1</b>	<b>46</b>	<b>0.9</b>	<b>26</b>	<b>1.9</b>
Éxtasis (MDMA)	68	1.0	43	0.8	25	1.8
Sustancias con efectos similares a MDMA	5	0.1	3	0.1	2	0.1
Drogas de diseño con efectos similares	5	0.1	3	0.1	2	0.1
Piperazinas con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Benzodiacepinas</b>	<b>396</b>	<b>6.0</b>	<b>268</b>	<b>5.2</b>	<b>128</b>	<b>9.2</b>
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	391	6.0	263	5.1	128	9.2
Rohypnol	7	0.1	6	0.1	1	0.1
<b>Otros depresores del SNC</b>	<b>56</b>	<b>0.9</b>	<b>39</b>	<b>0.8</b>	<b>17</b>	<b>1.2</b>
GHB o similares	4	0.1	4	0.1	0	0.0
Sedantes hipnóticos	41	0.6	31	0.6	10	0.7
Otros depresores del SNC	13	0.2	6	0.1	7	0.5
<b>Alucinógenos</b>	<b>340</b>	<b>5.2</b>	<b>240</b>	<b>4.7</b>	<b>100</b>	<b>7.2</b>
LSD /LSA	291	4.4	205	4.0	86	6.2
LSD	287	4.4	203	3.9	84	6.0
LSA	6	0.1	3	0.1	3	0.2
Plantas alucinógenas o disociativas	54	0.8	40	0.8	14	1.0
Hongos alucinógenos	26	0.4	21	0.4	5	0.4
Peyote (mezcalina)	12	0.2	9	0.2	3	0.2
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	10	0.2	6	0.1	4	0.3
Ololiuhqui	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Floripondio	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Ayahuasca	8	0.1	2	0.0	6	0.4
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	5	0.1	4	0.1	1	0.1
Alucinógenos sintéticos	25	0.4	17	0.3	8	0.6
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	1	0.0	1	0.0	0	0.0
DMT	23	0.4	15	0.3	8	0.6
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	1	0.0	0	0.0	1	0.1
Grupo 2C x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	1	0.0	0	0.0	1	0.1
Otras sustancias con efectos psicodélicos	3	0.0	1	0.0	2	0.1

Continúa

**Cuadro 22. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**  
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Heroína</b>	<b>57</b>	<b>0.9</b>	<b>47</b>	<b>0.9</b>	<b>10</b>	<b>0.7</b>
Heroína blanca	17	0.3	15	0.3	2	0.1
Heroína negra o morena	42	0.6	34	0.7	8	0.6
<b>Opioides (uso fuera de prescripción)</b>	<b>53</b>	<b>0.8</b>	<b>38</b>	<b>0.7</b>	<b>15</b>	<b>1.1</b>
Oxicodona	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	14	0.2	10	0.2	4	0.3
Fentanil y análogos	3	0.0	3	0.1	0	0.0
Dextrometorfano	31	0.5	24	0.5	7	0.5
Derivados opioides combinados con analgésicos	10	0.2	6	0.1	4	0.3
Desomorfinas	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>8</b>	<b>0.1</b>	<b>5</b>	<b>0.1</b>	<b>3</b>	<b>0.2</b>
Opio	3	0.0	2	0.0	1	0.1
Morfina (uso fuera de prescripción)	5	0.1	3	0.1	2	0.1
Codeína (uso fuera de prescripción)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Sustancias de uso médico</b>	<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>57</b>	<b>1.1</b>	<b>30</b>	<b>2.1</b>
Anticolinérgicos	6	0.1	5	0.1	1	0.1
Antiespasmódicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	5	0.1	4	0.1	1	0.1
Antidepresivos	41	0.6	25	0.5	16	1.1
Antipsicóticos o neurolepticos	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Antihistamínicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	31	0.5	21	0.4	10	0.7
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>41</b>	<b>0.6</b>	<b>35</b>	<b>0.7</b>	<b>6</b>	<b>0.4</b>
Nitritos	5	0.1	5	0.1	0	0.0
Anestésicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Bebidas energizantes	23	0.4	21	0.4	2	0.1
Drogas o bebidas inteligentes	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	5	0.1	2	0.0	3	0.2
Sustancias sin especificar	7	0.1	6	0.1	1	0.1

**Cuadro 23. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones**

		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	632	9.6	9.9	456	8.8	9.0	176	12.6	13.0
	Nicotina en dispositivo electrónico	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.1	0.1
Alcohol	Bebidas fermentadas	756	11.5	11.8	589	11.4	11.6	167	12.0	12.3
	Bebidas destiladas	418	6.4	6.5	320	6.2	6.3	98	7.0	7.2
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	38	0.6	0.6	32	0.6	0.6	6	0.4	0.4
Cannabis	Mariguana "estándar"	1,811	27.6	28.2	1,490	28.9	29.5	321	23.0	23.7
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	63	1.0	1.0	52	1.0	1.0	11	0.8	0.8
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	13	0.2	0.2	13	0.3	0.3	0	0.0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	94	1.4	1.5	72	1.4	1.4	22	1.6	1.6
	Pegamentos	25	0.4	0.4	17	0.3	0.3	8	0.6	0.6
	Esmaltes y pinturas	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Gasolinas y combustibles	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otros inhalables	24	0.4	0.4	19	0.4	0.4	5	0.4	0.4
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	251	3.8	3.9	222	4.3	4.4	29	2.1	2.1
	Crack	295	4.5	4.6	263	5.1	5.2	32	2.3	2.4
	Basuco (pasta base de cocaína)	5	0.1	0.1	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	8	0.1	0.1	8	0.2	0.2	0	0.0	0.0
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	1,577	24.1	24.6	1,235	23.9	24.4	342	24.5	25.3
	Metanfetaminas: hielo	34	0.5	0.5	26	0.5	0.5	8	0.6	0.6
	Metanfetaminas: "Metas"	10	0.2	0.2	9	0.2	0.2	1	0.1	0.1
Otros estimulantes	Sales de baño	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Anfetaminas y derivados	14	0.2	0.2	12	0.2	0.2	2	0.1	0.1
	Anorexígenos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otros estimulantes	4	0.1	0.1	3	0.1	0.1	1	0.1	0.1
Alucinógenos	LSD	11	0.2	0.2	7	0.1	0.1	4	0.3	0.3
	Hongos alucinógenos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1
	Otras sustancias con efectos psicodélicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1

*Continúa*

**Cuadro 23. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones**  
(Continuación)

		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	7	0.1	0.1	3	0.1	0.1	4	0.3	0.3
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	56	0.9	0.9	23	0.4	0.5	33	2.4	2.4
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	8	0.1	0.1	5	0.1	0.1	3	0.2	0.2
	Otros depresores del SNC	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.1	0.1
Heroína	Heroína blanca	10	0.2	0.2	8	0.2	0.2	2	0.1	0.1
	Heroína negra o morena	25	0.4	0.4	23	0.4	0.5	2	0.1	0.1
Opioides	Opioides sintéticos	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.1	0.1
	Fentanil y análogos	3	0.0	0.0	3	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Dextrometorfano	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Derivados opiodes combinados con analgésicos	5	0.1	0.1	3	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Opiáceos	Opio	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Morfina (uso fuera de prescripción)	4	0.1	0.1	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticonvulsivos	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.1	0.1
	Antidepresivos	12	0.2	0.2	6	0.1	0.1	6	0.4	0.4
	Antipsicóticos o neurolépticos	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Antihistamínicos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.2	0.2
Otras sustancias de abuso	Nitritos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Sustancias no clasificadas	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1
Ninguna		134	2.0	2.1	85	1.6	1.7	49	3.5	3.6
No aplica		128	2.0	Se omite	89	1.7	Se omite	39	2.8	Se omite
Sin información		18	0.3	Se omite	15	0.3	Se omite	3	0.2	Se omite
<b>Total</b>		<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 24. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses  
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	3,229	49.2	66.2	2,650	51.3	67.5	579	41.5	60.8
No combinó drogas	1,650	25.2	33.8	1,277	24.7	32.5	373	26.7	39.2
<i>No aplica</i>	<i>1,678</i>	<i>25.6</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,234</i>	<i>23.9</i>	<i>Se omite</i>	<i>444</i>	<i>31.8</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 25. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	758	11.6	550	10.7	208	14.9
1 sustancia	1,408	21.5	1,044	20.2	364	26.1
2 sustancias	1,864	28.4	1,466	28.4	398	28.5
3 sustancias	1,595	24.3	1,344	26.0	251	18.0
4 sustancias	680	10.4	556	10.8	124	8.9
5 sustancias	185	2.8	150	2.9	35	2.5
6 sustancias	45	0.7	32	0.6	13	0.9
7 sustancias	11	0.2	10	0.2	1	0.1
8 sustancias	10	0.2	8	0.2	2	0.1
11 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.1 (1.3) drogas		2.2 (1.3) drogas		1.9 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Decil1	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 26. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	2,112	32.2	1,569	30.4	543	38.9
1 sustancia	3,002	45.8	2,399	46.5	603	43.2
2 sustancias	1,131	17.2	943	18.3	188	13.5
3 sustancias	247	3.8	199	3.9	48	3.4
4 sustancias	41	0.6	32	0.6	9	0.6
5 sustancias	16	0.2	12	0.2	4	0.3
6 sustancias	7	0.1	6	0.1	1	0.1
9 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	1.0 (0.9) drogas		1.0 (0.9) drogas		0.8 (0.9) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 27. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>3,672</b>	<b>56.0</b>	<b>2,982</b>	<b>57.8</b>	<b>690</b>	<b>49.4</b>
Tabaco	3,627	55.3	2,948	57.1	679	48.6
Nicotina en dispositivo electrónico	48	0.7	36	0.7	12	0.9
<b>Alcohol</b>	<b>3,734</b>	<b>56.9</b>	<b>2,990</b>	<b>57.9</b>	<b>744</b>	<b>53.3</b>
Bebidas fermentadas	2,533	38.6	2,033	39.4	500	35.8
Bebidas destiladas	1,391	21.2	1,103	21.4	288	20.6
Alcohol puro ("alcohol del 96")	105	1.6	84	1.6	21	1.5
<b>Cannabis</b>	<b>2,472</b>	<b>37.7</b>	<b>2,009</b>	<b>38.9</b>	<b>463</b>	<b>33.2</b>
Mariguana "estándar"	2,404	36.7	1,954	37.9	450	32.2
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	89	1.4	73	1.4	16	1.1
Hachís - Resina	17	0.3	14	0.3	3	0.2
Hachís - Aceite o miel	6	0.1	6	0.1	0	0.0
<b>Sustancias similares al cannabis</b>	<b>27</b>	<b>0.4</b>	<b>23</b>	<b>0.4</b>	<b>4</b>	<b>0.3</b>
"Mariguana" sintética	22	0.3	20	0.4	2	0.1
Medicamentos con compuestos cannábicos	5	0.1	3	0.1	2	0.1
<b>Inhalables</b>	<b>270</b>	<b>4.1</b>	<b>219</b>	<b>4.2</b>	<b>51</b>	<b>3.7</b>
Solventes y removedores	176	2.7	144	2.8	32	2.3
Pegamentos	44	0.7	33	0.6	11	0.8
Esmaltes y pinturas	15	0.2	11	0.2	4	0.3
Gasolinas y combustibles	5	0.1	5	0.1	0	0.0
Otros inhalables	34	0.5	30	0.6	4	0.3
<b>Cocaína</b>	<b>953</b>	<b>14.5</b>	<b>829</b>	<b>16.1</b>	<b>124</b>	<b>8.9</b>
Cocaína (clorhidrato)	590	9.0	505	9.8	85	6.1
Crack	428	6.5	379	7.3	49	3.5
Otro tipo de cocaína	22	0.3	21	0.4	1	0.1
Basuco (pasta base de cocaína)	11	0.2	11	0.2	0	0.0
Otras presentaciones de cocaína	11	0.2	10	0.2	1	0.1
<b>Metanfetaminas</b>	<b>1,866</b>	<b>28.5</b>	<b>1,516</b>	<b>29.4</b>	<b>350</b>	<b>25.1</b>
Metanfetaminas: cristal	1,811	27.6	1,471	28.5	340	24.4
Metanfetaminas: hielo	39	0.6	32	0.6	7	0.5
Metanfetaminas: "Metas"	20	0.3	16	0.3	4	0.3
<b>Otros estimulantes del SNC</b>	<b>43</b>	<b>0.7</b>	<b>32</b>	<b>0.6</b>	<b>11</b>	<b>0.8</b>
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	29	0.4	22	0.4	7	0.5
Anorexígenos	3	0.0	2	0.0	1	0.1
Drogas de diseño con efectos estimulantes	4	0.1	3	0.1	1	0.1
Otros estimulantes	7	0.1	5	0.1	2	0.1

*Continúa*

**Cuadro 22. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**  
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>MDMA y similares</b>	<b>25</b>	<b>0.4</b>	<b>16</b>	<b>0.3</b>	<b>9</b>	<b>0.6</b>
Éxtasis (MDMA)	22	0.3	14	0.3	8	0.6
Sustancias con efectos similares a MDMA	3	0.0	2	0.0	1	0.1
Drogas de diseño con efectos similares	3	0.0	2	0.0	1	0.1
Piperazinas con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Benzodiacepinas</b>	<b>210</b>	<b>3.2</b>	<b>131</b>	<b>2.5</b>	<b>79</b>	<b>5.7</b>
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	209	3.2	130	2.5	79	5.7
Rohypnol	3	0.0	2	0.0	1	0.1
<b>Otros depresores del SNC</b>	<b>29</b>	<b>0.4</b>	<b>21</b>	<b>0.4</b>	<b>8</b>	<b>0.6</b>
GHB o similares	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Sedantes hipnóticos	22	0.3	17	0.3	5	0.4
Otros depresores del SNC	7	0.1	4	0.1	3	0.2
<b>Alucinógenos</b>	<b>97</b>	<b>1.5</b>	<b>67</b>	<b>1.3</b>	<b>30</b>	<b>2.1</b>
LSD /LSA	85	1.3	61	1.2	24	1.7
LSD	83	1.3	60	1.2	23	1.6
LSA	3	0.0	2	0.0	1	0.1
Plantas alucinógenas o disociativas	6	0.1	5	0.1	1	0.1
Hongos alucinógenos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Peyote (mezcalina)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Ololiuhqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ayahuasca	1	0.0	0	0.0	1	0.1
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Alucinógenos sintéticos	5	0.1	2	0.0	3	0.2
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
DMT	4	0.1	1	0.0	3	0.2
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogos del DMT	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	1	0.0	0	0.0	1	0.1
Otras sustancias con efectos psicodélicos	1	0.0	0	0.0	1	0.1

Continúa

**Cuadro 22. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**  
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Heroína</b>	<b>41</b>	<b>0.6</b>	<b>35</b>	<b>0.7</b>	<b>6</b>	<b>0.4</b>
Heroína blanca	9	0.1	9	0.2	0	0.0
Heroína negra o morena	32	0.5	26	0.5	6	0.4
<b>Opioides (uso fuera de prescripción)</b>	<b>31</b>	<b>0.5</b>	<b>24</b>	<b>0.5</b>	<b>7</b>	<b>0.5</b>
Oxicodona	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	10	0.2	8	0.2	2	0.1
Fentanil y análogos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Dextrometorfano	14	0.2	12	0.2	2	0.1
Derivados opioides combinados con analgésicos	9	0.1	6	0.1	3	0.2
Desomorfinas	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>6</b>	<b>0.1</b>	<b>4</b>	<b>0.1</b>	<b>2</b>	<b>0.1</b>
Opio	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	5	0.1	3	0.1	2	0.1
Codeína (uso fuera de prescripción)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Sustancias de uso médico</b>	<b>54</b>	<b>0.8</b>	<b>34</b>	<b>0.7</b>	<b>20</b>	<b>1.4</b>
Anticolinérgicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiespasmódicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	3	0.0	2	0.0	1	0.1
Antidepresivos	28	0.4	16	0.3	12	0.9
Antipsicóticos o neurolepticos	1	0.0	0	0.0	1	0.1
Antihistamínicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	20	0.3	14	0.3	6	0.4
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>27</b>	<b>0.4</b>	<b>25</b>	<b>0.5</b>	<b>2</b>	<b>0.1</b>
Nitritos	4	0.1	4	0.1	0	0.0
Anestésicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Bebidas energizantes	15	0.2	15	0.3	0	0.0
Drogas o bebidas inteligentes	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Sustancias sin especificar	5	0.1	5	0.1	0	0.0

**Cuadro 28. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	505	7.7	14.5	395	7.7	14.0	110	7.9	16.4
< de 1 vez a la semana	1,185	18.1	34.0	918	17.8	32.6	267	19.1	39.9
1 o 2 veces a la semana	1,108	16.9	31.8	929	18.0	33.0	179	12.8	26.7
Cada tercer día	344	5.2	9.9	279	5.4	9.9	65	4.7	9.7
Diario	347	5.3	9.9	298	5.8	10.6	49	3.5	7.3
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	2,941	44.9	<i>Se omite</i>	2,256	43.7	<i>Se omite</i>	685	49.1	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	127	1.9	<i>Se omite</i>	86	1.7	<i>Se omite</i>	41	2.9	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

**Cuadro 29. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	937	14.3	23.0	732	14.2	22.1	205	14.7	26.8
1 o 2 veces a la semana	916	14.0	22.5	774	15.0	23.4	142	10.2	18.5
Cada tercer día	656	10.0	16.1	528	10.2	15.9	128	9.2	16.7
Diario	1,568	23.9	38.5	1,277	24.7	38.6	291	20.8	38.0
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	2,112	32.2	<i>Se omite</i>	1,569	30.4	<i>Se omite</i>	543	38.9	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	368	5.6	<i>Se omite</i>	281	5.4	<i>Se omite</i>	87	6.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>6,557</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,161</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de cualquier dosis.

**Cuadro 30. Problemas asociados al consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	3,739	57.0	2,971	57.6	768	55.0
Accidentes o lesiones	5,599	85.4	4,485	86.9	1,114	79.8
Problemas familiares	1,880	28.7	1,534	29.7	346	24.8
Problemas escolares	1,820	27.8	1,435	27.8	385	27.6
Problemas laborales	2,894	44.1	2,495	48.3	399	28.6
Problemas psicológicos	4,638	70.7	3,632	70.4	1,006	72.1
Problemas legales	1,601	24.4	1,363	26.4	238	17.0
Conducta antisocial o delictiva	1,517	23.1	1,313	25.4	204	14.6
Otros problemas	1,524	23.2	1,182	22.9	342	24.5
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>304</i>	<i>4.6</i>	<i>191</i>	<i>3.7</i>	<i>113</i>	<i>8.1</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>5,600</i>	<i>85.4</i>	<i>4,490</i>	<i>87.0</i>	<i>1,110</i>	<i>79.5</i>

## GLOSARIO

<b>Droga ilícita de inicio</b>	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
<b>Droga de mayor impacto</b>	Sustancia por la que acuden los usuarios de drogas a tratamiento.
<b>Droga de preferencia</b>	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
<b>Estrato social</b>	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
<b>Nuevas sustancias de abuso o de uso poco común</b>	<p>Sustancias psicoactivas que han sido conocidas en el mercado por términos tales como “drogas de diseño”, “euforizantes legales”, “hierbas euforizantes”, “sales de baño”, “productos químicos de investigación” y “reactivos de laboratorio” y que no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública.</p> <p>El término “nuevas” no se refiere necesariamente a nuevas invenciones, sino que son sustancias que han aparecido recientemente en el mercado o que su consumo ha cobrado relevancia en los últimos años.</p>
<b>Tipo de consumo de drogas ilícitas</b>	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
<b>Total de drogas consumidas</b>	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
<b>Uso combinado de drogas</b>	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.