



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.

SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
DEL CONSUMO DE DROGAS

**CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES
DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE
INTEGRACIÓN JUVENIL**

CONSUMIDORES DE DROGAS ILÍCITAS

PRIMER SEMESTRE DEL 2022

Dirección de Investigación y Enseñanza

Subdirección de Investigación

México, septiembre del 2022

Informe de Investigación 22-04a



Reporte del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Consumidores de Drogas Ilícitas. Primer semestre del 2022. (Informe de investigación 22-04a)

Citación para el presente documento:

Centros de Integración juvenil, A.C. (2022). Reporte del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Consumidores de Drogas Ilícitas. Primer semestre del 2022. (Informe de Investigación 22-04a). Ciudad de México, México: CIJ.

Disponible en: <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/Epidemiologica.asp>

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Dra. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD

Mtro. David Bruno Diaz Negrete

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Rodrigo Alonzo Marín Navarrete

SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

CRÉDITOS

Procesamiento, análisis estadístico de datos y elaboración de informe

Lic. Esp. Alma Delia Gutiérrez López

Supervisión

Dr. Rodrigo Alonzo Marín Navarrete

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

AGRADECIMIENTOS

El Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica agradece los continuos esfuerzos del equipo técnico-médico responsable de recopilar y reportar los datos a través del formato de entrevista inicial:

Acapulco: Miriam Galeana López, Salvio Vargas Ramírez, Imelda González Espino Barros, Lorena Salinas Acevedo, María de Lourdes Barrientos Solís; **Aguascalientes:** Gabriel Flores Loreda; **Álvaro Obregón Centro:** Alejandra Arias Mejía, Clemente García Rojas, Ernesto Hernández Sánchez, Gloria Islas Rodríguez, María del Carmen López Jaimes, María de los Ángeles Velázquez Soto, Ricardo Fajardo Ortiz; **Apodaca:** Claudia Maribel Cantú Jiménez, Rosio Ibarra Contreras, Fernando Cuevas Rivera; **Atizapán:** Antonio Isaac Olguín Rubio, Yadira Jiménez García, Leticia Baza Cruz, Viridiana Ramírez Martínez; **Azcapotzalco:** César Ramírez Trejo, María Eugenia Castilla Platonoff, Beatriz González Pérez, Yezmin Estrella Briseño Pérez, Leonor Quecholac García, Juan Francisco Ramírez Estrada, Xóchitl Nava Martínez, José Luis Castillo Fontes; **Benito Juárez:** Edith Ledesma Martínez, Martha Patricia Alvarado Tello, Luz Gabriela Olmos Velázquez; **Cancún:** Alfredo Hatchett Anaya, Manuel Segura Enríquez, Marcela Antonio Joaquín, Ayde Rocío Meléndez Ruíz, Rosa Concepción Vázquez Pérez, Keyla Esther Segovia Sánchez; **Chalco:** Heidi Aldana Montero, José Luis Cervantes Flores, María de Lourdes Estévez Encarnación, Edith Guevara Lugo, Donaji Martínez Aguascalientes, Isela Hernández Rodríguez; **Chetumal:** Omar Alejandro Trejo Corona; **Chilpancingo:** Julia Berenice Hernández Pérez, Nayeli Alvarado Andrade, Miriam Rodríguez Mancilla; **Ciudad del Carmen:** Henry Tulio Ortiz Figueroa; **Ciudad Juárez Norte:** María Elizabeth Avendaño Ambrocio; **Ciudad Victoria:** Dulce Ivette Aguilar Gámez, Ana Laura Rodríguez Castillo, Ana Gabriela Méndez Gómez; **Colima:** Ana Anguiano Valdez, Lilia Margarita Machuca Ayala, Sandra Ramírez López; **Coyoacán:** María Alejandra Saucedo García, Juan Manuel Vázquez Gutiérrez, Judith Hernández Velasco, María de Lourdes Valverde Morales, Marisol Mora Tavares Ureta, Rebeca Morales Hernández, Erick Moreno Romero, Ernesto Tian Chai González Cinco, Sandra Rodríguez Sierra; **Cuajimalpa:** María Magdalena Hernández López, Marco Antonio Toquero Hernández, Georgina Moreno Mercado, Ada Patricia Mendoza Bevide, Marco Antonio Ríos Salinas; **Cuahtémoc Oriente:** Jonathan Israel Hernández Vargas; **Cuernavaca:** Rosalía Camarillo Moreno, Laura Hernández Gama, Petra Alicia Ávila Loera, Elsa Román González, Eduardo Raúl Herrera Fuentes, Jenny Basilia Cortes Grajales, Paola Pérez Cornelio, Kristal Rosales Ortíz; **Culiacán Oriente:** José Luis Araujo Meza, Fernando García Saavedra, Norma Alicia Ibarra Díaz, José Carlos Soto Ayala; **Durango:** José Ibarra Serrano, Argelia Reyes Fematt, Olga Patricia Molina Vargas, Blanca Patricia Figueroa Zaldivar; **Ecatepec:** Alma Leticia Covarrubias Vázquez, Norma Virginia Hernández Olguín, Miryam Ruiz Alizota, Carlos Eduardo Cruz Rodríguez, Moises Vázquez Ostiguín, Allyson Aguilar Matus, Erika Janette Castillo García, Sandra Elizabeth Cervantes Altamirano; **Escuinapa:** Tonantzi Toledo López, José de Jesús Rodríguez Flores; **Guadalajara Centro:** Patricia Coronel Vázquez, Norma Angélica Gutiérrez Martínez, Laura Rocío Salcedo Fuentes, María Teresa Rosas Ortiz, Silvestre Rivera Tamayo, Emanuel González Orendain, Gilberto Rodríguez de Alba, Laura Patricia Covián Herrera; **Guadalajara Sur:** Luis Manuel Lomelí López, Liliana Patricia Ramos Linares, Juan Emilio López Méndez, Federico Topete González, Rosa María Ramírez Estrada, Elvira Virgen Reyes; **Guadalupe:** María Magdalena González Sánchez, Adriana Medina Rodríguez, Humberto Ortiz Morales, María Yolanda Arellano García, Laura Hernández Martínez; **Guadalupe Zacatecas:** Suheyth Sánchez Ramírez; **Guamúchil:** Yesenia Camacho Armenta, Maricela Peñuelas García, Nancy Aylin Ruelas Uriarte; **Guanajuato:** María Eugenia Pérez Rodríguez, Paola Solís Moreno; **Guasave:** Elda Guadalupe Ayala López, Yesica María Morales Pardini, Nancy Guadalupe Piña Choza, Ángel Luz Acosta Cruz, Julio César González Rochín; **Gustavo A. Madero Aragón:** Luis Ricardo Macías Molina, Fernando Valdés Suárez, Fausto Alvarado Meneses, Ma. Tomasa Escalera Bustos, Verónica Martínez Mejía, María Evelyn Ruiz Méndez, Diana Elizabeth Tinoco Pérez, Silvia Olguín Rubio; **Gustavo A. Madero Norte:** Radilla Ortiz María Georgina, Corona Candelaria Rebeca, Negrete Lepe María Roxana, Leticia Barroso Anaya, Eduardo Antonio Montero Flores, Verónica García Portillo, María del Consuelo González Vargas, Yaneth Yerena González; **Gustavo A. Madero Oriente:** Xóchitl Espinosa Rodríguez, María Teresa Rosado Balleza, Josefina del Carmen Palacios Ballinas; **Hermosillo:** Alan Fabián Sánchez Ayala, Ariel Sebastián Monroy Eliosa, María Guadalupe Rodríguez García, María Dolores Murrieta Montañón; **Huatulco:** Jonathan López Hernández; **Ixtapa Zihuatanejo:** Gloelia Gallardo Rivera; **Iztapalapa**

Oriente: María de la Luz Macías Montes, María del Rosario Arriaga Behumea, Julieta Espinosa Carme, Bautista Reyes Jesús, Leticia Martínez Urbina, Claudia María Hernández del ángel, Yazmín Alcántara Chavarría, Jannet Galicia flores, Jessica Alejandra Amador García, Betzabe Martínez Ávila, Jesús Iván Yerena González; **Iztapalapa Poniente:** María Teresa Bolaños Téllez, María Elena Ramírez Luna, Olga de la Torre Ibáñez, Reyna Alejandra Salazar Espiritu, Rafael Vázquez Maldonado, María del Pilar Ávila Cabrera, Elizabeth López Sotres; **La Paz:** María del Socorro Ramírez Cota; **La Piedad:** Adrián Salvador Aguirre Tafoya; **Laguna Durango:** Silvia Esther Duarte Rangel, María De Jesús Robles del Río, Isis Alejandrina Ortiz Duarte; **Laguna:** Cecilia Pineda Granadas, Paloma de los Santos Ortega, Elvia Gabriela Sosa Urbina, Nadia Azucena Pedroza Verastegui, David Rocha Rocha, María Teresa Sifuentes González, Zaira Patricia Ibarra Vázquez, Cecilia Martínez López, José Alberto Calderón Godínez; **Los Cabos:** Adriana Araceli Martínez Savín, Dulce Karely Castro Lugo, María del Jesús Sainz Santillán, Juan Rubén Rivera Cabrera; **Los Mochis:** María Elena López Rojo, Daniel Rodríguez León, Zulma Torres Audeves, Claudia Zulema Tirado Arredondo; **Manzanillo:** Norma Lorena Bravo García, Alma Rosa Barrios del Valle, Ana Jaqueline Lomelí Mancilla, Dulce Denubhy Rodríguez Zambrano, Miriam Ignacia Urzúa Cázares; **Mazatlán “Dr. Jesús Kúmate Rodríguez”:** David Ontiveros Lizárraga; **Mazatlán:** Francisco Javier Escobar Chávez, Alma Verónica Hernández Ruíz, Alba Sugey Rodrigo Chávez, David Covarrubias Alcaraz, Margarita Sánchez Santos, Rosa Herendida Uribe Chávez; **Mérida:** Carmen Lidia Zapata Martínez; **Mexicali:** Gloria Estela Portillo García, Raquel Felipe Pacheco, María Isabel Viramontes Tostado, Gloria Isabel Sotelo Ríos, Refugio Adin flores Angulo, Eva Vanessa Saadeh Chávez; **Miguel Hidalgo:** Jorge Alejandro Paredes Nava, Juan Carlos Martínez Islas, José Francisco Octavio Gómez González, María Cristina Gutiérrez Alcántara, Alejandro Zambrano González, Rocío Juana Estrada García; **Morelia:** José Ramón Fernández Rius, Patricia González Martínez, Isabel González Sánchez, René Ibarra Cisneros, Dinora Rafael Vargas, Janette Paz Silva, Elena Angélica Lezama López; **Naucalpan:** Rosa María Hernández de Jesús; **Nezahualcóyotl:** Samuel Arellano Chávez, José Antonio González Duana, José Juan Ruíz Mendoza, Susana Jiménez Ortega, Rocío Cuevas Moreno, Beatriz Sofía Rodríguez Jiménez, Marisol Meza Moreno, Pamela Serrano Covarrubias; **Oaxaca:** Francisco Rolando Olivera Aguilar, Karla Irasema García Mendoza, José Daniel Badillo Camacho; **Pachuca:** Elsa Ivette Céspedes Camacho, Norma Chantal Reyes Montaño; **Playa del Carmen:** Christopher Manuel Cauich Moo, Nancy Clorinda Ramírez Cortes; **Poza Rica:** Alejandra Torres Bautista; **Puebla:** Carlos Fernández Campos, Cesar Medina Rodríguez, Estela Hernández López, Laura Guerra Ávila, Claudia Lozada Dirccio; **Puerto Vallarta:** Xóchitl Montoy Guzmán, Liz Anel Osuna Sandoval, Susana Gertrudis Linares Cu, Ana Karina Llerenas Briceño, Julio César Curiel Pérez; **Querétaro:** Ana Luisa Reynoso Rentería, Raúl Parra Rodríguez, María Estela Frías Borja, José Simón Honold Espinosa; **Reynosa:** Claudia Patricia Cruz Cruz, Hairam Rodríguez Hernández; **Salamanca:** César Jancarlo Cruz Marín, María Alejandra González Flores, Laura Beatriz López Palma, Cecilia Vargas Palestina; **Saltillo:** María del Consuelo Mares Quintero, María Concepción Jaramillo Flores, Francisco Javier Ruiz Medina, Marcos Alejandro Dena González, Norma Leticia Covarrubias Laureano, Isela Alejandra Montoya Ramón; **San Luis Potosí:** Aurea Gaitán Velázquez, Patricia Rangel Martínez, Rosa Martina Alférez Martínez, Leticia Jaime Reyes, Patricia Eugenia Avilés Hernández, Norma Leticia Alonso Duque, María Margarita Anguiano Izquierdo, Marisol Orocio Contreras; **San Nicolás de los Garza:** Miriam Guadalupe Armendáriz Bustos, Otilia Violeta González, Felipe de Jesús Ramírez, Narciso Solares Rojas; **Tampico:** Evangelina Cerecedo Martínez, Mary Carmen Cruz Islas, Amalia Pineda Martínez, Jorge Ramón Portillo Velázquez, Giovana Marisol Medina Carreño, Ma. Guadalupe Palacios Torres; **Tapachula:** Miguel Ángel Mancera Castillo; **Tehuacán:** Mónica Vázquez Blanco, Sara Ramos Cuevas; **Texcoco:** José Juan Bautista Butrón, Eusebia Rojas Herrera, Sara Elvira Galicia Gutiérrez, María Magdalena Ramos Martínez, Fabiola Gómez García, Carmen Naly Santiago Fierro, Cristhian Dávila Quinto; **Tijuana Guaycura:** José Rosario Álvarez Álvarez, María del Carmen Zavala Monreal, Lirio Inzunza Contreras, Norma Angélica Guadalupe Moysen Vargas, Gemma Lizeth Plascencia Mendoza, Brenda Karina Colio Flores; **Tijuana Soler:** Flora Martínez Aguirre, Ninfa Martínez García, Cecilia Sarmiento Solano, María del Carmen Velázquez Flores, José Carlos Cruz Aguilera, Mónica Jazmín Salinas Sánchez, Deborah Jovana Figueroa Castañeda; **Tlalpan:** Alejandra Avalos Torres, Olivia Jani Vega González, Virginia Ortiz González; **Tlaquepaque:** Ramiro Cuevas Díaz, Francisco Águila Orosco, Juan Antonio Chávez Vázquez, Laura Flores Fermín, Luis Jorge Ayala Mora, Miriam Esther Trejo Núñez, Cindy Margarita Reynoso Carreño, Adriana Núñez Sánchez, Kitzia Fernanda Flores Plascencia; **Tlaxcala:** Adriana Guerrero Romero, Minerva Paola Moreno Caporal; **Toluca:** Eloisa Medina Gutiérrez, Cruz Cielo Piñón, Araceli Olvera Verdeja, Martha Susana Escobedo Galindo, Juana Bernal Malvaez, Xóchitl García Sánchez; **Tuxtla Gutiérrez:** Samy Rubí Solís Mendez, Brenda Jeanette Figueroa Rodríguez, Margarita Fabiola Chool Contreras, Tania Sevilla Saucedo, Carlos Arturo Hernández Albores, Olga Rossana Góngora Garza; **Venustiano Carranza:** Ana María González Serrano, Alma Rosa Cuevas Caballero, José Adrián Herrera Sánchez, José Ulises Maldonado del Ángel, Blanca Flor Urbina Camacho, Miguel Ángel Morales Molina, Joaquín Zamora Escutia, Gloria Contreras Álvarez; **Villavictoria:** Elvira Garduño Huertas, Marlen Vidal Luis; **Xalapa:** Daniel Castañeda Enríquez, Norma Leticia Sánchez Arauz, Dulce María Meza Loeza, Antonio de Jesús Álvarez Guillén, Rafael Miguel Contreras Pérez, Reyna Elena Torres Hernández, Nayeli Castillo Quiroz, Brenda Yohaly Vivanco Herrera; **Yucatán:** Pedro Luis Arango Torrejón; **Zacatecas:** Alfredo Álvarez Haro, Miguel Ángel Solís Ruvalcaba, José Martín de León Cruz, Jazmín Angélica Treto Martínez; **U. H. Ciudad Juárez:** José Manuel Carrillo Avendaño; **U. H. Culiacán:** Danny Eloir Meza Castro, José Noel Iribe Pérez, Ernesto Javier Benítez Gaspar; **U. H. Ecatepec:** Michelle Pérez Palacios, Marco Antonio León Espejel, Cesar Carmona Gómez, Hugo González Conde; **U. H. Iztapalapa:** Carol Arrollo Ruano, Serapio Palma Patricio, Lourdes Claudia Chávez Peña, Alonso García González, Juan Jesús Maldonado Hernández, José Manuel Carrillo Avendaño; **U. H. Nuevo León:** Rubén Jesús Ramírez Escareño, Jorge Fernando Sierra Flores, Gerardo Torres Estrada; **U. H. Tijuana:** Luis Alonso Lucero García, Rafael Soto Castellanos, Samantha Vázquez García; **U. H. Zapopan:** Eduviges Guadalupe Salazar Márquez, Olga Lidia Acosta Nungaray, Francisco Armando Rodríguez Álvarez, Karla Alejandra Ávila luna, Mariana Ivón Terrones Domínguez, Enrique Nolasco Ramírez; **U. H. Zapotlán el Grande:** Erika Prado Pérez Paido, Ángel Antonio Montiel Jiménez; **U. T. U. H. Ciudad Juárez:** Jesús Alfredo Castro Ortiz, David Alonso Gómez Melchor; **U. T. U. H. Tijuana:** Abraham Graciano Hernández.

CONTENIDO	PÁG.
RESUMEN	7
ANTECEDENTES	8
MÉTODO	9
RESULTADOS	12
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	13
CONSUMO DE DROGAS	17
NUEVAS SUSTANCIAS DE ABUSO O DE USO POCO COMÚN	28
REFERENCIAS	30
CUADROS	34
GLOSARIO	67

ÍNDICE DE CUADROS**PÁG.**

Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	35
Cuadro 2	Principales motivos de consulta declarados	38
Cuadro 3	Sexo	38
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	39
Cuadro 5	Estado civil	39
Cuadro 6	Escolaridad	40
Cuadro 7	Ocupación	40
Cuadro 8	Estrato social	41
Cuadro 9	Población en situación de vulnerabilidad	41
Cuadro 10	Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones	42
Cuadro 11	Edad de inicio del consumo de tabaco	44
Cuadro 12	Edad de inicio del consumo de alcohol	45
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	45
Cuadro 14	Drogas ilícitas de inicio, según menciones	46
Cuadro 15	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	48
Cuadro 16	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	48
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	49
Cuadro 18	Tipo de consumo de drogas ilícitas	49
Cuadro 19	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	50
Cuadro 20	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	50
Cuadro 21	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	51
Cuadro 22	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	54
Cuadro 23	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	54
Cuadro 24	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	55
Cuadro 25	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	58
Cuadro 26	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	60
Cuadro 27	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	60
Cuadro 28	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	61
Cuadro 29	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	62
Cuadro 30	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	65
Cuadro 31	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	65
Cuadro 32	Problemas asociados al consumo de sustancias	66

RESUMEN

En el primer semestre de 2022 ingresaron 9,252 consumidores de drogas ilícitas a solicitar tratamiento por primera vez a Centros de Integración Juvenil (CIJ), de los cuales el 85.4% lo hizo de manera presencial. Los principales motivos de consulta declarado fueron el consumo de sustancias (84.6%) y otros problemas de salud (30.2%).

La actualización de la información del perfil sociodemográfico y patrón de consumo de sustancias, objetivo del presente estudio, revela que el consumo de drogas sigue siendo un problema que afecta mayormente a la población masculina, en una proporción de 3.3 hombres por cada mujer. Se advierte que en la edad media de ingreso a tratamiento (26.5 años) los hombres tardan un poco más que las que las mujeres para acudir a CIJ (26.9 años y 25.3 años, respectivamente).

La edad promedio de inicio del consumo de tabaco y de alcohol se situó alrededor de los 15 años (15.2 años y 15.1 años, respectivamente), en tanto que la edad de inicio del consumo de drogas ilícitas se situó en 17.5 años.

Las drogas de mayor impacto por las que se solicitó el tratamiento fueron: metanfetaminas (30.5%, esencialmente cristal: 29.9%), cannabis (27.8%; básicamente marihuana estándar: 26.5%) y alcohol (17.1%). Las principales sustancias consumidas alguna vez fueron: alcohol (83.3%), cannabis (78.8%), tabaco (72.1%), metanfetaminas (44.0%), clorhidrato de cocaína (36.7%) y crack (16.2%). Mientras que en el mes previo al ingreso a tratamiento se usó principalmente: alcohol (54.4%), tabaco (51.2%), cannabis (39.9%), metanfetaminas (24.4%), clorhidrato de cocaína (8.5%) y crack (5.2%).

Al analizar el registro de nuevas sustancias de abuso o de uso poco común se observa que 282 consumidores de drogas reportó el uso alguna vez en la vida de marihuana modificada con alto contenido de THC; 186 casos el consumo de hachís en aceite o miel; 139 casos el consumo de nicotina en dispositivos electrónicos; 78, DMT y sustancias análogas; 68, salvia divinorum y otras variantes de salvia; 27, ayahuasca; 24, drogas de diseño estimulantes; 22, fentanilo, 8, Ketamina; 5, fenciclidina y 5, casos el consumo de GHB. No se reportó el consumo de sales de baño, fenitelaminas y desomorfina.

Finalmente, los problemas asociados al consumo de drogas ilícitas más reportados fueron los familiares (80.8%), psicológicos (67.2%), de salud (51.9%), laborales (38.1%) y escolares (33.1%).

ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976¹. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso². Sin embargo, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática³. Posteriormente, se implementa el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha consolidado a través de los años (presentando su última actualización en el año 2021) y realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen en la toma de decisiones de los servicios institucionales. Además, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del consumo de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)⁴ de la Secretaría de Salud, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente Muñiz*” (INPRF)⁵– y el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas a cargo de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría Salud⁶.

El sistema ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, incluyendo el perfil de consumidores de drogas y su trayectoria de consumo⁷, consumo de drogas en mujeres⁸, población infantil⁹ o de acuerdo con las etapas de la vida¹⁰ y estudios de tendencias^{11,12,13,14,15}. Esta información permite enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que sustenta el diseño de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides^{16,17}.

La información reportada a través del sistema ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el 2006, se genera un informe de las características de los consumidores de tabaco y alcohol¹⁸, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores¹⁹; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática²⁰ y que ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes²¹.

Asimismo, la información generada por el Sistema durante más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales^{22,23,24} y también ha sido

referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de los *Estudios de la Comunidad Objetivo* (EBCO)²⁵ realizados por los CIJ a lo largo del país.

Cabe destacar que, considerando la proliferación de nuevas sustancias psicotrópicas de reciente creación o aparición en el mercado de drogas y que no están controladas por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 o la Convención de 1971, pero que pueden representar una amenaza para la salud pública^{26,27}, a partir del primer semestre de 2021 CIJ inicia el registro y seguimiento de Nuevas Sustancias de Abuso (NSA) o de uso poco común.

El presente informe se elaboró con base en información obtenida del Sistema de Información Epidemiológica durante el primer semestre del año 2022 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, el patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento y variables asociadas a la solicitud de tratamiento; de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: Censo, descriptivo, semestral.

Población: 9,252 consumidores de drogas ilícitas procedentes de 112 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2022 (cuadro 1. Anexo).

Fuente de información: Base de datos recuperada el día 5 de Julio de 2022 a las 11:10 hrs., correspondiente al formato electrónico de Entrevista Inicial que llena el personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento en la primera consulta y que forma parte del expediente clínico que se captura en el Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta (Sistema CIJ 3.0).

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato social y población en situación de vulnerabilidad. Las variables de patrón de consumo incluyen: edad de inicio del consumo de sustancias, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, droga ilícita de inicio, consumo alguna vez en la vida, consumo en el último año, consumo en los últimos 30 días; drogas de preferencia

en el último año, droga de mayor impacto, uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso, total de drogas consumidas. También se incluyen variables asociadas a la solicitud de tratamiento: como los motivos de consulta y los problema(s) asociado(s) al consumo.

El registro del consumo de drogas comprende 82 sustancias, las cuales en el caso del consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes se clasifican en 25 categorías de sustancias:

Grupo(s) de Sustancias		Sustancias
Tabaco		Tabaco; Nicotina en dispositivo electrónico
Alcohol		Bebidas fermentadas; Bebidas destiladas; Alcohol puro (alc. del 96)
Cannabis		Mariguana "estándar"; Mariguana modificada, con alto nivel de THC; Hachís – Resina; Hachís - Aceite o miel
Sustancias asociadas al cannabis		"Mariguana" sintética; Medicamentos con compuestos cannábicos
Inhalables		Solventes y removedores; Pegamentos; Esmaltes y pinturas; Gasolinas y combustibles; Otros inhalables
Cocaína	Cocaína (clorhidrato)	Cocaína en polvo blanco
	Crack	Crack
	Otra presentación de cocaína	Basuco (pasta base de cocaína); Otras presentaciones de cocaína
Metanfetaminas		Metanfetaminas: cristal, Hielo; "Metas"
Otros estimulantes		Sales de baño; Anfetaminas y derivados; Anorexígenos; Drogas de diseño con efectos estimulantes; Otros estimulantes
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	Éxtasis (MDMA)
	Sust. con efectos similares al éxtasis	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis; Piperazinas con efectos similares al éxtasis; Aminoindanos
Benzodiazepinas		Benzodiazepinas y sustancias relacionadas; Rohypnol
Otros depresores		GHB o similares; Sedantes hipnóticos; Otros depresores del SNC
Alucinógenos	LSD/LSA	LSD; LSA
	Plantas alucinógenas o disociativas	Hongos alucinógenos; Peyote (mezcalina); Salvia divinorum u otras variedades de salvia; Ololiuhqui; Floripondio; Ayahuasca; Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos
	Otros alucinógenos	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel); Análogos del PCP; Ketamina; Dextrometorfano; DMT; Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT; Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe; Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos; Otras sustancias con efectos psicodélicos

Continúa

Grupo(s) de Sustancias	Sustancias
Heroína	Heroína blanca; Heroína negra o morena
Opioides sintéticos	Oxicodona; Opiodes sintéticos; Fentanilo y análogos; Derivados opiodes combinados con analgésicos; Desomorfina
Opio y derivados	Opio; Morfina; Codeína
Sustancias con utilidad médica, utilizadas fuera de prescripción	Anticolinérgicos; Antiespasmódicos; Antiparkinsonianos; Anticonvulsivos; Antidepresivos; Antipsicóticos o neurolepticos; Antihistamínicos; Otras sustancias de abuso con utilidad médica
Otras sustancias de abuso	Nitritos; Anestésicos; Bebidas energizantes; Drogas o bebidas inteligentes; Esteroides anabólicos; Sustancias no clasificadas; Sustancias sin especificar

Las NSA o de uso poco común incluidas en la clasificación anterior son: Nicotina en dispositivo electrónico, Marihuana modificada -con alto nivel de THC-, Hachís - Aceite o miel, Marihuana" sintética, Sales de baño, Drogas de diseño con efectos estimulantes, Fenciclidina -PCP, polvo de ángel- y análogos del PCP, Ketamina, DMT y análogos, Fenitelininas -Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe-, Salvia divinorum, Ayahuasca, GHB o similares, Fentanilo y análogos y Desomorfina. El seguimiento de estas sustancias comprende el consumo alguna vez en la vida según sexo y la edad promedio de inicio.

Procesamiento de datos. Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.20.


Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos "sin información" y aquellos que no cumplen con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio. Hay que señalar que para contabilizar el total de sustancias consumidas se consideran las 82 sustancias en seguimiento.

RESULTADOS

Entre enero y junio del 2022, se registró a **9,252 consumidores de drogas ilícitas** solicitantes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración juvenil. 7,899 pacientes lo hicieron de manera presencial (85.4%) y 1,353 pacientes lo hicieron a través de medios electrónicos (telemática: 14.6%).

El principal motivo de consulta declarado fue el consumo de sustancias (84.6%), mientras que 30.2% reportó otros problemas de salud. 33.8% de los casos declaró más de un motivo de consulta (cfr. anexo cuadro 2).

Figura 1. Principales motivos de consulta declarados



Nota: 33.8% reportó dos o más motivos de consulta

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS^a

Sexo. La población se conformó por 7,079 hombres y 2,173 mujeres, lo cual representa 76.5% y 23.5%, respectivamente. Es decir, 3.3 hombres solicitan tratamiento en CIJ por cada mujer.

Edad de ingreso a tratamiento. Se observa un rango de edad de 9 a 78 años, con un promedio de 26.5 años (DE= 11.1 años); es decir, 7,158 de los consumidores de drogas tenía entre los 15 y 37 años de edad (77.4% de las personas atendidas); la edad mediana de la población fue de 24 años (25.1% de los casos fueron menores de edad; 2,322 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 17 años (653 casos atendidos).

Figura 2. Edad de ingreso según sexo


	 Años	 Años	Los hombres ingresaron a tratamiento ligeramente a mayor edad que las mujeres.
Rango	9 a 73	11 a 73	
Promedio (Desviación estándar)	26.9 (11.1)	25.3 (10.8)	
Mediana	24	22	
Moda	17	16	
Decil₁	15	15	

^a Cfr., Cuadros 1 a 9.

Estado civil. Más de la mitad de la población refirió ser soltera (65.9%), mientras que 15.0% indicó que vivía en unión libre, 10.2% eran casados y 7.0% separados.


Figura 3. Estado civil según sexo

Más mujeres que hombres se encontraban solteras, se habían separado, divorciado o eran viudas mientras que mayor proporción de hombres estaban casados o vivían en unión libre.



Escolaridad. 38.0% de la población había cursado algún grado de bachillerato, 34.2% algún grado de educación secundaria, 17.2% tenía estudios superiores y 6.8% había cursado estudios de primaria.


Figura 4. Escolaridad según sexo



Los hombres cuentan en mayor proporción que las mujeres, con estudios de secundaria y de primaria, mientras que ellas cuentan, en mayor proporción que los hombres, con estudios de nivel técnico, bachillerato, superior y de posgrado.

Ocupación. 48.4% desempeñaba alguna actividad laboral, 22.1% estaba desempleado y 23.4% reportó ser estudiante de tiempo completo.

Figura 5. Principal ocupación según sexo




Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedicaba al hogar o a estudiar, más de la mitad de la población de hombres trabajaba y uno de cada cinco no tenía ocupación.

Estrato social. De acuerdo con la percepción de los terapeutas, más de la mitad de los casos (57.3%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 32.0% en un nivel bajo, 7.2% fue clasificado en el estrato medio alto y 3.2% en el estrato muy bajo.

Figura 6. Estrato social según sexo

Según la percepción de los terapeutas, tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando los estratos medio bajo y bajo.



Población en situación de vulnerabilidad. Entre las personas que se consideran en situación de vulnerabilidad se encuentran las **mujeres**. Cabe señalar que de las 2,173 mujeres que solicitaron tratamiento, 1.7% refirió estar embarazada y 1.6% indicó no saber si se encontraba embarazada.

Entre quienes pertenecen o se identifican con alguna comunidad minoritaria, 5.0% refirió pertenecer a la **comunidad LGBTI+** (464 personas, 204 refiere ser bisexual, 170 gay, y 56 lesbiana).


0.9% dijo ser miembro de alguna **comunidad indígena** (79 casos) y 0.2%, de la comunidad **afrodescendiente** (17 casos).

1.6% refirió tener algún tipo de **discapacidad**: 78 personas presentan discapacidad sensorial y de la comunicación, 60 discapacidad motriz y 13 discapacidad múltiple.

1.6% manifestó haber migrado a otro país en los últimos doce meses (106 sujetos).

2.4% señaló haber vivido en Estados Unidos un año o más, principalmente en los estados de California, Texas y Arizona.

Figura 7. Población en situación de vulnerabilidad según sexo




Entre los casos que pertenecen a la comunidad LGBTI+ sobresalen las mujeres. En tanto que un mayor porcentaje de hombres ha vivido como migrante.

No encontrando diferencias en las demás condiciones que ponen en situación de vulnerabilidad a las personas.

CONSUMO DE DROGAS^b

Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto). Las principales sustancias a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: metanfetaminas (30.5%, esencialmente cristal: 29.9%), cannabis (27.8%; básicamente marihuana estándar: 26.5%) y alcohol (17.1%); en menor medida se mencionó a la cocaína (10.5%; en forma de crack: 5.2% y de clorhidrato de cocaína: 5.1%) y al tabaco (5.7%).

Figura 8. Droga de mayor impacto según sexo



Las metanfetaminas son las principales sustancias por las que solicitan tratamiento hombres y mujeres; ellos acuden en mayor proporción que las mujeres por problemas asociados al consumo de cannabis, inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas, heroína y alucinógenos; ellas por lo que les ocasiona el uso de alcohol, tabaco y benzodiacepinas.

^b Cfr., Cuadros 10 a 32

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco fue a los 15.2 años (DE =3.9 años), mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 15.1 años (DE =3.4 años), la mediana y la moda de ambas sustancias fue a los 15 años. Mientras que, la edad promedio de inicio del consumo de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 17.5 años (DE =6.5 años), con una mediana de 16 y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que tanto para el tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas se ubica en los 12 años.


Figura 9. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	15.0 (3.8)	15.0 (3.2)	17.2 (6.1)	15.7 (4.3)	15.4 (4.1)	18.6 (7.6)
Mediana	15	15	16	15	15	16
Moda	15	15	15	15	15	15
Decil₁	12	12	12	12	12	13

Hombres y mujeres no presentan diferencias en la edad de inicio del consumo de tabaco y alcohol, pero ellas inician el consumo de drogas ilícitas a mayor edad

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias de inicio más reportadas fueron: cannabis (67.7%, principalmente marihuana estándar: 65.7%); metanfetaminas (9.7%; principalmente cristal: 9.4%); cocaína (11.8%, básicamente en clorhidrato de cocaína: 9.4% y de crack: 2.2%); e inhalables (5.0%, mayormente en forma de solventes y removedores: 3.2%).

Figura 10. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo



El cannabis es la principal droga ilegal de inicio entre los hombres y las mujeres.

Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el haber iniciado el consumo de sustancias ilegales con cannabis, inhalables, cocaína y crack. En tanto que las mujeres en mayor proporción que ellos con el uso de metanfetaminas y cuadruplican el inicio del consumo con benzodiacepinas en comparación con los hombres.

Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento transcurrió de la siguiente manera: tabaco, 11.4 años (DE=10.1 años), alcohol 11.8 años (DE=10.2 años) y drogas ilícitas 9.0 años (DE =9.2 años).

Cabe señalar que la mitad de los consumidores de drogas dejaron pasar nueve años desde que iniciaron el consumo de tabaco o alcohol hasta que acudieron a solicitar tratamiento; en tanto que entre el inicio de drogas ilícitas y la solicitud de tratamiento fue de seis años.


Figura 11. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	11.9 (10.3)	12.4 (10.5)	9.7 (9.5)	9.9 (9.4)	9.9 (9.2)	6.7.(7.9)
Mediana	9	10	7	7	7	4
Moda	1	2	1	1	1	1
Decil₁	1	2	1	1	1	< 1

Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, 48.4% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 20.8% con consumo disfuncional, 13.4% con consumo social u ocasional, 11.1% con consumo experimental y 6.3% presentaba remisión del consumo.

Figura 12. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo




Si bien, la mayor proporción de hombres y mujeres son diagnosticados con un consumo funcional de drogas, ellas registran en mayor proporción que los hombres un consumo experimental, social y en remisión.

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.1 drogas (92.1% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.0 drogas (83.4% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.0 drogas (62.5% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.4 drogas (59.3% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.5 drogas (37.9% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 0.9 droga (19.7% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 13. Promedio de drogas consumidas según sexo




Mujeres y hombres han consumido prácticamente el mismo número de sustancias.

Consumo de drogas alguna vez en la vida.^c Las sustancias de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (83.3%), cannabis (78.8%; principalmente marihuana estándar: 76.7%), tabaco (72.1%), metanfetaminas (44.0%; en cristal: 42.7%) y cocaína (42.0%; principalmente clorhidrato de cocaína: 36.7% y crack: 16.2%), inhalables (14.6%; principalmente solventes y removedores: 9.6%), alucinógenos (12.1%; primordialmente LSD: 9.7% y plantas alucinógenas o disociativas: 4.2%) y benzodiacepinas (9.8%).

En menor medida se refirió el consumo de éxtasis y sustancias similares (3.2%), heroína (1.8%; 1.2% reportó heroína negra o morena), sustancias de uso médico sin prescripción (1.7%), anfetaminas y derivados (1.4%) y opioides (0.7%).

Figura 14. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo




Las mujeres reportaron en mayor proporción que los hombres el consumo de benzodiacepinas. Ellos reportaron en mayor proporción el consumo de tabaco, alcohol, cannabis, inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas, éxtasis alucinógenos y heroína.

^c Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 97.6% de las personas reportó haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

En este lapso, las sustancias más consumidas fueron: alcohol (74.3%), tabaco (61.1%), cannabis (57.1%; principalmente marihuana estándar: 55.2%), metanfetaminas (37.1%), clorhidrato de cocaína (18.2%) y crack (7.8%). En menor medida se reportó el consumo de inhalables (6.6%), benzodiazepinas (6.0%), alucinógenos (5.1%; principalmente LSD: 4.1%), sustancias de uso médico sin prescripción (1.1%), éxtasis (1.1%) y heroína (1.0%).


Figura 15. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y cannabis; las mujeres usaron en mayor proporción que los hombres: éxtasis y benzodiazepinas; mientras que los hombres superaron en la frecuencia del uso de tabaco, alcohol, cannabis, inhalables, cocaína en clorhidrato, crack, metanfetaminas, alucinógenos y heroína.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Los consumidores de drogas reportaron mayor preferencia por el consumo de: cannabis (30.9; principalmente marihuana estándar: 29.5%), metanfetaminas (21.6%), alcohol (18.9%) y tabaco (10.6%).


Figura 16. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo



Los hombres reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el uso de cannabis, inhalables, cocaína en polvo, crack y metanfetaminas y heroína; mientras que en las mujeres la preferencia fue mayor que en los hombres por el tabaco, alcohol, benzodiacepinas y alucinógenos.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.^d De los consumidores de drogas que usaron sustancias en el último año, y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, 62.4% reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

Figura 17. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo




Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el consumo de dos o más sustancias (no se incluye el consumo de tabaco) en un mismo día.

^d No se toman en cuenta 2,592 casos (28.0%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 25.3% de los hombres y 36.9% de las mujeres (ver anexo, cuadro 25).

Consumo de drogas en los últimos 30 días. En este lapso, 87.7% de los casos reportó el consumo de alcohol, tabaco o drogas ilícitas. Las sustancias más consumidas fueron: alcohol (54.4%), tabaco (51.2%), cannabis (39.9%; principalmente marihuana estándar: 38.4%), metanfetaminas (24.4%; principalmente cristal: 23.9%), clorhidrato de cocaína (8.5%), crack (5.2%), inhalables (3.9%; principalmente solventes y removedores: 2.7%), benzodiacepinas (3.6%) y alucinógenos (1.3%; primordialmente LSD: 1.0%).

En menor medida se refirió el consumo de heroína (0.8%), sustancias de uso médico sin prescripción (0.7%) y otras sustancias de abuso (0.6%).


Figura 18. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo



Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol, cannabis, metanfetaminas, cocaína en clorhidrato, crack e inhalables –los hombres en mayor proporción–. Las mujeres predominaron en el consumo de éxtasis y benzodiacepinas.

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 36.6% de quienes reportaron consumo de alcohol en los últimos 30 días reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana y 29.2% de una o dos veces a la semana. Por otra parte, 34.6% de los consumidores de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 29.3% menos de una vez a la semana, 22.1% de una a dos veces a la semana y 13.9% cada tercer día.


Figura 19. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



En general, los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso de uso de alcohol y de drogas ilícitas que las mujeres.

Problemas asociados al consumo de sustancias. 80.8% de los consumidores de drogas refirió haber tenido problemas familiares asociados al consumo de sustancias, 67.2% presentó problemas psicológicos, 51.9% de salud, 38.1% laborales, 33.1% escolares, 26.0% accidentes o lesiones, 22.4% legales y 22.2% de conducta antisocial o delictiva. Cabe señalar que 82.5% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 7.4% no reportó ninguno.

Figura 20. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo




Los accidentes y lesiones son las problemáticas más frecuentemente relacionadas al consumo de drogas entre hombres y mujeres.

Los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres los problemas asociados al consumo; mientras que las mujeres rebasan el porcentaje de hombres al no referir problemas asociados.

NUEVAS SUSTANCIAS DE ABUSO O DE USO POCO COMÚN (NSA)


Durante el primer semestre de 2022, se observa que de las nuevas sustancias de abuso o de uso poco común en seguimiento consumidas alguna vez en la vida fueron: marihuana modificada (3.0%), hachís en presentación de aceite o miel (2.0%), seguida del consumo de nicotina en dispositivos electrónicos (1.5%), DMT y análogos (0.8%) y salvia divinorum (0.7%); en menor medida se reportó el consumo de ayahuasca (0.3%), drogas de diseño con efecto estimulante (0.3%), fentanilo y análogos (0.2%), ketamina (0.1%), GHB y sustancias similares (0.1%) y fenciclidina y sustancias análogas (0.1%). No se reportó el consumo de sales de baño, fenitelininas y desomorfinas.

Figura 21. Consumo alguna vez en la vida de nuevas sustancias de abuso o de uso poco común según sexo



En general, el inicio del consumo de las NSA de seguimiento se presenta en la juventud, a mayor edad que el inicio de drogas ilícitas (17.5 años promedio). Con excepción de la nicotina en dispositivos electrónicos y la marihuana modificada que registraron una edad menor (ver figura 21).

Figura 22. Edad de inicio de las nuevas sustancias de abuso o de uso poco común



REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Diaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado de http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/info_sisvea/informes_sisvea_2006.pdf
5. Ortiz A, Martínez R., Meza D. (2019). Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 63, Noviembre de 2017. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México. Recuperado de http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep_63_pdf.pdf
6. Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019). *Observatorio Mexicano de Drogas*. Recuperado de <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/observatorio-mexicano-de-drogas-omd>
7. García-Aurrecochea, V. R., Diaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Diaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del*

- consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
8. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. Recuperado de <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
 9. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 10. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 11. García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
 12. Gutiérrez López, AD. (2022). Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en consumidores de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 2° semestre de 2021. (Nivel Nacional y Entidades Federativas) [Informe de Investigación 22-01e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/21-08e.pdf>
 13. Gutiérrez, A. D. (2022). Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 2° semestre de 2021. (Nivel Nacional y Entidades Federativas) [Informe de Investigación 21-08f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/22-01f.pdf>
 14. Gutiérrez, A. D. (2022). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 2° semestre de 2021. (Nivel nacional y entidades federativas)

[Informe de Investigación 22-01g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/22-01g.pdf>

15. García, R., Gutiérrez-López, A., Rodríguez-Kuri, S., Velázquez-Altamirano, M. & Fernández-Cáceres, C. (2018): Increasing methamphetamine use trends alert among patients in Mexico, *Journal of Substance Use*, DOI:10.1080/14659891.2018.1430182 To link to this article: <https://doi.org/10.1080/14659891.2018.1430182>. Published online: 05 Feb 2018. Submit your article to this journal Article views: 14 View related articles View Crossmark data
16. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
17. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
18. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
19. Gutiérrez, A. D., Velázquez, M. (2022). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Tabaco y alcohol. segundo semestre del 2021*. (Informe de Investigación 22-01d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/22-01d.pdf>
20. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
21. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A.,

- Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
22. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
23. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
24. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
25. Centros de Integración Juvenil, A.C. (2019). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2018*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/Index.html>
26. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2018). *Informe Europeo sobre Drogas 2018: Tendencias y novedades*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.
27. United Nations Office on Drugs and Crime (2021). *World Drug Report 2021*. New York: United Nations.

Cuadros

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CONSUMIDORES DE DROGAS ILÍCITAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTH)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	67	0.7	54	0.8	13	0.6	4.2
Álvaro Obregón Oriente	50	0.5	46	0.6	4	0.2	11.5
Atizapán	89	1.0	75	1.1	14	0.6	5.4
Azcapotzalco	103	1.1	72	1.0	31	1.4	2.3
Benito Juárez	90	1.0	62	0.9	28	1.3	2.2
Chalco	180	1.9	148	2.1	32	1.5	4.6
Coyoacán	112	1.2	83	1.2	29	1.3	2.9
Cuajimalpa	105	1.1	80	1.1	25	1.2	3.2
Cuauhtémoc Oriente	87	0.9	66	0.9	21	1.0	3.1
Cuauhtémoc Poniente	91	1.0	58	0.8	33	1.5	1.8
Ecatepec	169	1.8	135	1.9	34	1.6	4.0
Gustavo A. Madero Aragón	156	1.7	123	1.7	33	1.5	3.7
Gustavo A. Madero Norte	129	1.4	92	1.3	37	1.7	2.5
Gustavo A. Madero Oriente	5	0.1	2	0.0	3	0.1	0.7
Iztapalapa Oriente	312	3.4	256	3.6	56	2.6	4.6
Iztapalapa Poniente	87	0.9	56	0.8	31	1.4	1.8
Miguel Hidalgo	84	0.9	67	0.9	17	0.8	3.9
Naucalpan	60	0.6	52	0.7	8	0.4	6.5
Nezahualcóyotl	205	2.2	165	2.3	40	1.8	4.1
Texcoco	98	1.1	76	1.1	22	1.0	3.5
Tlalnepantla	117	1.3	97	1.4	20	0.9	4.9
Tlalpan	113	1.2	90	1.3	23	1.1	3.9
Venustiano Carranza	108	1.2	86	1.2	22	1.0	3.9
Xochimilco	4	0.0	4	0.1	0	0.0	---
UH Ecatepec	44	0.5	44	0.6	0	0.0	---
UH Iztapalapa	65	0.7	53	0.7	12	0.6	4.4
UH Naucalpan	69	0.7	52	0.7	17	0.8	3.1
Acapulco	97	1.0	77	1.1	20	0.9	3.9
Acuña	21	0.2	19	0.3	2	0.1	9.5
Aguascalientes	157	1.7	112	1.6	45	2.1	2.5
Apatzingán	2	0.0	0	0.0	2	0.1	0.0
Apodaca	24	0.3	20	0.3	4	0.2	5.0
Cancún	106	1.1	67	0.9	39	1.8	1.7
Celaya	149	1.6	109	1.5	40	1.8	2.7
Chetumal	63	0.7	51	0.7	12	0.6	4.3
Chihuahua	245	2.6	195	2.8	50	2.3	3.9
Chilpancingo	48	0.5	36	0.5	12	0.6	3.0

Continúa

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Ciudad del Carmen	52	0.6	38	0.5	14	0.6	2.7
Ciudad Juárez Norte	139	1.5	93	1.3	46	2.1	2.0
Ciudad Victoria	38	0.4	32	0.5	6	0.3	5.3
Colima	95	1.0	73	1.0	22	1.0	3.3
Cozumel	54	0.6	34	0.5	20	0.9	1.7
Cuernavaca	103	1.1	81	1.1	22	1.0	3.7
Culiacán	89	1.0	69	1.0	20	0.9	3.5
Durango	60	0.6	50	0.7	10	0.5	5.0
Escuinapa	28	0.3	19	0.3	9	0.4	2.1
Fresnillo	24	0.3	14	0.2	10	0.5	1.4
Guadalajara Centro	195	2.1	146	2.1	49	2.3	3.0
Guadalajara Sur	108	1.2	76	1.1	32	1.5	2.4
Guadalupe	99	1.1	76	1.1	23	1.1	3.3
Guadalupe Zacatecas	10	0.1	9	0.1	1	0.0	9.0
Guamúchil	36	0.4	34	0.5	2	0.1	17.0
Guanajuato	16	0.2	8	0.1	8	0.4	1.0
Guasave	58	0.6	47	0.7	11	0.5	4.3
Hermosillo	76	0.8	50	0.7	26	1.2	1.9
Huatulco	23	0.2	19	0.3	4	0.2	4.8
Ixbalaqué (Centro de día)	17	0.2	16	0.2	1	0.0	16.0
Ixtapa Zihuatanejo	65	0.7	50	0.7	15	0.7	3.3
La Paz	63	0.7	45	0.6	18	0.8	2.5
La Piedad	83	0.9	52	0.7	31	1.4	1.7
Laguna Durango	67	0.7	50	0.7	17	0.8	2.9
León	170	1.8	134	1.9	36	1.7	3.7
Los Cabos	121	1.3	97	1.4	24	1.1	4.0
Los Mochis	117	1.3	82	1.2	35	1.6	2.3
Manzanillo	41	0.4	25	0.4	16	0.7	1.6
Mazatlán	143	1.5	110	1.6	33	1.5	3.3
Mérida	76	0.8	62	0.9	14	0.6	4.4
Mexicali	114	1.2	82	1.2	32	1.5	2.6
Monterrey	111	1.2	90	1.3	21	1.0	4.3
Morelia	97	1.0	72	1.0	25	1.2	2.9
Nogales	63	0.7	43	0.6	20	0.9	2.2
Oaxaca	70	0.8	48	0.7	22	1.0	2.2
Pachuca	122	1.3	92	1.3	30	1.4	3.1
Playa del Carmen	61	0.7	43	0.6	18	0.8	2.4
Poza Rica	32	0.3	28	0.4	4	0.2	7.0
Puebla	91	1.0	82	1.2	9	0.4	9.1

Continúa

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Puerto Vallarta	118	1.3	104	1.5	14	0.6	7.4
Querétaro	94	1.0	71	1.0	23	1.1	3.1
Ramos Arizpe	1	0.0	1	0.0	0	0.0	---
Reynosa	35	0.4	27	0.4	8	0.4	3.4
Salamanca	50	0.5	40	0.6	10	0.5	4.0
Saltillo	150	1.6	117	1.7	33	1.5	3.5
San Luis Potosí	112	1.2	87	1.2	25	1.2	3.5
San Nicolás de los Garza	97	1.0	72	1.0	25	1.2	2.9
Tampico	45	0.5	36	0.5	9	0.4	4.0
Tapachula	49	0.5	40	0.6	9	0.4	4.4
Tecomán	37	0.4	29	0.4	8	0.4	3.6
Tehuacán	86	0.9	67	0.9	19	0.9	3.5
Tepic	39	0.4	30	0.4	9	0.4	3.3
Tijuana Guaycura	129	1.4	98	1.4	31	1.4	3.2
Tijuana Soler	136	1.5	95	1.3	41	1.9	2.3
Tlaquepaque	135	1.5	102	1.4	33	1.5	3.1
Tlaxcala	57	0.6	42	0.6	15	0.7	2.8
Toluca	121	1.3	102	1.4	19	0.9	5.4
Torreón Oriente	231	2.5	157	2.2	74	3.4	2.1
Tuxtla Gutiérrez	50	0.5	39	0.6	11	0.5	3.5
Villa Victoria	16	0.2	13	0.2	3	0.1	4.3
Villahermosa	67	0.7	45	0.6	22	1.0	2.0
Xalapa	81	0.9	63	0.9	18	0.8	3.5
Yucatán	50	0.5	38	0.5	12	0.6	3.2
Zacatecas	38	0.4	30	0.4	8	0.4	3.8
Zamora	63	0.7	47	0.7	16	0.7	2.9
Zapopan Norte	193	2.1	146	2.1	47	2.2	3.1
UH Cd. Juárez	23	0.2	14	0.2	9	0.4	1.6
UH Culiacán	8	0.1	8	0.1	0	0.0	---
UH Nuevo León	62	0.7	50	0.7	12	0.6	4.2
UH Punta Diamante	26	0.3	20	0.3	6	0.3	3.3
UH Tijuana	20	0.2	14	0.2	6	0.3	2.3
UH Zapopan	43	0.5	36	0.5	7	0.3	5.1
UH Zapotlán el Grande	20	0.2	20	0.3	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	31	0.3	27	0.4	4	0.2	6.8
UTUH Tijuana	1	0.0	1	0.0	0	0.0	---
Total	9,252	100.0	7,079	100.0	2,173	100.0	3.3

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Consumidores de Heroína

Cuadro 2. Principales motivos de consulta declarados

CIJ	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas	6,932	74.9	5,573	78.7	1,359	62.5
Consumo de alcohol	1,926	20.8	1,497	21.1	429	19.7
Consumo de tabaco	1,237	13.4	948	13.4	289	13.3
Ludopatía	13	0.1	12	0.2	1	0.0
Trastornos mentales y conductual del niño y el adolescente	131	1.4	98	1.4	33	1.5
Depresión	1,525	16.5	876	12.4	649	29.9
Ansiedad	1,350	14.6	848	12.0	502	23.1
Psicosis	92	1.0	77	1.1	15	0.7
Demencia	12	0.1	9	0.1	3	0.1
Epilepsia	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Autolesión no suicida	141	1.5	52	0.7	89	4.1
Suicidio (ideación o intento)	215	2.3	121	1.7	94	4.3
Otro motivo de consulta	419	4.5	285	4.0	134	6.2
<i>Ningún motivo reportado</i>	<i>587</i>	<i>6.3</i>	<i>468</i>	<i>6.6</i>	<i>119</i>	<i>5.5</i>
<i>2 o más motivos reportados</i>	<i>3,127</i>	<i>33.8</i>	<i>2,272</i>	<i>32.1</i>	<i>855</i>	<i>39.3</i>

Cuadro 3. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	7,079	76.5	
Mujeres	2,173	23.5	3.3 : 1
Total	9,252	100.0	

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
10 a 14 años	551	6.0	6.0	389	5.5	5.5	162	7.5	7.5
15 a 19 años	2,638	28.5	28.5	1,975	27.9	27.9	663	30.5	30.5
20 a 24 años	1,663	18.0	18.0	1,219	17.2	17.2	444	20.4	20.4
25 a 29 años	1,401	15.1	15.1	1,074	15.2	15.2	327	15.0	15.0
30 a 34 años	1,016	11.0	11.0	812	11.5	11.5	204	9.4	9.4
35 a 39 años	719	7.8	7.8	588	8.3	8.3	131	6.0	6.0
40 a 44 años	534	5.8	5.8	441	6.2	6.2	93	4.3	4.3
45 años y más	728	7.9	7.9	580	8.2	8.2	148	6.8	6.8
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0
Media (DE)	26.5 (11.1) años			26.9 (11.1) años			25.3 (10.8) años		
Mediana	24 años			24 años			22 años		
Moda	17 años			17 años			16 años		
Decil1	15 años			15 años			15 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	6,091	65.8	65.9	4,595	64.9	65.0	1,496	68.8	69.0
Casado	940	10.2	10.2	795	11.2	11.2	145	6.7	6.7
Unión libre	1,382	14.9	15.0	1,084	15.3	15.3	298	13.7	13.7
Separado	643	6.9	7.0	476	6.7	6.7	167	7.7	7.7
Divorciado	135	1.5	1.5	99	1.4	1.4	36	1.7	1.7
Viudo	49	0.5	0.5	23	0.3	0.3	26	1.2	1.2
<i>Sin información</i>	12	0.1	<i>Se omite</i>	7	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin estudios	30	0.3	0.3	24	0.3	0.3	6	0.3	0.3
Primaria no concluida	213	2.3	2.3	168	2.4	2.4	45	2.1	2.1
Primaria concluida	413	4.5	4.5	321	4.5	4.5	92	4.2	4.2
Secundaria no concluida	1,347	14.6	14.6	1,068	15.1	15.1	279	12.8	12.8
Secundaria concluida	1,818	19.6	19.7	1,448	20.5	20.5	370	17.0	17.0
Estudios técnicos o comerciales no concluidos	2,361	25.5	25.5	1,801	25.4	25.5	560	25.8	25.8
Estudios técnicos o comerciales concluidos	1,152	12.5	12.5	860	12.1	12.2	292	13.4	13.4
Bachillerato no concluido	74	0.8	0.8	50	0.7	0.7	24	1.1	1.1
Bachillerato concluido	161	1.7	1.7	118	1.7	1.7	43	2.0	2.0
Estudios superiores no concluidos	1,002	10.8	10.8	718	10.1	10.1	284	13.1	13.1
Estudios superiores concluidos	593	6.4	6.4	444	6.3	6.3	149	6.9	6.9
Estudios de posgrado no concluidos	33	0.4	0.4	23	0.3	0.3	10	0.5	0.5
Estudios de posgrado concluidos	50	0.5	0.5	31	0.4	0.4	19	0.9	0.9
<i>Sin información</i>	5	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,015	21.8	22.1	1,656	23.4	23.7	359	16.5	16.7
Estudiante	2,136	23.1	23.4	1,485	21.0	21.3	651	30.0	30.3
Estudiante que trabaja	692	7.5	7.6	544	7.7	7.8	148	6.8	6.9
Trabaja	3,724	40.3	40.8	3,137	44.3	44.9	587	27.0	27.3
Tareas del hogar	508	5.5	5.6	117	1.7	1.7	391	18.0	18.2
Pensionado	53	0.6	0.6	41	0.6	0.6	12	0.6	0.6
<i>Sin información</i>	124	1.3	<i>Se omite</i>	99	1.4	<i>Se omite</i>	25	1.2	<i>Se omite</i>
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0

Cuadro 8. Estrato social

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	27	0.3	0.3	20	0.3	0.3	7	0.3	0.3
Medio alto	663	7.2	7.2	496	7.0	7.0	167	7.7	7.7
Medio bajo	5,298	57.3	57.3	4,057	57.3	57.3	1,241	57.1	57.1
Bajo	2,964	32.0	32.0	2,286	32.3	32.3	678	31.2	31.2
Muy bajo	300	3.2	3.2	220	3.1	3.1	80	3.7	3.7
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0

Cuadro 9. Población en situación de vulnerabilidad

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujeres embarazadas	---	---	N/A	N/A	38	1.7
Pertenece a la comunidad LGBTIQ+	464	5.0	236	3.3	228	10.5
Se considera miembro de alguna comunidad indígena	79	0.9	65	0.9	14	0.6
Se considera miembro de alguna población afrodescendiente	17	0.2	12	0.2	5	0.2
Tiene alguna discapacidad	151	1.6	119	1.7	32	1.5
Ha migrado a otro país en los últimos 12 meses	106	1.1	85	1.2	21	1.0
Ha vivido en condición de migrante en Estados Unidos un año o más	223	2.4	199	2.8	24	1.1
N/A: No aplica						

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022

Cuadro 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones

		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	519	5.6	5.6	332	4.7	4.7	187	8.6	8.6
	Nicotina en dispositivo electrónico	7	0.1	0.1	4	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Alcohol	Bebidas fermentadas	1,019	11.0	11.0	714	10.1	10.1	305	14.0	14.1
	Bebidas destiladas	538	5.8	5.8	369	5.2	5.2	169	7.8	7.8
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	27	0.3	0.3	21	0.3	0.3	6	0.3	0.3
Cannabis	Mariguana "estándar"	2,445	26.4	26.5	1,907	26.9	27.0	538	24.8	24.9
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	111	1.2	1.2	96	1.4	1.4	15	0.7	0.7
	Hachís - Resina	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Hachís – Aceite o miel	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	26	0.3	0.3	19	0.3	0.3	7	0.3	0.3
	Medicamentos con compuestos cannábicos	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	189	2.0	2.0	151	2.1	2.1	38	1.7	1.8
	Pegamentos	20	0.2	0.2	15	0.2	0.2	5	0.2	0.2
	Esmaltes y pinturas	13	0.1	0.1	12	0.2	0.2	1	0.0	0.0
	Gasolinas y combustibles	5	0.1	0.1	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Otros inhalables	32	0.3	0.3	26	0.4	0.4	6	0.3	0.3
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	467	5.0	5.1	391	5.5	5.5	76	3.5	3.5
	Crack	480	5.2	5.2	434	6.1	6.1	46	2.1	2.1
	Basuco (pasta base de cocaína)	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	15	0.2	0.2	12	0.2	0.2	3	0.1	0.1
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	2,759	29.8	29.9	2,210	31.2	31.2	549	25.3	25.4
	Metanfetaminas: hielo	34	0.4	0.4	29	0.4	0.4	5	0.2	0.2
	Metanfetaminas: "Metas"	21	0.2	0.2	18	0.3	0.3	3	0.1	0.1
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	22	0.2	0.2	20	0.3	0.3	2	0.1	0.1
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Otros estimulantes	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1	0	0.0	0.0

Continúa

Cuadro 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones
(Continuación)

		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alucinógenos	LSD	31	0.3	0.3	25	0.4	0.4	6	0.3	0.3
	Hongos alucinógenos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Floripondio	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Ayahuasca	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	187	2.0	2.0	86	1.2	1.2	101	4.6	4.7
	Rohypnol	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	27	0.3	0.3	13	0.2	0.2	14	0.6	0.6
	Otros depresores del SNC	5	0.1	0.1	2	0.0	0.0	3	0.1	0.1
Heroína	Heroína blanca	22	0.2	0.2	18	0.3	0.3	4	0.2	0.2
	Heroína negra o morena	54	0.6	0.6	48	0.7	0.7	6	0.3	0.3
Opioides	Opioides sintéticos	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Fentanilo y análogos	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	8	0.1	0.1	4	0.1	0.1	4	0.2	0.2
	Derivados opiodes combinados con analgésicos	16	0.2	0.2	8	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Opiáceos	Opio	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Morfina (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticolinérgicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Anticonvulsivos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Antidepresivos	20	0.2	0.2	6	0.1	0.1	14	0.6	0.6
	Antipsicóticos o neurolepticos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Antihistamínicos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	24	0.3	0.3	9	0.1	0.1	15	0.7	0.7

Continúa

Cuadro 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones
(Continuación)

		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Otras sustancias de abuso	Nitritos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	6	0.1	0.1	3	0.0	0.0	3	0.1	0.1
	Esteroides anabólicos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Sustancias no clasificadas	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Sustancias sin especificar	7	0.1	0.1	4	0.1	0.1	3	0.1	0.1
<i>Sin información</i>		13	0.1	<i>Se omite</i>	4	0.1	<i>Se omite</i>	9	0.4	<i>Se omite</i>
Total		9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0

Cuadro 11. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	209	2.3	3.1	180	2.5	3.5	29	1.3	1.9
10 a 14 años	2,824	30.5	42.4	2,213	31.3	42.9	611	28.1	40.4
15 a 19 años	3,066	33.1	46.0	2,374	33.5	46.1	692	31.8	45.8
20 a 24 años	379	4.1	5.7	261	3.7	5.1	118	5.4	7.8
25 a 29 años	115	1.2	1.7	76	1.1	1.5	39	1.8	2.6
30 a 34 años	33	0.4	0.5	27	0.4	0.5	6	0.3	0.4
35 a 39 años	18	0.2	0.3	10	0.1	0.2	8	0.4	0.5
40 a 44 años	14	0.2	0.2	10	0.1	0.2	4	0.2	0.3
45 años y más	8	0.1	0.1	4	0.1	0.1	4	0.2	0.3
<i>No consumió</i>	2,584	27.9	<i>Se omite</i>	1,922	27.2	<i>Se omite</i>	662	30.5	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0
Media (DE)	15.2 (3.9) años			15.0 (3.8) años			15.7 (4.3) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 12. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	265	2.9	3.4	224	3.2	3.8	41	1.9	2.3
10 a 14 años	2,952	31.9	38.3	2,223	31.4	37.6	729	33.5	40.7
15 a 19 años	4,002	43.3	52.0	3,134	44.3	53.0	868	39.9	48.5
20 a 24 años	358	3.9	4.6	252	3.6	4.3	106	4.9	5.9
25 a 29 años	82	0.9	1.1	59	0.8	1.0	23	1.1	1.3
30 a 34 años	21	0.2	0.3	12	0.2	0.2	9	0.4	0.5
35 a 39 años	7	0.1	0.1	2	0.0	0.0	5	0.2	0.3
40 a 44 años	8	0.1	0.1	4	0.1	0.1	4	0.2	0.2
45 años y más	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0	5	0.2	0.3
No consumió	1,543	16.7	Se omite	1,164	16.4	Se omite	379	17.4	Se omite
Sin información	8	0.1	Se omite	4	0.1	Se omite	4	0.2	Se omite
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0
Media (DE)	15.1 (3.4) años			15.0 (3.2) años			15.4 (4.1) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	78	0.8	0.8	70	1.0	1.0	8	0.4	0.4
10 a 14 años	2,896	31.3	31.3	2,308	32.6	32.6	588	27.1	27.1
15 a 19 años	4,317	46.7	46.7	3,302	46.6	46.7	1,015	46.7	46.7
20 a 24 años	989	10.7	10.7	732	10.3	10.3	257	11.8	11.8
25 a 29 años	436	4.7	4.7	308	4.4	4.4	128	5.9	5.9
30 a 34 años	211	2.3	2.3	149	2.1	2.1	62	2.9	2.9
35 a 39 años	137	1.5	1.5	99	1.4	1.4	38	1.7	1.7
40 a 44 años	84	0.9	0.9	48	0.7	0.7	36	1.7	1.7
45 años y más	97	1.0	1.0	57	0.8	0.8	40	1.8	1.8
Sin información	7	0.1	Se omite	6	0.1	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0
Media (DE)	17.5 (6.5) años			17.2 (6.1) años			18.6 (7.6) años		
Mediana	16 años			16 años			16 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			13 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones

		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	Mariguana "estándar"	6,081	65.7	4,662	65.9	1,419	65.3
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	177	1.9	142	2.0	35	1.6
	Hachís - Resina	8	0.1	6	0.1	2	0.1
	Hachís - Aceite o miel	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Sus. asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	50	0.5	41	0.6	9	0.4
	Medicamentos con compuestos cannábicos	6	0.1	3	0.0	3	0.1
Inhalables	Solventes y removedores	300	3.2	239	3.4	61	2.8
	Pegamentos	59	0.6	46	0.6	13	0.6
	Esmaltes y pinturas	38	0.4	32	0.5	6	0.3
	Gasolinas y combustibles	6	0.1	5	0.1	1	0.0
	Otros inhalables	55	0.6	39	0.6	16	0.7
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	867	9.4	729	10.3	138	6.4
	Crack	201	2.2	177	2.5	24	1.1
	Basuco (pasta base de cocaína)	12	0.1	9	0.1	3	0.1
	Otras presentaciones de cocaína	15	0.2	13	0.2	2	0.1
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	873	9.4	633	8.9	240	11.0
	Metanfetaminas: hielo	13	0.1	11	0.2	2	0.1
	Metanfetaminas: "Metas"	15	0.2	14	0.2	1	0.0
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	31	0.3	0.3	26	0.4	0.4
	Anorexígenos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efecto estimulante	5	0.1	0.1	5	0.1	0.1
	Otros estimulantes	8	0.1	0.1	8	0.1	0.1
Alucinógenos	LSD	34	0.4	0.4	22	0.3	0.3
	Hongos alucinógenos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0
	Peyote (mezcalina)	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Salvia divinorum u otras variedades de salvia	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0
	Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	DMT	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0

Continúa

Cuadro 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones
(Continuación)

		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	15	0.2	0.2	10	0.1	0.1
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Piperazinas con efectos similares al éxtasis	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	165	1.8	1.8	77	1.1	1.1
	Rohypnol	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	31	0.3	0.3	16	0.2	0.2
	Otros depresores del SNC	7	0.1	0.1	3	0.0	0.0
Heroína	Heroína blanca	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1
	Heroína negra o morena	24	0.3	0.3	19	0.3	0.3
Opioides	Opiodes sintéticos (uso fuera de prescripción)	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0
	Fentanilo y análogos (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1
	Derivados opiodes combinados con analgésicos	10	0.1	0.1	4	0.1	0.1
Opiáceos	Opio	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0
	Morfina (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticolinérgicos	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Antiespasmódicos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Anticonvulsivos	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0
	Antidepresivos	22	0.2	0.2	7	0.1	0.1
	Antipsicóticos o neurolépticos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Antihistamínicos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	22	0.2	0.2	5	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	Nitritos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Anestésicos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	29	0.3	0.3	21	0.3	0.3
	Esteroides anabólicos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0
	Sustancias no clasificadas	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1
	Sustancias sin especificar	9	0.1	0.1	5	0.1	0.1
Total		9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0

Cuadro 15. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	243	2.6	3.6	155	2.2	3.0	88	4.0	5.8
1 a 5 años	2,168	23.4	32.5	1,616	22.8	31.3	552	25.4	36.5
6 a 10 años	1,408	15.2	21.1	1,076	15.2	20.9	332	15.3	22.0
11 a 15 años	975	10.5	14.6	772	10.9	15.0	203	9.3	13.4
16 a 20 años	665	7.2	10.0	524	7.4	10.2	141	6.5	9.3
21 a 25 años	511	5.5	7.7	430	6.1	8.3	81	3.7	5.4
26 o más años	696	7.5	10.4	582	8.2	11.3	114	5.2	7.5
No consumió	2,584	27.9	Se omite	1,922	27.2	Se omite	662	30.5	Se omite
Sin información	2	0.0	Se omite	2	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0
Media (DE)	11.4 (10.1) años			11.9 (10.3) años			9.9 (9.4) años		
Mediana	9 años			9 años			7 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 16. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	226	2.4	2.9	153	2.2	2.6	73	3.4	4.1
1 a 5 años	2,481	26.8	32.2	1,801	25.4	30.5	680	31.3	38.0
6 a 10 años	1,502	16.2	19.5	1,117	15.8	18.9	385	17.7	21.5
11 a 15 años	1,225	13.2	15.9	963	13.6	16.3	262	12.1	14.6
16 a 20 años	817	8.8	10.6	660	9.3	11.2	157	7.2	8.8
21 a 25 años	597	6.5	7.8	501	7.1	8.5	96	4.4	5.4
26 o más años	853	9.2	11.1	716	10.1	12.1	137	6.3	7.7
No consumió	1,543	16.7	Se omite	1,164	16.4	Se omite	379	17.4	Se omite
Sin información	8	0.1	Se omite	4	0.1	Se omite	4	0.2	Se omite
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0
Media (DE)	11.8 (10.2) años			12.4 (10.5) años			9.9 (9.2) años		
Mediana	9 años			10 años			7 años		
Moda	2 años			2 años			1 año		
Decil1	1 año			2 años			1 año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	830	9.0	9.0	538	7.6	7.6	292	13.4	13.4
1 a 5 años	3,601	38.9	39.0	2,605	36.8	36.8	996	45.8	45.9
6 a 10 años	1,838	19.9	19.9	1,428	20.2	20.2	410	18.9	18.9
11 a 15 años	1,135	12.3	12.3	912	12.9	12.9	223	10.3	10.3
16 a 20 años	715	7.7	7.7	619	8.7	8.8	96	4.4	4.4
21 a 25 años	496	5.4	5.4	423	6.0	6.0	73	3.4	3.4
26 o más años	630	6.8	6.8	548	7.7	7.7	82	3.8	3.8
<i>Sin información</i>	7	0.1	<i>Se omite</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0
Media (DE)	9.0 (9.2) años			9.7 (9.5) años			6.7 (7.9) años		
Mediana	6 años			7 años			4 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			Menos de 1 año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 18. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,027	11.1	11.1	701	9.9	9.9	326	15.0	15.0
Social u ocasional	1,236	13.4	13.4	846	12.0	12.0	390	17.9	18.0
Funcional	4,479	48.4	48.4	3,552	50.2	50.2	927	42.7	42.7
Disfuncional	1,924	20.8	20.8	1,560	22.0	22.0	364	16.8	16.8
En remisión	585	6.3	6.3	420	5.9	5.9	165	7.6	7.6
<i>Sin información</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0

**Cuadro 19. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	728	7.9	519	7.3	209	9.6
2 sustancias	1,187	12.8	866	12.2	321	14.8
3 sustancias	2,303	24.9	1,676	23.7	627	28.9
4 sustancias	1,859	20.1	1,401	19.8	458	21.1
5 sustancias	1,297	14.0	1,023	14.5	274	12.6
6 sustancias	830	9.0	699	9.9	131	6.0
7 sustancias	451	4.9	377	5.3	74	3.4
8 sustancias	241	2.6	207	2.9	34	1.6
9 sustancias	152	1.6	130	1.8	22	1.0
10 sustancias	86	0.9	76	1.1	10	0.5
11-21 sustancias	118	1.3	105	1.5	13	0.6
Total	9,252	100.0	7,079	100.0	2,173	100.0
Media (DE)	4.1 (2.1) drogas		4.2 (2.2) drogas		3.7 (1.8) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 20. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	3,768	40.7	2,666	37.7	1,102	50.7
2 sustancias	2,313	25.0	1,781	25.2	532	24.5
3 sustancias	1,387	15.0	1,111	15.7	276	12.7
4 sustancias	825	8.9	704	9.9	121	5.6
5 sustancias	416	4.5	341	4.8	75	3.5
6 sustancias	249	2.7	216	3.1	33	1.5
7 sustancias	124	1.3	110	1.6	14	0.6
8 sustancias	81	0.9	69	1.0	12	0.6
9 sustancias	43	0.5	38	0.5	5	0.2
10 sustancias	19	0.2	19	0.3	0	0.0
11-19 sustancias	27	0.3	24	0.3	3	0.1
Total	9,252	100.0	7,079	100.0	2,173	100.0
Media (DE)	2.4 (1.7) drogas		2.5 (1.8) drogas		2.0 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,668	72.1	5,157	72.8	1,511	69.5
Tabaco	6,616	71.5	5,122	72.4	1,494	68.8
Nicotina en dispositivo electrónico	139	1.5	99	1.4	40	1.8
Alcohol	7,709	83.3	5,915	83.6	1,794	82.6
Bebidas fermentadas	5,850	63.2	4,525	63.9	1,325	61.0
Bebidas destiladas	3,032	32.8	2,292	32.4	740	34.1
Alcohol puro ("alcohol del 96")	190	2.1	151	2.1	39	1.8
Cannabis	7,295	78.8	5,628	79.5	1,667	76.7
Mariguana "estándar"	7,094	76.7	5,468	77.2	1,626	74.8
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	282	3.0	219	3.1	63	2.9
Hachís - Resina	141	1.5	115	1.6	26	1.2
Hachís - Aceite o miel	59	0.6	47	0.7	12	0.6
Sustancias similares al cannabis	93	1.0	73	1.0	20	0.9
"Mariguana" sintética	78	0.8	63	0.9	15	0.7
Medicamentos con compuestos cannábicos	15	0.2	10	0.1	5	0.2
Inhalables	1,354	14.6	1,126	15.9	228	10.5
Solventes y removedores	891	9.6	745	10.5	146	6.7
Pegamentos	279	3.0	234	3.3	45	2.1
Esmaltes y pinturas	131	1.4	106	1.5	25	1.2
Gasolinas y combustibles	35	0.4	30	0.4	5	0.2
Otros inhalables	180	1.9	150	2.1	30	1.4
Cocaína	3,888	42.0	3,240	45.8	648	29.8
Cocaína (clorhidrato)	3,400	36.7	2,823	39.9	577	26.6
Crack	1,296	14.0	1,157	16.3	139	6.4
Otro tipo de cocaína	121	1.3	104	1.5	17	0.8
Basuco (pasta base de cocaína)	71	0.8	63	0.9	8	0.4
Otras presentaciones de cocaína	50	0.5	41	0.6	9	0.4
Metanfetaminas	4,074	44.0	3,318	46.9	756	34.8
Metanfetaminas: cristal	3,950	42.7	3,219	45.5	731	33.6
Metanfetaminas: hielo	57	0.6	48	0.7	9	0.4
Metanfetaminas: "Metas"	165	1.8	128	1.8	37	1.7
Otros estimulantes del SNC	199	2.2	167	2.4	32	1.5
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	130	1.4	108	1.5	22	1.0
Anorexígenos	19	0.2	14	0.2	5	0.2
Drogas de diseño con efectos estimulantes	24	0.3	20	0.3	4	0.2
Otros estimulantes	30	0.3	27	0.4	3	0.1

Continúa

Cuadro 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	299	3.2	238	3.4	61	2.8
Éxtasis (MDMA)	286	3.1	226	3.2	60	2.8
Sustancias con efectos similares a MDMA	15	0.2	13	0.2	2	0.1
Drogas de diseño con efectos similares	13	0.1	11	0.2	2	0.1
Piperazinas con efectos similares	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiazepinas	911	9.8	660	9.3	251	11.6
Benzodiazepinas y sustancias relacionadas	883	9.5	637	9.0	246	11.3
Rohypnol	33	0.4	28	0.4	5	0.2
Otros depresores del SNC	164	1.8	112	1.6	52	2.4
GHB o similares	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Sedantes hipnóticos	119	1.3	82	1.2	37	1.7
Otros depresores del SNC	41	0.4	27	0.4	14	0.6
Alucinógenos	1,120	12.1	895	12.6	225	10.4
LSD /LSA	903	9.8	716	10.1	187	8.6
LSD	893	9.7	708	10.0	185	8.5
LSA	14	0.2	12	0.2	2	0.1
Plantas alucinógenas o disociativas	389	4.2	333	4.7	56	2.6
Hongos alucinógenos	251	2.7	216	3.1	35	1.6
Peyote (mezcalina)	109	1.2	98	1.4	11	0.5
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	68	0.7	62	0.9	6	0.3
Ololiuhqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	16	0.2	16	0.2	0	0.0
Ayahuasca	27	0.3	21	0.3	6	0.3
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	17	0.2	14	0.2	3	0.1
Alucinógenos sintéticos	154	1.7	127	1.8	27	1.2
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	8	0.1	7	0.1	1	0.0
Dextrometorfano	65	0.7	53	0.7	12	0.6
DMT	72	0.8	61	0.9	11	0.5
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	10	0.1	8	0.1	2	0.1
Grupo 2C x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	3	0.0	2	0.0	1	0.0

Continúa

Cuadro 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	167	1.8	143	2.0	24	1.1
Heroína blanca	57	0.6	48	0.7	9	0.4
Heroína negra o morena	110	1.2	95	1.3	15	0.7
Opioides (uso fuera de prescripción)	63	0.7	40	0.6	23	1.1
Oxicodona	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	19	0.2	13	0.2	6	0.3
Fentanilo y análogos	22	0.2	16	0.2	6	0.3
Derivados opioides combinados con analgésicos	22	0.2	11	0.2	11	0.5
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	28	0.3	25	0.4	3	0.1
Opio	10	0.1	9	0.1	1	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	8	0.1	6	0.1	2	0.1
Codeína (uso fuera de prescripción)	10	0.1	10	0.1	0	0.0
Sustancias de uso médico	159	1.7	94	1.3	65	3.0
Anticolinérgicos	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Antiespasmódicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	12	0.1	11	0.2	1	0.0
Antidepresivos	82	0.9	49	0.7	33	1.5
Antipsicóticos o neurolepticos	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Antihistamínicos	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	56	0.6	28	0.4	28	1.3
Otras sustancias de abuso	124	1.3	96	1.4	28	1.3
Nitritos	9	0.1	8	0.1	1	0.0
Anestésicos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Bebidas energizantes	76	0.8	58	0.8	18	0.8
Drogas o bebidas inteligentes	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Sustancias no clasificadas	15	0.2	12	0.2	3	0.1
Sustancias sin especificar	19	0.2	14	0.2	5	0.2

**Cuadro 22. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	224	2.4	133	1.9	91	4.2
1 sustancia	1,310	14.2	928	13.1	382	17.6
2 sustancias	2,199	23.8	1,614	22.8	585	26.9
3 sustancias	2,683	29.0	2,104	29.7	579	26.6
4 sustancias	1,585	17.1	1,281	18.1	304	14.0
5 sustancias	684	7.4	553	7.8	131	6.0
6 sustancias	326	3.5	269	3.8	57	2.6
7 sustancias	129	1.4	104	1.5	25	1.2
8 sustancias	60	0.6	53	0.7	7	0.3
9 sustancias	27	0.3	19	0.3	8	0.4
10 sustancias	17	0.2	13	0.2	4	0.2
11-15 sustancias	8	0.1	8	0.1	0	0.0
Total	9,252	100.0	7,079	100.0	2,173	100.0
Media (DE)	3.0 (1.6) drogas		3.0 (1.6) drogas		2.7 (1.5) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		2 drogas	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 23. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,201	13.0	774	10.9	427	19.7
1 sustancia	4,549	49.2	3,444	48.7	1,105	50.9
2 sustancias	2,166	23.4	1,777	25.1	389	17.9
3 sustancias	791	8.5	637	9.0	154	7.1
4 sustancias	336	3.6	277	3.9	59	2.7
5 sustancias	120	1.3	96	1.4	24	1.1
6 sustancias	52	0.6	45	0.6	7	0.3
7 sustancias	23	0.2	18	0.3	5	0.2
8 sustancias	7	0.1	5	0.1	2	0.1
9 sustancias	5	0.1	4	0.1	1	0.0
10 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	9,252	100.0	7,079	100.0	2,173	100.0
Media (DE)	1.5 (1.2) drogas		1.6 (1.2) drogas		1.3 (1.1) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	5,649	61.1	4,400	62.2	1,249	57.5
Tabaco	5,589	60.4	4,361	61.6	1,228	56.5
Nicotina en dispositivo electrónico	111	1.2	75	1.1	36	1.7
Alcohol	6,875	74.3	5,319	75.1	1,556	71.6
Bebidas fermentadas	5,144	55.6	4,020	56.8	1,124	51.7
Bebidas destiladas	2,575	27.8	1,949	27.5	626	28.8
Alcohol puro ("alcohol del 96")	154	1.7	126	1.8	28	1.3
Cannabis	5,284	57.1	4,153	58.7	1,131	52.0
Mariguana "estándar"	5,106	55.2	4,012	56.7	1,094	50.3
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	215	2.3	169	2.4	46	2.1
Hachís - Resina	68	0.7	50	0.7	18	0.8
Hachís - Aceite o miel	27	0.3	20	0.3	7	0.3
Sustancias similares al cannabis	65	0.7	51	0.7	14	0.6
"Mariguana" sintética	54	0.6	43	0.6	11	0.5
Medicamentos con compuestos cannábicos	11	0.1	8	0.1	3	0.1
Inhalables	609	6.6	497	7.0	112	5.2
Solventes y removedores	413	4.5	340	4.8	73	3.4
Pegamentos	70	0.8	58	0.8	12	0.6
Esmaltes y pinturas	41	0.4	34	0.5	7	0.3
Gasolinas y combustibles	11	0.1	8	0.1	3	0.1
Otros inhalables	91	1.0	73	1.0	18	0.8
Cocaína	2,180	23.6	1,848	26.1	332	15.3
Cocaína (clorhidrato)	1,688	18.2	1,407	19.9	281	12.9
Crack	724	7.8	653	9.2	71	3.3
Otro tipo de cocaína	56	0.6	47	0.7	9	0.4
Basuco (pasta base de cocaína)	27	0.3	23	0.3	4	0.2
Otras presentaciones de cocaína	29	0.3	24	0.3	5	0.2
Metanfetaminas	3,429	37.1	2,783	39.3	646	29.7
Metanfetaminas: cristal	3,356	36.3	2,723	38.5	633	29.1
Metanfetaminas: hielo	40	0.4	34	0.5	6	0.3
Metanfetaminas: "Metas"	59	0.6	47	0.7	12	0.6
Otros estimulantes del SNC	111	1.2	88	1.2	23	1.1
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	69	0.7	55	0.8	14	0.6
Anorexígenos	8	0.1	5	0.1	3	0.1
Drogas de diseño con efectos estimulantes	15	0.2	11	0.2	4	0.2
Otros estimulantes	21	0.2	19	0.3	2	0.1

Continúa

Cuadro 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	104	1.1	77	1.1	27	1.2
Éxtasis (MDMA)	100	1.1	73	1.0	27	1.2
Sustancias con efectos similares a MDMA	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Drogas de diseño con efectos similares	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Piperazinas con efectos similares	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiazepinas	554	6.0	360	5.1	194	8.9
Benzodiazepinas y sustancias relacionadas	548	5.9	356	5.0	192	8.8
Rohypnol	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Otros depresores del SNC	108	1.2	71	1.0	37	1.7
GHB o similares	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Sedantes hipnóticos	83	0.9	54	0.8	29	1.3
Otros depresores del SNC	21	0.2	13	0.2	8	0.4
Alucinógenos	469	5.1	364	5.1	105	4.8
LSD /LSA	377	4.1	294	4.2	83	3.8
LSD	375	4.1	292	4.1	83	3.8
LSA	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	86	0.9	68	1.0	18	0.8
Hongos alucinógenos	54	0.6	43	0.6	11	0.5
Peyote (mezcalina)	13	0.1	12	0.2	1	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	11	0.1	9	0.1	2	0.1
Ololiuhqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Ayahuasca	8	0.1	5	0.1	3	0.1
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Alucinógenos sintéticos	60	0.6	46	0.6	14	0.6
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Dextrometorfano	38	0.4	27	0.4	11	0.5
DMT	21	0.2	18	0.3	3	0.1
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	2	0.0	1	0.0	1	0.0

Continúa

Cuadro 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	97	1.0	83	1.2	14	0.6
Heroína blanca	26	0.3	21	0.3	5	0.2
Heroína negra o morena	71	0.8	62	0.9	9	0.4
Opioides (uso fuera de prescripción)	44	0.5	27	0.4	17	0.8
Oxicodona	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	10	0.1	5	0.1	5	0.2
Fentanilo y análogos	15	0.2	12	0.2	3	0.1
Derivados opioides combinados con analgésicos	18	0.2	9	0.1	9	0.4
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	14	0.2	11	0.2	3	0.1
Opio	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Codeína (uso fuera de prescripción)	6	0.1	6	0.1	0	0.0
Sustancias de uso médico	103	1.1	54	0.8	49	2.3
Anticolinérgicos	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Antiespasmódicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Antidepresivos	52	0.6	27	0.4	25	1.2
Antipsicóticos o neurolépticos	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Antihistamínicos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	40	0.4	18	0.3	22	1.0
Otras sustancias de abuso	82	0.9	66	0.9	16	0.7
Nitritos	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Anestésicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Bebidas energizantes	57	0.6	45	0.6	12	0.6
Drogas o bebidas inteligentes	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	10	0.1	8	0.1	2	0.1
Sustancias sin especificar	7	0.1	5	0.1	2	0.1

Cuadro 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	932	10.1	10.4	656	9.3	9.5	276	12.7	13.3
	Nicotina en dispositivo electrónico	17	0.2	0.2	6	0.1	0.1	11	0.5	0.5
Alcohol	Bebidas fermentadas	1,135	12.3	12.6	843	11.9	12.2	292	13.4	14.1
	Bebidas destiladas	535	5.8	5.9	376	5.3	5.4	159	7.3	7.7
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	33	0.4	0.4	30	0.4	0.4	3	0.1	0.1
Cannabis	Mariguana "estándar"	2,658	28.7	29.5	2,163	30.6	31.2	495	22.8	23.9
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	121	1.3	1.3	103	1.5	1.5	18	0.8	0.9
	Hachís - Resina	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Hachís - Aceite o miel	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	22	0.2	0.2	16	0.2	0.2	6	0.3	0.3
	Medicamentos con compuestos cannábicos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	131	1.4	1.5	102	1.4	1.5	29	1.3	1.4
	Pegamentos	22	0.2	0.2	18	0.3	0.3	4	0.2	0.2
	Esmaltes y pinturas	10	0.1	0.1	10	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Gasolinas y combustibles	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otros inhalables	26	0.3	0.3	19	0.3	0.3	7	0.3	0.3
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	317	3.4	3.5	270	3.8	3.9	47	2.2	2.3
	Crack	362	3.9	4.0	328	4.6	4.7	34	1.6	1.6
	Basuco (pasta base de cocaína)	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	14	0.2	0.2	11	0.2	0.2	3	0.1	0.1
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	1,906	20.6	21.2	1,520	21.5	21.9	386	17.8	18.7
	Metanfetaminas: hielo	25	0.3	0.3	20	0.3	0.3	5	0.2	0.2
	Metanfetaminas: "Metas"	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	20	0.2	0.2	18	0.3	0.3	2	0.1	0.1
	Anorexígenos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Otros estimulantes	5	0.1	0.1	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Alucinógenos	LSD	19	0.2	0.2	13	0.2	0.2	6	0.3	0.3
	Hongos alucinógenos	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1

Continúa

Cuadro 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones
(Continuación)

		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	106	1.1	1.2	44	0.6	0.6	62	2.9	3.0
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	20	0.2	0.2	11	0.2	0.2	9	0.4	0.4
	Otros depresores del SNC	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Heroína	Heroína blanca	18	0.2	0.2	15	0.2	0.2	3	0.1	0.1
	Heroína negra o morena	49	0.5	0.5	43	0.6	0.6	6	0.3	0.3
Opioides	Opioides sintéticos	5	0.1	0.1	4	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Fentanilo y análogos	5	0.1	0.1	4	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Derivados opioides combinados con analgésicos	12	0.1	0.1	5	0.1	0.1	7	0.3	0.3
Opíáceos	Opio	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Morfina (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticolinérgicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Anticonvulsivos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Antidepresivos	11	0.1	0.1	5	0.1	0.1	6	0.3	0.3
	Antipsicóticos o neurolépticos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	15	0.2	0.2	7	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Otras sustancias de abuso	Bebidas energizantes	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Esteroides anabólicos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Sustancias no clasificadas	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Sustancias sin especificar	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Ninguna		384	4.2	4.3	218	3.1	3.1	166	7.6	8.0
No aplica		224	2.4	Se omite	133	1.9	Se omite	91	4.2	Se omite
Sin información		31	0.3	Se omite	18	0.3	Se omite	13	0.6	Se omite
Total		9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0

**Cuadro 26. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,158	44.9	62.4	3,363	47.5	63.6	795	36.6	57.9
No combinó drogas	2,502	27.0	37.6	1,925	27.2	36.4	577	26.6	42.1
<i>No aplica</i>	2,592	28.0	<i>Se omite</i>	1,791	25.3	<i>Se omite</i>	801	36.9	<i>Se omite</i>
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0

**Cuadro 27. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,135	12.3	760	10.7	375	17.3
1 sustancia	2,334	25.2	1,693	23.9	641	29.5
2 sustancias	2,524	27.3	1,961	27.7	563	25.9
3 sustancias	2,047	22.1	1,668	23.6	379	17.4
4 sustancias	860	9.3	708	10.0	152	7.0
5 sustancias	240	2.6	200	2.8	40	1.8
6 sustancias	81	0.9	65	0.9	16	0.7
7 sustancias	22	0.2	19	0.3	3	0.1
8 sustancias	5	0.1	5	0.1	0	0.0
9 sustancias	2	0.0	0	0.0	2	0.1
10 sustancias	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Total	9,252	100.0	7,079	100.0	2,173	100.0
Media (DE)	2.0 (1.3) drogas		2.1 (1.3) drogas		1.8 (1.3) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	2 drogas		2 drogas		1 droga	
Decil1	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 28. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,088	33.4	2,144	30.3	944	43.4
1 sustancia	4,339	46.9	3,408	48.1	931	42.8
2 sustancias	1,419	15.3	1,196	16.9	223	10.3
3 sustancias	302	3.3	245	3.5	57	2.6
4 sustancias	79	0.9	67	0.9	12	0.6
5 sustancias	19	0.2	17	0.2	2	0.1
6 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7 sustancias	2	0.0	0	0.0	2	0.1
8 sustancias	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Total	9,252	100.0	7,079	100.0	2,173	100.0
Media (DE)	0.9 (0.9) drogas		1.0 (0.9) drogas		0.8 (0.9) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		0 drogas	
Decil1	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	4,734	51.2	3,719	52.5	1,015	46.7
Tabaco	4,687	50.7	3,691	52.1	996	45.8
Nicotina en dispositivo electrónico	69	0.7	44	0.6	25	1.2
Alcohol	5,036	54.4	3,951	55.8	1,085	49.9
Bebidas fermentadas	3,721	40.2	2,946	41.6	775	35.7
Bebidas destiladas	1,762	19.0	1,344	19.0	418	19.2
Alcohol puro ("alcohol del 96")	106	1.1	89	1.3	17	0.8
Cannabis	3,693	39.9	2,985	42.2	708	32.6
Marihuana "estándar"	3,553	38.4	2,872	40.6	681	31.3
Marihuana modificada, con alto nivel de THC	147	1.6	119	1.7	28	1.3
Hachís - Resina	25	0.3	17	0.2	8	0.4
Hachís - Aceite o miel	8	0.1	6	0.1	2	0.1
Sustancias similares al cannabis	34	0.4	27	0.4	7	0.3
"Marihuana" sintética	32	0.3	26	0.4	6	0.3
Medicamentos con compuestos cannábicos	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Inhalables	353	3.8	287	4.1	66	3.0
Solventes y removedores	250	2.7	203	2.9	47	2.2
Pegamentos	34	0.4	29	0.4	5	0.2
Esmaltes y pinturas	19	0.2	15	0.2	4	0.2
Gasolinas y combustibles	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Otros inhalables	52	0.6	41	0.6	11	0.5
Cocaína	1,200	13.0	1,036	14.6	164	7.5
Cocaína (clorhidrato)	782	8.5	659	9.3	123	5.7
Crack	484	5.2	437	6.2	47	2.2
Otro tipo de cocaína	28	0.3	22	0.3	6	0.3
Basuco (pasta base de cocaína)	12	0.1	9	0.1	3	0.1
Otras presentaciones de cocaína	16	0.2	13	0.2	3	0.1
Metanfetaminas	2,253	24.4	1,853	26.2	400	18.4
Metanfetaminas: cristal	2,211	23.9	1,816	25.7	395	18.2
Metanfetaminas: hielo	25	0.3	22	0.3	3	0.1
Metanfetaminas: "Metas"	22	0.2	20	0.3	2	0.1
Otros estimulantes del SNC	62	0.7	51	0.7	11	0.5
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	36	0.4	31	0.4	5	0.2
Anorexígenos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Drogas de diseño con efectos estimulantes	11	0.1	8	0.1	3	0.1
Otros estimulantes	12	0.1	10	0.1	2	0.1

Continúa

Cuadro 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	35	0.4	27	0.4	8	0.4
Éxtasis (MDMA)	32	0.3	24	0.3	8	0.4
Sustancias con efectos similares a MDMA	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Drogas de diseño con efectos similares	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Piperazinas con efectos similares	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodicepinas	336	3.6	209	3.0	127	5.8
Benzodicepinas y sustancias relacionadas	333	3.6	207	2.9	126	5.8
Rohypnol	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Otros depresores del SNC	66	0.7	41	0.6	25	1.2
GHB o similares	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sedantes hipnóticos	51	0.6	32	0.5	19	0.9
Otros depresores del SNC	14	0.2	8	0.1	6	0.3
Alucinógenos	117	1.3	89	1.3	28	1.3
LSD /LSA	89	1.0	69	1.0	20	0.9
LSD	89	1.0	69	1.0	20	0.9
LSA	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	12	0.1	9	0.1	3	0.1
Hongos alucinógenos	8	0.1	5	0.1	3	0.1
Peyote (mezcalina)	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Ololiuhqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ayahuasca	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Alucinógenos sintéticos	19	0.2	13	0.2	6	0.3
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Dextrometorfano	16	0.2	10	0.1	6	0.3
DMT	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0

Continúa

Cuadro 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
(Continuación)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	73	0.8	64	0.9	9	0.4
Heroína blanca	19	0.2	17	0.2	2	0.1
Heroína negra o morena	54	0.6	47	0.7	7	0.3
Opioides (uso fuera de prescripción)	32	0.3	19	0.3	13	0.6
Oxicodona	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	6	0.1	3	0.0	3	0.1
Fentanilo y análogos	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Derivados opioides combinados con analgésicos	16	0.2	8	0.1	8	0.4
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	8	0.1	7	0.1	1	0.0
Opio	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Codeína (uso fuera de prescripción)	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Sustancias de uso médico	69	0.7	34	0.5	35	1.6
Anticolinérgicos	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Antiespasmódicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antidepresivos	36	0.4	19	0.3	17	0.8
Antipsicóticos o neurolépticos	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Antihistamínicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	26	0.3	10	0.1	16	0.7
Otras sustancias de abuso	54	0.6	45	0.6	9	0.4
Nitritos	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Anestésicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Bebidas energizantes	34	0.4	28	0.4	6	0.3
Drogas o bebidas inteligentes	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	9	0.1	8	0.1	1	0.0
Sustancias sin especificar	7	0.1	5	0.1	2	0.1

Cuadro 30. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	728	7.9	15.7	544	7.7	14.9	184	8.5	18.7
< de 1 vez a la semana	1,698	18.4	36.6	1,318	18.6	36.0	380	17.5	38.7
1 o 2 veces a la semana	1,356	14.7	29.2	1,102	15.6	30.1	254	11.7	25.9
Cada tercer día	429	4.6	9.2	343	4.8	9.4	86	4.0	8.8
Diario	428	4.6	9.2	350	4.9	9.6	78	3.6	7.9
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	4,403	47.6	<i>Se omite</i>	3,275	46.3	<i>Se omite</i>	1,128	51.9	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	210	2.3	<i>Se omite</i>	147	2.1	<i>Se omite</i>	63	2.9	<i>Se omite</i>
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Cuadro 31. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,665	18.0	29.3	1,241	17.5	27.2	424	19.5	38.3
1 o 2 veces a la semana	1,257	13.6	22.1	1,037	14.6	22.7	220	10.1	19.9
Cada tercer día	789	8.5	13.9	661	9.3	14.5	128	5.9	11.6
Diario	1,964	21.2	34.6	1,630	23.0	35.7	334	15.4	30.2
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	3,088	33.4	<i>Se omite</i>	2,144	30.3	<i>Se omite</i>	944	43.4	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	489	5.3	<i>Se omite</i>	366	5.2	<i>Se omite</i>	123	5.7	<i>Se omite</i>
Total	9,252	100.0	100.0	7,079	100.0	100.0	2,173	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

Cuadro 32. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,800	51.9	3,734	52.7	1,066	49.1
Problemas familiares	7,474	80.8	5,917	83.6	1,557	71.7
Accidentes o lesiones	2,404	26.0	1,948	27.5	456	21.0
Problemas escolares	3,067	33.1	2,371	33.5	696	32.0
Problemas laborales	3,527	38.1	3,005	42.4	522	24.0
Problemas psicológicos	6,214	67.2	4,804	67.9	1,410	64.9
Problemas legales	2,068	22.4	1,758	24.8	310	14.3
Conducta antisocial o delictiva	2,056	22.2	1,732	24.5	324	14.9
Otros problemas	1,871	20.2	1,458	20.6	413	19.0
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	685	7.4	385	5.4	300	13.8
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	7,636	82.5	6,014	85.0	1,622	74.6

GLOSARIO

Droga ilícita de inicio	Es la primera sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto	Sustancia por la que acuden los consumidores de drogas a tratamiento.
Droga de preferencia	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Nuevas sustancias de abuso o de uso poco común	<p>Sustancias psicoactivas que han sido conocidas en el mercado por términos tales como “drogas de diseño”, “euforizantes legales”, “hierbas euforizantes”, “sales de baño”, “productos químicos de investigación” y “reactivos de laboratorio” y que no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública.</p> <p>El término “nuevas” no se refiere necesariamente a nuevas invenciones, sino que son sustancias que han aparecido recientemente en el mercado o que su consumo ha cobrado relevancia en los últimos años.</p>
Población en situación de vulnerabilidad	De acuerdo con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres; los pueblos indígenas; la población afrodescendiente; las personas con discapacidad; las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI y los migrantes. Y señalan que las personas que pertenecen a estos grupos de la población suelen sufrir desigualdades entrecruzadas.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el consumo de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 82 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
Uso combinado de drogas	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.