SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Centros de Integración Juvenil, A.C.

REPORTE DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CONSUMO DE DROGAS

CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL.

CONSUMIDORES DE DROGAS ILÍCITAS

SEGUNDO SEMESTRE DE 2024

Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
México, marzo de 2025

Reporte Técnico 25-1a

Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Consumidores de drogas ilícitas. Segundo semestre de 2024.

Cita sugerida:
Centros de Integración Juvenil, A.C. (2025). Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Consumidores de drogas Ilícitas. Segundo semestre del 2024. Ciudad de México, México: CIJ.

Disponible en: http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/Epidemiologica.asp

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL
Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.
Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL
Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL
Dra. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR OPERATIVO Y DE PATRONATOS
Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR NORMATIVO
Mtro. David Bruno Diaz Negrete

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA
Dr. Rodrigo Alonzo Marín Navarrete

CRÉDITOS

Elaboración de informe

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Mtra. Karina Jiménez Silvestre

Psic. Patricia Caballero Hernández

Diseño

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Procesamiento estadístico

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Supervisión

Dr. Rodrigo Alonzo Marín Navarrete

Mtro. José Nahum Rangel Villafaña

AGRADECIMIENTO

El Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica agradece los continuos esfuerzos del equipo médico-técnico y de los voluntarios responsables de recopilar y reportar los datos de los solicitantes de tratamiento en el Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0, a través del formato de entrevista inicial.

Acapulco: Imelda González Espinobarros, Lorena Salinas Acevedo, María de Lourdes Barrientos Solís, Miriam Galeana Valente, Salvio Vargas Ramírez; **Acuña**: Adolfo Edel González Pérez, Yurieth Daniela Lira Ortiz; **Aguascalientes**: Baciliza Castañeda Briones, Gabriel Flores Loredo, Mario Jesús García Martínez, Martín de Jesús Paredes García, Norma Araceli Terán Reyes, Octavio Israel Rangel Rodriguez, Sandra Gaytán Delgado; **Álvaro Obregón Norte**: Alejandra Arias Mejía, Clemente García Rojas, Ernesto Hernandez Sanchez, Gloria Islas Rodriguez, Jocelyn Sarasuadi Reyes Martínez, María del Carmen López Jaimes, Ricardo Fajardo Ortiz, Silvia María Canul Sánchez; **Álvaro Obregón Oriente**: Ana Laura Guzmán López, Irving Alain Aguilar Cuata, Karla Magdalena Vargas Pisaña, Miguel Ángel Corona Dorantes, Sara Elisa Gracia Gutiérrez de Velasco; **Apatzingán**: Claudia Elizabeth Rangel Bastida, Ismael Hernández Juárez, Jennifer Guadalupe Fernández Medina; **Apodaca**: Claudia Maribel Cantú Jiménez, Fernando Cuevas Rivera, Rosio Ibarra Contreras; **Atizapán**: Antonio Isaac Olguín Rubio, Leticia Baza Cruz, Viridiana Ramírez Martínez, Yadira Jiménez Garcia; **Azcapotzalco**: Beatriz González Pérez, César Ramírez Trejo, Cristhian Dávila Quinto, José Luis Castillo Fontés, Juan Francisco Ramírez Estrada, Leonor Quecholac García, Xóchitl Nava Martínez, Yezmín Estrella Briseño Pérez; **Benito Juárez**: Alma Alicia García Alcaraz, César Mendoza Vázquez, Edith Ledesma Martínez, Luz Gabriela Olmos Velazquez, Martha Patricia Alvarado Tello, Néstor Leopoldo Soto Pueyo; **Cancún**: Alfredo Hatchett Anaya, Ana Beatriz Espinosa de los Reyes Novelo, Ayde Meléndez Ruíz, Keyla Esther Segovia Sánchez, Lilliam Negrete Estrella, Manuel Segura Enríquez, Marcela Antonio Joaquín, Rosa Concepción Vázquez Pérez; **Cd. del Carmen**: Cristina Juárez Luna, Henry Tulio Ortiz Figueroa, Omar Contreras Fuentes, Rossana Mendicuti Chan; **Cd. Juárez Norte**: Christian Ariel Rascón de La Cruz, German Omar Scott Esparza, María Elizabeth Avendaño Ambrocio, Sonia Guzmán Mota; **Cd. Victoria**: Ana Gabriela Méndez Gómez, Dulce Ivette Aguilar Gámez, Gladys Anayanzy Estrada Mendoza, Martha Alicia Balderas Félix; **Celaya**: Alejandra Pérez Cabrera, Daniela Centeno Mancera, Laura Virginia Estrada Juárez, Liliana Espinosa Mondragón, Sofía Lorenia Herrera Cuéllar; **Chalco**: Hassibe Hernández Vega, Heidi Aldana Montero, Ivonne Ascona Hidalgo, José Luis Cervantes Flores, María de Lourdes Estévez Encarnación, Rodrigo Mora Barajas; **Chetumal**: Erick Gustavo Cruz Calderón, Luisana Rebeca Beytia Cardeña, Omar Alejandro Trejo Corona, Sandra Raquel Caamal Chan; **Chihuahua**: Martha María García de La Cadena Lamelas, Miguel Ángel Rodríguez Pérez, Myrna Rojo González, Pablo Espinoza Rojas, Rosa Margarita Hernández Fierro, Virginia Cruz Holguín; **Chilpancingo**: Julia Berenice Hernandez Pérez, Nayeli Alvarado Andrade; **Colima**: Ana Anguiano Valdez, Frida Concepción Ávila Soto, Lilia Margarita Machuca Ayala, Óscar Mireles Pérez, Rocío Selene Ramos Juárez, Sandra Ramírez López; **Coyoacán**: Erik Moreno Romero, Gabriela Alejandra Saucedo García, Judith Hernández Velasco, Karina Canarios Mendoza, María de Lourdes Valverde Morales, Marisol Mora Tavares Ureta, Rebeca Morales Hernández, Sandra Rodríguez Sierra; **Cozumel**: Cynthia Cristina del Jesús Barroso Rodríguez, Eduardo Jiménez Cruz, Fabiola Ruiz Gallardo, José María Durán Ontiveros, Mariela del Socorro Cuá Aké; **Cuajimalpa**: Jorge Alejandro Paredes Nava, Marco Antonio Toquero Hernández, María Magdalena Hernández López, Paola Avendaño Villanueva; **Cuauhtémoc Oriente**: Blanca Eloísa Moran Esquivel, Jonathan Israel Hernandez Vargas, Martha Beatriz López Suastegui, Miguel Ángel Cortes Vera, Sergio Alejandro Morales Hernandez, Yareli García Mares; **Cuauhtémoc Poniente**: Alma Julieta Garmendia Fonoll, Francisco Ramírez Barrera, Leoncio García Astudillo, Leticia Guadalupe Ortiz Ortiz, Lina Raquel Sotres Flores, María Guadalupe Moreno Flores, María Isabel López Márquez, Máxima Mari

Carmona Rosario; **Cuernavaca**: Andrea Guadalupe Rodríguez Ortega, Eduardo Raúl Herrera Fuentes, Elsa Román González, Kristal Rosales Ortiz, Laura Hernández Gama, Petra Alicia Ávila Loera, Rosalía Camarillo Moreno; **Culiacán**: Ana Gabriela García Rodriguez, Felipe de Jesús Ramírez, Fernando Julián García Saavedra, José Luis Araujo Meza, Lidia Irazema Flores Valenzuela, Rosa Isela Vásquez Cabrera, Víctor Abraham Gutiérrez Rivas; **Durango**: Argelia Reyes Fematt, José Ibarra Serrano, Nayeli Selene Avalos Garcia, Olga Patricia Molina Vargas; **Ecatepec**: Carlos Eduardo Cruz Rodriguez, Marco Antonio Hernandez Delgado, Miryam Ruiz Alizota, Moisés Vázquez Ostiguin, Norma Virginia Hernández Olguín; **Escuinapa**: David Covarrubias Alcaraz, José de Jesús Rodríguez Flores, Maribel Tapia Garcia, Tonantzi Toledo López; **Fresnillo**: Alejandra Leticia Vacio Adame, Juan Antonio Reyes López; **Guadalajara Centro**: Gilberto Heliel Nuñez Martínez, Gilberto Rodríguez de Alba, Hugo Alberto Lomelí Torres, Ireri María na González Arias, Laura Rocio Salcedo Fuentes, María Teresa Rosas Ortiz, Norma Angelica Gutiérrez Martínez, Patricia Coronel Vázquez, Silvestre Rivera Tamayo; **Guadalajara Sur**: Edgar Felipe Jileta Bogarin, Elvira Virgen Reyes, Federico Topete González, Juan Emilio López Méndez, Liliana Patricia Ramos Linares, Luis Manuel Lomelí López, Rosa María Ramírez Estrada; **Guadalupe Zacatecas**: Suheyth Sánchez Ramírez, Verónica Román Acosta; **Guadalupe**: Adriana Medina Rodríguez, Humberto Ortiz Morales, Laura Hernández Martínez, María Magdalena González Sánchez, María Yolanda Arellano García; **Guamúchil**: Liliana Guadalupe Cruz Montoya, Maricela Peñuelas García, Yesenia Camacho Armenta; **Guanajuato**: Luis Miguel García Barbosa, María Ofelia Gómez Gutiérrez, Paola Guadalupe Solís Moreno, Vicente Antonio García Ibarra; **Guasave**: Diana Lizeth Rubio Arce, José Carlos Soto Ayala, Julio Cesar González Rochín, Nancy Guadalupe Piña Choza, Yessica María Morales Pardíni; **Gustavo A. Madero Aragón**: Diana Elizabeth Tinoco Pérez, Fausto Alvarado Meneses, Fernando Valdés Suárez, Luis Ricardo Macías Molina, María Evelyn Ruiz Méndez, Matomasa Escalera Bustos, Silvia Olguín Rubio, Verónica Martínez Mejía; **Gustavo A. Madero Norte**: Eduardo Antonio Montero Flores, Leticia Barroso Anaya, María del Consuelo González Vargas, María Georgina Radilla Ortiz, María Roxana Negrete Lepe, Rebeca Corona Candelaria, Verónica García Portillo; **Gustavo A. Madero Oriente**: Josefina del Carmen Palacios Ballinas, María Teresa Rosado Balleza, Xóchitl Espinosa Rodríguez; **Hermosillo**: Alan Fabián Sánchez Ayala, Ariel Sebastián Monroy Eliosa, María Dolores Murrieta Montaño, María Guadalupe Rodríguez García; **Huatulco**: Evelin Odette Casiano Jaimes, Guillermina Martínez Pacheco, Jonathan López Hernández; **Ixbalanqué**: Juan Carlos Coutiño Molina, Martha Alejandra Ramírez Ceballos, Victoria Isabel Escobedo Vidal; **Ixtapa Zihuatanejo**: Erik Fernando Mendoza Melchor, Gloelia Gallardo Rivera, Laura Yareri Salgado Vega, Minerva García Rentería; **Iztapalapa Oriente**: Betzabe Martínez Ávila, Ernesto Tian Chai González Cinco, Félix López Solis, Jannet Galicia Flores, Jessica Alejandra Amador Garcia, Jesús Bautista Reyes, Jesús Iván Yerena González, Julieta Espinosa Carmen, Leticia Martínez Urbina, Manuel Salvador Alcocer Jiménez, María de la Luz Macías Montes, Jazmín Alcántara Chavarría; **Iztapalapa Poniente**: Elibeth Cortez López, Elizabeth López Sotres, Josue Martínez Rico, María del Pilar Ávila Cabrera, María Elena Ramírez Luna, Reyna Alejandra Salazar Espíritu, Víctor Jesús Peña Calixco; **La Paz**: Beatriz Elena Aranda Losoya, María del Socorro Ramírez Cota, Myrna Gallegos Ortiz, Nehiva Jetzabel Arauza Rosas; **Laguna Durango**: Blanca Patricia Ruvalcaba Torres, Isis Alejandrina Ortiz Duarte, Silvia Esther Duarte Rangel; **León**: Ana Luz Hernández Jaramillo, Eva Velázquez Luna, Herlinda López Hernández, Jesús Enrique Guerra López, Lino Hernández Hernández, María del Socorro Rangel Rodríguez, María Goretti Amador Rocha, Salvador Aceves Fajardo, Silvia Margarita Aragón de Luna; **Los Cabos**: Adriana Araceli Martínez Savín, Dulce Karely Castro Lugo, Juan Rubén Rivera Cabrera, María de Jesús Sainz Santillán; **Los Mochis**: Claudia Zulema Tirado Arredondo, Daniel Rodríguez León, María Elena López Rojo, Nancy Susana Lerma Contreras, Zulma Torres Audeves; **Manzanillo**: Alma Rosa Barrios del Valle, Ana Jaqueline Lomelí Mancilla, Dulce Denubhy Rodríguez Zambrano, Norma Lorena Bravo Garcia; **Mazatlán**: Alba Sugey Rodrigo Chávez, Alma Verónica Hernandez Ruiz, Cesia Judith Cárdenas Viera, David Ontiveros Lizárraga, Deborah Guadalupe Flores Aragón, Rosa Herendida Uribe Chávez; **Mérida**: Carmen Lidia Zapata Martínez, Modesta del Carmen Rivero Cruz, Ronaldo Alexis Várguez Yamá, Teresita May Baak; Mexicali: Gloria Estela Portillo García, Gloria Isabel Sotelo Ríos, María Isabel Viramontes Tostado, Raquel Felipe Pacheco, Refugio Adin Flores Angulo, Sadrach Jacob Ceja Altamirano; **Miguel Hidalgo**: Alejandro Zambrano González, José Francisco Octavio Gómez González, Juan Carlos Martínez Islas, Lydia Gaona Márquez, María Cristina Gutiérrez Alcántara, Rocio Juana Estrada Garcia; **Monterrey**: Alma Delia Espinosa Treviño, Brisa Marinas Galván, Graciela Martínez Arriaga, Luis Enrique Rodríguez Sanchez, María de los Ángeles Luévano Díaz, María Julia Aguilar Rosales, Sandra Guadalupe Vela González; **Morelia**: Dinora Rafael Vargas, Isabel González Sánchez, Ivonne de Montserrat Galván Ayala, José Ramón Fernández Rius, Patricia González Martínez, René Ibarra Cisneros; **Naucalpan**: Araceli Mijangos Medina, Elisa Martínez Herrera, Erika del Rocio López Fuertes, Raquel Montes Castro, Rosa María Hernández de Jesús; **Nezahualcóyotl**: Beatriz Sofia Rodríguez Jiménez, José Antonio González Duana, Marisol Meza Moreno, Pamela Serrano Covarrubias, Rocio Cuevas Moreno, Samuel Arellano Chávez, Susana Jiménez Ortega; **Nogales**: Chesed Alfredo Ochoa Cuevas, Claudia Varela Jiménez, Yanett Cortez Jaime; **Oaxaca**: Francisco Rolando Olivera Aguilar, Heriberto Alejandro Zárate Ochoa, Karla Irasema García Mendoza, María na Figueroa Reyes; **Pachuca**: Daniel Carbajal Barrón, Edith Carolina López Maya, Elsa Ivette Céspedes Camacho, Erick Bejarano Martínez, Norma Chantal Reyes Montaño; **Playa del Carmen**: Carmen Elizabeth García Pérez, Christopher Manuel Cauich Moo, Laura Elena Moreno Carrillo, Marcela Dominique Torres Reynoso, Nancy Clorinda Ramírez Cortés, Nancy Pilar Sosa Ortega; **Poza Rica**: Alejandra Torres Bautista, Rosa Elena Márquez Rosas, Roxana Yarizell Espinosa López, Tania Pacheco Juárez, Zulma Bustos Vera; **Puebla**: Carlos Fernando González Campos, Estela Hernández López, Fernando Huadi Majluf Mendoza, Lucía Orato Gutiérrez; **Puerto Vallarta**: Ana Karina Llerenas Briceño, Julio César Curiel Pérez, Liz Anel Osuna Sandoval, Susana Gertrudis Linares Cu, Xóchitl Montoy Guzmán; **Querétaro**: Ana Luisa Reynoso Rentería, Donaji Martínez Aguascalientes, María Estela Frías Borja, Simón Honold Espinosa; **Ramos Arizpe**: Andrea Regina Dena Pecina, Dolores Aida García Charles; **Reynosa**: Claudia Patricia Cruz Cruz, Enith Marlenis Ramírez Morales, San Juana Guadalupe Valdez Aguiar, Sandra Jarumy Lozano Medina, Verónica Dix Guardiola; **Salamanca**: Aldo Fernando Estrada Ortiz, Cecilia Vargas Palestina, Laura Beatriz López Palma, María Alejandra González Flores; **Saltillo**: Francisco Javier Ruiz Medina, Isela Alejandra Montoya Ramón, Marcos Alejandro Dena González, María Consepcion Jaramillo Flores, Norma Leticia Covarrubias Laureano; **San Luis Potosí**: Áurea Gaitán Velázquez, Leticia Jaime Reyes, María Margarita Anguiano Izquierdo, Marisol Orocio Contreras, Norma Leticia Alonso Duque, Patricia Eugenia Avilez Hernández, Patricia Rangel Martínez, Rosa Martina Alferez Martínez; **San Nicolás de los Garza**: Miriam Guadalupe Armendáriz Bustos, Narciso Solares Rojas, Noe Gracia Sanchez, Otilia Violeta González Elizondo; **Tampico**: Alejandra Altamirano Vizcarra, Evangelina Cerecedo Martínez, Gerardo Hernández Lara, Giovana Marisol Medina Carreño, Jorge Ramón Portillo Velázquez, Ma. Guadalupe Palacios Torres, Mary Carmen Cruz Islas; **Tapachula**: Ana Gabriela Gamboa Torres, Eduardo de Jesús Piedrasanta Velazquez, Ingrid Iliana Cueto Garcia, Miguel Angel Mancera Castillo; **Tecomán**: Ana Paulina Esparza Gutiérrez, Katya Elizabeth Rodríguez Reyes; **Tehuacán**: Mónica Vázquez Blanco, Sara Ramos Cuevas, Yody Méndez Gutiérrez; **Tepic**: Eunice Chavarín Aragón, Iris Noemí Casillas Castellón, Luis Gerardo Aguilar Arcadia, Martha Patricia Rodríguez Plascencia; **Texcoco**: Carmen Naly Santiago Fierro, Eusebia Rojas Herrera, José Juan Bautista Butrón, Laura Jiménez Méndez, María Magdalena Ramos Martínez, Sara Elvira Galicia Gutiérrez; **Tijuana Guaycura**: Ángela María Corona Nava, Gemma Lizeth Plascencia Mendoza, José

Rosario Alvarez Álvarez, María del Carmen Zavala Monreal, Norma Angélica Guadalupe Moysen Vargas; **Tijuana Soler**: Cecilia Sarmiento Solano, Deborah Iovana Figueroa Castañeda, Lirio Inzunza Contreras, María del Carmen Velazquez Flores, Mónica Jazmín Salinas Sanchez, Ninfa Martínez García, Samantha Nieto Pérez; **Tlalnepantla**: Albam Uceda Miranda, Edgar Vera González, María del Rosario Cortés Téllez, Martha Patricia Vásquez Tapia, Paulina Sierra García; **Tlalpan**: Alejandra Ávalos Torres, Olivia Jani Vega González, Virginia Ortiz González; **Tlaquepaque**: Cindy Margarita Reynoso Carreño, Daniel Chairez Muñoz, Francisco Águila Orosco, Juan Antonio Chávez Vázquez , Juan Pablo Nungaray Gutiérrez, Laura Flores Fermín, Luis Jorge Ayala Mora, Miriam Esther Trejo Nuñez, Ramiro Cuevas Díaz; **Tlaxcala**: Adriana Guerrero Romero, Hilder Alberto Llanos Gutiérrez, Jesús Gutiérrez Ocampo, Jesús Iván Yerena González, Minerva Paola Moreno Caporal; **Toluca**: Araceli Olvera Verdeja, Cecilia Quintero Ávila, Cruz Cielo Piñón, Elvira Garduño Huertas, Juan Carlos Cruz Miguel, Juana Bernal Malvaez, Martha Susana Escobedo Galindo, Matilde Adriana Cambron Gomez, Xochitl García Sanchez; **Torreón Oriente**: Cecilia Martínez López, Cecilia Pineda Granados, Elvia Gabriela Sosa Urbina, Enrique David Rocha Rocha, José Alberto Calderón Godínez, María Teresa Sifuentes González, Nadia Azucena Pedroza Verastegui, Paloma de los Santos Ortega, Zaira Patricia Ibarra Vázquez ; **Tuxtla Gutiérrez**: Olga Rossana Gongora Garza, Samy Rubí Solís Méndez, Tania Sevilla Saucedo; **Venustiano Carranza**: Alma Rosa Cuevas Caballero, Ana María González Serrano, Blanca Flor Urbina Camacho, Gloria Contreras Álvarez, Joaquín Zamora Escutia, José Adrián Herrera Sánchez, José Ulises Maldonado del Ángel, Miguel Ángel Morales Molina; **Villahermosa**: Ana Silvia Lázaro Valencia, María del Rosario Mayo Tavares, Naun Hernández Hernandez; **Xalapa**: Antonio de Jesús Álvarez Guillén, Brenda Yohaly Vivanco Herrera, Daniel Castañeda Enríquez, Nayeli Castillo Quiroz, Norma Leticia Sánchez Arauz, Rafael Miguel Contreras Pérez, Reyna Elena Torres Hernández; **Yucatán**: Érica Vargas Sanchez, Julio Ernesto Moreno Rivero, Pedro Luis Arango Torrejón, Rodolfo Jiménez Delgadillo, Ruperta María de los Milagros Lugo Y Pech; **Zacatecas**: Alfredo Alvarez Haro, Jazmín Angelica Treto Martínez, José Martín de León Cruz, Miguel Ángel Solís Ruvalcaba; **Zamora**: Adriana López Rodríguez, José Manuel Cázarez Castillo, María del Pilar Espinoza Parra, María Guadalupe Aviña Rodriguez, Verónica Esperanza Ochoa Valencia; **Zapopan Norte**: Juan Alejandro Serrano Córdova, Martha Gabriela Sánchez Aguilar, Olga Lidia Acosta Nungaray; **UH Ciudad Juárez**: Fátima Alejandra Maya Cabral, José Manuel Carrillo Avendaño; **UH Culiacán**: Danny Eloir Meza Castro, Ernesto Javier Benitez Gaspar, José Noel Iribe Pérez; **UH Ecatepec**: Daniel Salinas Garcia, Víctor Hugo Zapata Barrera; **UH Iztapalapa**: Carol Arroyo Ruano, Marco Antonio León Espejel; **UH Nuevo León**: Agustín Jaime Cadengo Jiménez, David Alejandro Licón Ledezma, Gerardo Torres Estrada, Jorge Fernando Sierra Flores, Martín Isaac Salgado Guerrero; **UH Naucalpan**: Abraham de Jesús Salas Peniche, Denisse Viridiana Aceves Sánchez, Isabel Rocio Silva Cervantes, Laura Marlén Bonfil Román, Naashieli Nájera Domínguez; **UH Punta Diamante**: Carina Blanco Bailón, Celia María Hernández Salmerón, Edwin Hernández Quinto, Pedro Daniel Quezada Juárez, Saúl Zeus Enríquez Rodríguez; **UH Tijuana**: Miguel Abdias Ávalos Molina, Miguel Ángel Guardado Arvizu, Miguel Ángel Ortiz Aguilar; **UH Zapopan**: Enrique Nolasco Rodriguez, Juan Pablo Preciado Aguirre, Karla Alejandra Luna Ávila; **UH Zapotlán el Grande**: Ana Cristina Infante Sedano, Erika Prado Pérez, María na Celeste López Méndez; **UTUH Cd. Juárez**: David Alonso Gomez Melchor, Jesús Alfredo Castro Ortiz; **UTUH Tijuana**: Rubí Georgina González Serrano.

CONTENIDO	PÁG.
Resumen	9
Antecedentes	10
Método	11
Resultados	14
Características sociodemográficas	15
Consumo de drogas	19
Nuevas sustancias de abuso o emergentes	30
Alerta epidemiológica	
Fentanilo y análogos	33
Nicotina en dispositivo electrónico	34
Referencias	36
Anexo	40
Glosario	73

ÍNDICE DE TABLAS

			PÁG.
Tabla	1	Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	41
Tabla	2	Principales motivos de consulta declarados	44
Tabla	3	Sexo	44
Tabla	4	Edad de ingreso a tratamiento	45
Tabla	5	Estado civil	45
Tabla	6	Escolaridad	46
Tabla	7	Ocupación	46
Tabla	8	Estrato social	47
Tabla	9	Población en situación de vulnerabilidad	47
Tabla	10	Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones	48
Tabla	11	Edad de inicio del consumo de tabaco	50
Tabla	12	Edad de inicio del consumo de alcohol	50
Tabla	13	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	51
Tabla	14	Drogas ilícitas de inicio, según menciones	52
Tabla	15	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	54
Tabla	16	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	54
Tabla	17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	55
Tabla	18	Tipo de consumo de drogas ilícitas	55
Tabla	19	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	56
Tabla	20	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	56
Tabla	21	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	57
Tabla	22	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	60
Tabla	23	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	60
Tabla	24	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	61
Tabla	25	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	64
Tabla	26	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	66
Tabla	27	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	66
Tabla	28	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	67
Tabla	29	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	68
Tabla	30	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol en los últimos 30 días	71
Tabla	31	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	71
Tabla	32	Problemas asociados al consumo de sustancias	72

RESUMEN

En el segundo semestre de 2024, se presentaron **9,528 personas con consumo de drogas ilícitas** a solicitar tratamiento por primera vez en Centros de Integración Juvenil (CIJ), de las cuales, el 99.0% lo hizo de manera presencial. Los principales motivos de consulta declarados fueron el consumo de sustancias (88.6%) y otras condiciones de salud mental, principalmente por ansiedad (27.9%) y depresión (24.2%).

Los hombres se siguen presentado con mayor frecuencia que las mujeres a solicitar atención por consumo de sustancias, en una proporción de 2.6 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento se situó en 25.4 años. Los hombres tardan un poco más que las mujeres para acudir a solicitar atención en CIJ (25.7 años y 24.7 años, respectivamente).

La edad de inicio del consumo de tabaco y de alcohol se situó alrededor de los 15 años (15.2 años y 14.9 años, respectivamente), en tanto que la edad de inicio del consumo de drogas ilícitas se situó en 17.1 años.

Las drogas de mayor impacto, por las que se solicitó el tratamiento fueron: metanfetaminas (38.0%), cannabis (27.6%) y alcohol (12.9%). Las principales sustancias consumidas alguna vez fueron: alcohol (80.8%), cannabis (78.2%), tabaco (72.0%) y metanfetaminas (48.9%,). Mientras que en el mes previo al ingreso a tratamiento se consumió principalmente: tabaco (47.4%), alcohol (46.4%), cannabis (35.3%), metanfetaminas (25.2%) y clorhidrato de cocaína (8.4%).

En cuanto al seguimiento de las Nuevas Sustancias de Abuso (NSA) o de uso poco común se observó que 1,833 personas reportaron haber consumido alguna de estas sustancias al menos una vez (19.4%). Entre las principales NSA se encontró que el consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivos electrónicos fue la sustancia más reportada (12.5%), seguida por mariguana modificada (4.4%), dextrometorfano (1.7%) y hachís en presentación de aceite o miel (1.2%). En menor medida se reportó el consumo de mariguana sintética (0.6%), fentanilo y análogos (0.6%), DMT y análogos (0.5%), drogas de diseño con efecto estimulante (0.4%), ayahuasca (0.4%), medicamentos con compuestos cannábicos (0.3%), salvia divinorum (0.3%), ketamina (0.3%), GHB y sustancias similares (0.2%), fenciclidina y sustancias análogas (0.1%), fenitelaminas (0.1%) y un caso con consumo de piperazinas con efectos similares al éxtasis y otro caso con consumo de aminoidanos.

En relación con el consumo de nicotina en dispositivos electrónicos se observó que es más prevalente entre la población más joven y entre las mujeres.

En comparación con el semestre anterior, se registró un incremento en el número de casos que reportaron el consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos, al pasar de 52 casos en el primer semestre de 2024 a 59 casos en el segundo semestre del mismo año.

Los problemas asociados al consumo de drogas ilícitas más reportados fueron los familiares (77.4%), seguidos de los psicológicos (63.6%), de salud (49.3%), escolares (39.8%) y laborales (31.3%).

ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil A.C. (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento en sus unidades de atención desde el año de 1976 (Sanchez-Huesca y López, 1985). En 1983 inició la aplicación de una cédula homogénea a las personas de nuevo ingreso (Clarac y Wagner, 1987). No obstante, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática (García et al, 1999). Lo que permitió la implementación del *Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (RIECD), el cual se ha consolidado a través de los años, gracias al aprovechamiento de los avances tecnológicos, siendo su última modificación en el año 2021.

El RIECD realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen a la toma de decisiones de los servicios institucionales, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del consumo de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) (Secretaria de Salud [SS], 2009) de la Secretaría de Salud, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID), perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría "*Ramón de la Fuente Muñiz*" (INPRF)− (Ortiz et al, 2019) y el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (SS, 2019).

Por un lado, el RIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados realizados por CIJ. Donde sobresalen los estudios de tendencias del consumo de sustancias (Centros de Integración Juvenil [CIJ], 2022b; CIJ, 2022c; CIJ, 2022d; García y Balanzario, 2001; García et al, 2018), el perfil de consumidores de drogas y su trayectoria de consumo (García et al, 1998), el consumo de drogas en mujeres (Castillo y Gutiérrez, 2008), el consumo de sustancias en población infantil (García y Balanzario, 2003) o de acuerdo con las etapas de la vida (García et al, 2003). Información que, en su momento, permitió enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que ha servido de sustento en el diseño de estudios sobre características particulares de las personas con consumo de estos alcaloides (Jiménez et al, 2005; Jiménez y Castillo, 2014).

Por otro lado, la información reportada a través del RIECD ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características de las personas que consumen drogas legales solicitantes de tratamiento en CIJ. Así, desde el 2006 se genera un informe de las características de las personas que consumen tabaco y alcohol (Gutiérrez y Castillo, 2007), con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores (CIJ, 2022a); suceso que ha motivado que CIJ profundice en esta problemática (Moreno, 2010). Estos hallazgos son consistentes con lo reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco

(Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz et al. [ENCODAT], 2017a), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes.

Asimismo, la información generada por este Sistema, durante más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales (Medina-Mora et al., 2012a; Medina-Mora et al., 2012b; ENCODAT, 2017b) y ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso del *Estudio Básico de Comunidad Objetivo* (CIJ, 2019) realizado por CIJ en toda la República Mexicana.

Cabe destacar que, a partir del primer semestre de 2021, CIJ inició el registro y seguimiento de Nuevas Sustancias de Abuso (NSA) o sustancias emergentes. Esto debido a la proliferación de nuevas sustancias psicotrópicas de reciente creación o aparición en el mercado y que no están controladas por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 o la Convención de 1971, pero que pueden representar una amenaza para la salud pública (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2018; United Nations Office on Drugs and Crime, 2024).

El reporte se elaboró con base en la información obtenida del Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0, correspondiente al segundo semestre del año 2024. Su objetivo es proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, el patrón de consumo de drogas de las personas solicitantes de tratamiento y variables asociadas a la solicitud de tratamiento de las personas usuarias de drogas ilegales de primer ingreso a tratamiento en CIJ. A través de este, se aportan elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y brindar información para investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: estudio descriptivo, transversal-retrospectivo, con corte semestral.

Población: 9,528 personas con consumo de drogas ilícitas procedentes de 110 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre julio y diciembre de 2024 (Anexo, Tabla 1).

Fuente de información: Base de datos recuperada el día 22 de enero del 2025 a las 11:45 hrs., correspondiente al formato electrónico de Entrevista Inicial que requisita el equipo médico-técnico en la primera consulta que tienen las personas en alguna unidad de CIJ. Este formato es parte del Expediente Clínico Electrónico que se captura en el Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0.

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato social y población en situación de vulnerabilidad. Las variables de patrón de consumo incluyen: edad de inicio del consumo de sustancias (tabaco, alcohol y drogas ilícitas), tiempo transcurrido entre el inicio del

consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento (tabaco, alcohol y drogas ilícitas), droga ilícita de inicio, consumo alguna vez en la vida, consumo en el último año, consumo en los últimos 30 días; drogas de preferencia en el último año, droga de mayor impacto (por la cual podría estar solicitando atención en CIJ), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, frecuencia de episodios de abuso, total de drogas consumidas, y el reporte de nuevas sustancias de abuso o de uso poco común. Finalmente, se incluyen variables asociadas a la solicitud de tratamiento, como son los motivos de consulta y los problemas asociados al consumo de sustancias.

El registro del consumo de drogas comprende 82 sustancias, las cuales en el caso del consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes, además se clasifican en 25 categorías:

Grupo(s) de Sustancias		Sustancias
1. Tabaco		Tabaco; Nicotina en dispositivo electrónico
2. Alcohol		Bebidas fermentadas; Bebidas destiladas; Alcohol puro (alc. del 96)
3. Cannabis		Mariguana “estándar”; Mariguana modificada, con alto nivel de THC; Hachís – Resina; Hachís - Aceite o miel
4. Sustancias asociadas al cannabis		"Mariguana" sintética; Medicamentos con compuestos cannábicos
5. Inhalables		Solventes y removedores; Pegamentos; Esmaltes y pinturas; Gasolinas y combustibles; Otros inhalables
6. Cocaína	7. Cocaína (clorhidrato)	Cocaína en polvo blanco
	8. Crack	Crack
	9. Otra presentación de cocaína	Basuco (pasta base de cocaína); Otras presentaciones de cocaína
10. Metanfetaminas		Metanfetaminas: cristal, Hielo; "Metas"
11. Otros estimulantes		Sales de baño; Anfetaminas y derivados; Anorexígenos; Drogas de diseño con efectos estimulantes; Otros estimulantes
12. Éxtasis	13. Éxtasis (MDMA)	Éxtasis (MDMA)
	14. Sust. con efectos similares al éxtasis	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis; Piperazinas con efectos similares al éxtasis; Aminoindanos
15. Benzodiacepinas		Benzodiacepinas y sustancias relacionadas; Rohypnol
16. Otros depresores		GHB o similares; Sedantes hipnóticos; Otros depresores del SNC
17. Alucinógenos	18. LSD/LSA	LSD; LSA
	19. Plantas alucinógenas o disociativas	Hongos alucinógenos; Peyote (mezcalina); Salvia divinorum u otras variedades de salvia; Ololiuqui; Floripondio; Ayahuasca; Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos
	20. Otros alucinógenos	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel); Análogos del PCP; Ketamina; Dextrometorfano; DMT; Triptaminas psicodélicas

Grupo(s) de Sustancias	Sustancias
	derivadas y análogas del DMT; Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe; Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos; Otras sustancias con efectos psicodélicos
21. Heroína	Heroína blanca; Heroína negra o morena
22. Opioides sintéticos	Oxicodona; Opioides sintéticos; Fentanilo y análogos; Derivados Opioides combinados con analgésicos; Desomorfina
23. Opio y derivados	Opio; Morfina; Codeína
24. Sustancias con utilidad médica, utilizadas fuera de prescripción	Anticolinérgicos; Antiespasmódicos; Antiparkinsónicos; Anticonvulsivos; Antidepresivos; Antipsicóticos o neurolépticos; Antihistamínicos; Otras sustancias de abuso con utilidad médica
25. Otras sustancias de abuso	Nitritos; Anestésicos; Bebidas energizantes; Drogas o bebidas inteligentes; Esteroides anabólicos; Sustancias no clasificadas; Sustancias sin especificar

Para el presente reporte las nuevas sustancias de abuso (NSA) o sustancias emergentes en seguimiento son: Nicotina en dispositivo electrónico, Mariguana modificada -con alto nivel de THC-, Hachís –*Aceite o miel*–, "Mariguana sintética", Medicamentos con compuestos cannábicos, Sales de baño, Drogas de diseño con efectos estimulantes, Piperazinas con efectos similares al éxtasis, Aminoidanos, Fenciclidina –*PCP, polvo de ángel*– y análogos del PCP, Ketamina, Dextrometorfano, DMT y análogos, Fenitelaminas –*Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe*–, Salvia divinorum, Ayahuasca, GHB o similares, Fentanilo y análogos y Desomorfina. El seguimiento de estas sustancias incluye el consumo alguna vez en la vida, la edad de inicio de cada una de estas sustancias y las entidades federativas donde se registró la solicitud de tratamiento de personas con consumo de estas sustancias.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desagregada por sexo, en porcentajes válidos, excluyendo los casos "*sin información*" y aquellos que no cumplen con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio. Cabe señalar que para contabilizar el total de sustancias consumidas se consideran las 82 sustancias en seguimiento.

RESULTADOS

Entre julio y diciembre del 2024 se registró a **9,528 personas con consumo de drogas ilícitas** solicitantes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. 9,437 personas lo hicieron de manera presencial (99.0%) y 99 lo hicieron a distancia (telemática: 1.0%).

El principal motivo de consulta declarado fue el consumo de sustancias psicoactivas (88.6%), mientras que 42.2% reportó otras condiciones de salud, 47.8% de los casos declaró más de un motivo de consulta (Figura 1).

Figura 1. Principales motivos de consulta declarados



CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS[1]

Sexo. La población se conformó por 6,899 hombres (72.4%) y 2,629 mujeres (27.6%); es decir, por casi tres hombres que solicitan tratamiento en CIJ (2.6 hombres), lo hace una mujer. Cabe señalar que 44 mujeres expresaron estar embarazadas (1.7% de las mujeres).

Edad de ingreso a tratamiento. Se registró un rango de edad de 8 a 82 años, con una media de 25.4 años (DE= 11.5 años), una mediana de 21 años y una moda de 17 años (733 casos). El 81.6% de las personas con consumo de sustancias ilícitas (7,777 casos) tenían entre 14 y 37 años, mientras que el 35.4% de los casos eran menores de edad (3,374 personas).

Figura 2. Edad de ingreso a tratamiento por sexo

	Años	Años
Rango	8 a 82	12 a 76
Media (Desviación estándar)	25.7 (11.6)	24.7 (11.2)
Mediana	22	21
Moda	17	16
Decil$_1$	15	15

Los hombres y las mujeres ingresaron a tratamiento en a una edad similar.

[1] Cfr., Anexo, Tablas 1 a 9.

Estado civil. El 72.9% de la población refirió ser soltera; el 12.1% indicó que vivía en unión libre; el 8.3% dijo estar casada; el 4.8% estaba separada y el 1.4% ya se había divorciado.

Figura 3. Estado civil por sexo

Los hombres refieren una situación conyugal similar que las mujeres



Escolaridad. El 43.8% de la población había cursado algún grado de bachillerato, el 30.8% algún grado de educación secundaria, el 16.4% tenía estudios superiores y el 5.3% había cursado solamente estudios de primaria.

Figura 4. Escolaridad por sexo



Los hombres cuentan en mayor proporción que las mujeres, con estudios de primaria, secundaria y bachillerato, mientras que ellas cuentan, en mayor proporción que los hombres, con estudios de nivel técnico, superior y posgrado.

Ocupación. El 37.6% desempeñaba alguna actividad laboral, el 32.3% reportó ser estudiante de tiempo completo y el 17.1% estaba desempleado.

Figura 5. Principal ocupación por sexo



Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedicaba a estudiar o al hogar, casi la mitad de la población de hombres contaba con un trabajo remunerado (49.9%), seguidos de los que se dedican a estudiar, no obstante, casi uno de cada seis hombres no tenía ocupación.

Estrato social. De acuerdo con la percepción de los terapeutas, poco más de la mitad de los casos (55.0%) se ubicaban en el estrato medio bajo, un 35.6% en el nivel bajo, un 5.8% fue clasificado en el estrato medio alto y otro 3.3% en el estrato muy bajo.

Figura 6. Estrato social por sexo



Tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando los estratos medio bajo y bajo.

Población en situación de vulnerabilidad. Entre las personas que se consideran en situación de vulnerabilidad se encuentran las ***mujeres*** de las cuales (2,629 mujeres solicitaron tratamiento), 1.7% refirió estar embarazada y 0.8% indicó no saber si se encontraba embarazada.

El 6.5% de las personas refirió pertenecer a la ***comunidad LGBTIQ+*** (624 personas, de las cuales 285 refirió ser bisexual, 209 gais y 59 lesbianas).

El 0.9% dijo ser miembro de alguna ***comunidad indígena*** (85 personas) y 0.2% de la comunidad ***afrodescendiente*** (15 personas).

El 1.8% refirió tener algún tipo de ***discapacidad:*** 90 personas presentan discapacidad sensorial y de la comunicación, 66 discapacidad motriz y 11 discapacidad múltiple.

El 0.9% manifestó haber migrado a otro país en los últimos 12 meses (87 personas).

El 1.8% señaló haber vivido en Estados Unidos un año o más, principalmente en los estados de California (75 casos), Texas (25 casos) y Arizona (12 casos).

Figura 7. Población en situación de vulnerabilidad por sexo



Entre los casos que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, sobresalen las mujeres. En tanto que un mayor porcentaje de hombres es miembro de alguna comunidad indígena, ha vivido como migrante en Estados Unidos de Norteamérica, y tienen alguna discapacidad, en relación con las mujeres.

CONSUMO DE DROGAS[2]

Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto). 8,468 personas refirieron que la solicitud de tratamiento fue por el consumo de alguna sustancia (6,338 hombres y 2,130 mujeres). Las principales sustancias a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: metanfetaminas (38.0%, esencialmente cristal: 37.6%), cannabis (27.6%; básicamente mariguana estándar: 27.3%) y alcohol (12.9%); en menor medida se mencionó al tabaco (6.0%), a la cocaína en polvo blanco (5.7%) y al crack (3.4%).

Figura 8. Droga de mayor impacto por sexo



Las metanfetaminas y el cannabis son las principales sustancias por las que se solicita tratamiento; los hombres acuden en mayor proporción que las mujeres por problemas asociados al consumo de cannabis, inhalables, cocaína y crack. Ellas acuden en mayor proporción que ellos por lo que les ocasiona el uso de metanfetaminas, tabaco, alcohol, benzodiacepinas y alucinógenos.

[2] Cfr., Cuadros 10 a 32.

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco fue a los 15.2 años (DE= 3.9 años), mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.9 años (DE= 3.5 años), la mediana y la moda de ambas sustancias fue a los 15 años. Mientras que la edad promedio de inicio del consumo de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 17.1 años (DE= 6.2 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades más tempranas de inicio, se observa que tanto para el tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas se ubica en los 12 años.

Figura 9. Edad de inicio del consumo de sustancias por sexo

	Años			Años		
	Tabaco	**Alcohol**	**Drogas ilícitas**	**Tabaco**	**Alcohol**	**Drogas ilícitas**
Media (Desviación estándar)	15.0 (3.9)	14.7 (3.3)	16.7 (5.6)	15.5 (4.1)	15.2 (4.0)	18.2 (7.5)
Mediana	15	15	15	15	15	16
Moda	15	15	15	15	15	15
Decil$_1$	12	11	12	12	12	13

En general, hombres y mujeres inician el consumo de alcohol y tabaco a la misma edad, al considerar el primer decil como indicador de las edades más tempranas de inicio, ellas inician más tarde el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas drogas ilícitas.

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias más reportadas fueron: cannabis (65.6%, principalmente mariguana estándar: 63.1%); metanfetaminas (15.2%; principalmente cristal: 14.9%); cocaína (9.9%, básicamente en clorhidrato de cocaína: 8.4% y de crack: 1.3%); e inhalables (3.7%, mayormente en forma de solventes y removedores: 2.3%).

Figura 10. Principales drogas ilícitas de inicio por sexo



El cannabis es la principal droga ilegal de inicio en los hombres y las mujeres, seguida por el consumo de metanfetaminas y de cocaína en polvo (clorhidrato).

Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el haber iniciado el consumo de sustancias ilegales con cannabis, inhalables, cocaína en polvo, crack y heroína. En tanto que las mujeres iniciaron el consumo, en mayor proporción que los hombres, con metanfetaminas, benzodiacepinas y alucinógenos.

Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años transcurrido entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se presentó de la siguiente forma: tabaco, 10.7 años (DE=10.9 años), alcohol 11.4 años (DE=10.8 años) y drogas ilícitas 8.3 años (DE =9.6 años).

Cabe señalar que la mitad de las personas con consumo de drogas dejaron pasar hasta siete años desde que iniciaron el consumo de tabaco, hasta ocho años desde el inicio de alcohol y hasta cuatro años desde el inicio de drogas ilícitas hasta que acudieron a solicitar tratamiento.

Figura 11. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ por sexo

	Años			Años		
	Tabaco	**Alcohol**	**Drogas ilícitas**	**Tabaco**	**Alcohol**	**Drogas ilícitas**
Promedio (Desviación estándar)	11.0 (11.0)	11.9 (11.1)	9.0 (10.0)	9.9 (10.6)	10.1 (9.9)	6.5 (8.0)
Mediana	7	8	5	6	7	3
Moda	1	2	1	1	2	1
Decil$_1$	1	1	1	1	1	1

Los hombres tardan más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, el 46.5% de los solicitantes de tratamiento fue catalogado con consumo funcional, el 18.1% con consumo disfuncional, el 15.0% con consumo social u ocasional, el 12.4% con consumo experimental y el 7.9% presentaba remisión del consumo.

Figura 12. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo



Si bien, la mayor proporción de hombres y mujeres son catalogados con un consumo funcional de drogas, ellas registran en mayor proporción que los hombres un consumo experimental, social y en remisión.

Total de drogas consumidas. La media de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol y tabaco, fue de 4.2 drogas (91.4% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.1 drogas (81.4% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.9 drogas (55.0% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

La media de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.3 drogas (58.4% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.5 drogas (38.6% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 0.8 drogas (18.0% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 13. Promedio de drogas consumidas por sexo



Mujeres y hombres han consumido prácticamente el mismo número de sustancias; siendo ligeramente mayor en los hombres.

Consumo de drogas alguna vez en la vida.[3] Las sustancias de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (80.8%; principalmente bebidas fermentadas: 65.9%), cannabis (78.2%; principalmente mariguana estándar: 75.6%), tabaco (72.0%), metanfetaminas (48.9%, principalmente en su presentación de cristal: 48.0%), clorhidrato de cocaína (35.5%) y crack (9.8%); en menor medida se reportó el consumo de inhalables (13.2%; principalmente solventes y removedores: 7.9%), alucinógenos (13.1%; primordialmente LSD: 10.0% y plantas alucinógenas o disociativas: 4.4%), benzodiacepinas (8.8%), éxtasis y sustancias similares (2.5%), heroína (1.1%) y opioides sin prescripción médica (1.2%).

El 1.9% reportó el consumo de sustancias de uso médico sin prescripción (el 1.0% reportó el consumo de antidepresivos) y el 3.2% reportó otras sustancias de abuso (principalmente bebidas energizantes: 2.5%).

Figura 14. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sexo



Las sustancias más consumidas por hombres y mujeres fueron el alcohol, el cannabis, el tabaco y las metanfetaminas.

En general, sobresale un mayor consumo en los hombres.

[3] Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses.[4] 97.6% de las personas reportó haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

En este lapso, las sustancias más consumidas fueron: alcohol (70.7%; principalmente bebidas fermentadas: 56.5%), tabaco (59.7%), cannabis (55.4%; principalmente mariguana estándar: 53.0%), metanfetaminas (41.3%), clorhidrato de cocaína (19.0%), crack (5.2%), inhalables (6.4%), alucinógenos (5.8%; principalmente LSD: 3.9%) y benzodiacepinas (4.9%). En menor medida se reportó el consumo de otras sustancias de abuso[5] (2.5%, principalmente bebidas energizantes: 1.9%), sustancias de uso médico sin prescripción (1.2%), éxtasis (0.8%), opioides sin prescripción médica (0.8%) y heroína (0.5%).

Figura 15. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sexo



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco, cannabis y metanfetaminas. En general. Los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de sustancias, con excepción del consumo de benzodiacepinas y de opioides sin prescripción médica.

[4] Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

[5] Nitritos, anestésicos, bebidas energizantes, drogas o bebidas inteligentes, esteroides anabólicos y sustancias sin clasificar o sin especificar.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Las personas reportaron mayor preferencia por el consumo de cannabis (31.5%, principalmente mariguana estándar: 29.7%), metanfetaminas (27.6%), alcohol (17.3%; en su mayoría bebidas fermentadas: 11.5%) y tabaco (12.5%).

Figura 16. Droga de preferencia en los últimos 12 meses por sexo



En los últimos 12 meses, los hombres y las mujeres prefirieron el consumo de cannabis y metanfetaminas. Ellos reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el consumo de cannabis, inhalables, cocaína, crack y heroína; mientras que la preferencia por el tabaco, alcohol, metanfetaminas, benzodiacepinas y alucinógenos fue mayor en las mujeres que en los hombres.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.[6] De las personas con consumo de drogas que usaron sustancias en el último año, y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, 59.9% reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

Figura 17. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el consumo de dos o más sustancias (no se incluye el consumo de tabaco) en un mismo día.

[6] No se toman en cuenta 3,031 casos (31.8%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 28.9% de los hombres y 39.5% de las mujeres (ver anexo, cuadro 26).

Consumo de drogas en los últimos 30 días.[7] En este lapso, 83.7% de los casos reportó el consumo de alcohol, tabaco o drogas ilícitas. Las sustancias más consumidas fueron: tabaco (47.4%), alcohol (46.4%; principalmente bebidas fermentadas: 36.9%), cannabis (35.3%; principalmente mariguana estándar: 33.6%), metanfetaminas (25.2%; principalmente en presentación de cristal: 24.9%), clorhidrato de cocaína (8.4%), crack (3.0%), inhalables (3.3%; principalmente solventes y removedores: 2.1%), benzodiacepinas (2.5%), alucinógenos (1.4%; primordialmente LSD/LSA: 0.8%) y otras sustancias de abuso (1.4%; principalmente bebidas energizantes: 1.2%)

En menor medida se refirió el consumo de sustancias similares al cannabis (0.4%), opioides (0.4%), heroína (0.3%) y sustancias de uso médico sin prescripción (0.7%; principalmente antidepresivos: 0.3%).

Figura 18. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sexo



Hombres y mujeres consumieron predominantemente alcohol, tabaco, cannabis y metanfetaminas –los hombres en mayor proporción–. Las mujeres predominaron en el consumo de benzodiacepinas y de opioides (fuera de prescripción).

[7] Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. El 36.9% de quienes reportaron consumo de alcohol en los últimos 30 día reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana y 27.7% de una o dos veces a la semana. Por otra parte, 33.4% de las personas con consumo de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 30.5% menos de una vez a la semana, 22.0% de una a dos veces a la semana y 14.1% cada tercer día.

Figura 19. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



En general, los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso en el consumo de alcohol y de drogas ilícitas que las mujeres.

Problemas asociados al consumo de sustancias. El 77.4% de las personas con consumo de drogas ilícitas refirió haber tenido problemas familiares asociados al consumo de sustancias, el 63.6% presentó problemas psicológicos, el 49.3% de salud, el 39.8% escolares, el 31.3% laborales, el 22.9% tuvo accidentes o lesiones, el 20.5% problemas de conducta antisocial o delictiva y el 19.6% problemas legales. El 80.1% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que un 9.9% no reportó ninguno.

Figura 20. Problemas asociados al consumo de sustancias por sexo



En general, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres los problemas asociados al consumo de sustancias; mientras que las mujeres rebasan el porcentaje de hombres al no referir problemas asociados.

Entre hombres y mujeres, los problemas familiares son las problemáticas más frecuentemente relacionadas al consumo de drogas, le siguen los problemas psicológicos, de salud y escolares.

NUEVAS SUSTANCIAS DE ABUSO O SUSTANCIAS EMERGENTES (NSA)

En el presente reporte se da seguimiento a 19 sustancias consideradas nuevas sustancias de abuso o sustancias emergentes (Figura 21). En el segundo semestre de 2024 se obtuvo el registró de 1,833 personas que reportaron haber consumido al menos una de estas sustancias en seguimiento (19.2%); el 19.4% de los hombres y el 18.8% de las mujeres.

El consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivos electrónicos fue la sustancia más reportada (12.5%), seguida por la mariguana modificada (4.4%), el dextrometorfano (1.7%), el hachís en presentación de aceite o miel (1.2%), la mariguana sintética (0.6%), el fentanilo y análogos (0.6%), el DMT y análogos (0.5%), drogas de diseño con efecto estimulante (0.4%), la ayahuasca (0.4%), los medicamentos con compuestos cannábicos (0.3%), la salvia divinorum (0.3%) y ketamina (0.3%). En menor medida se reportó el consumo de GHB y sustancias similares (0.2%), fenciclidina y sustancias análogas (0.1%), fenitelaminas (0.1%) y un caso con consumo de piperazinas con efectos similares al éxtasis y otro caso de aminoidanos. No se reportó el consumo de sales de baño y de desomorfina.

Figura 21. Consumo alguna vez en la vida de nuevas sustancias de abuso o sustancias emergentes por sexo



El inicio del consumo de las NSA en seguimiento se presenta en la juventud (entre los 16 y 29 años en promedio). No obstante, el inicio de consumo de piperazinas con efectos similares al éxtasis se presentó más tarde (1 caso a los 43 años).

Figura 22. Edad promedio de inicio de las nuevas sustancias de abuso o sustancias emergentes



Con relación al lugar donde se reportan estas NSA, se observa que el consumo de nicotina en dispositivos electrónicos se registró en todas las entidades federativas del país y que el estado con mayor número de NSA fue la Ciudad de México y el Estado de México (Figura 23).

Figura 23. Total de reporte de nuevas sustancias de abuso o de uso emergente por entidad federativa.



1. Fentanilo y análogos

El consumo de fentanilo sigue cobrando relevancia en el seguimiento epidemiológico del consumo de sustancias en México, no únicamente a que los opioides sintéticos —incluido el fentanilo— son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis en Estados Unidos (NIDA, 2021), sino por las implicaciones económicas, políticas y sociales que tiene el consumo para la población mexicana (Observatorio Mexicano de salud Mental y Adicciones, 2024).

Desde el primer semestre de 2021, el Reportes de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de CIJ realiza el seguimiento del consumo alguna vez en la vida de fentanilo y sustancias análogas en la población de primer ingreso a tratamiento, lo que ha permitido dar cuenta del incremento del consumo, al pasar de 5 casos en el primer semestre de 2021 a 59 casos en el segundo semestre de 2024 (Figura 24).

En el segundo semestre de 2024, 42 hombres y 17 mujeres reportaron el consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos, la edad promedio de inicio de uso de esta sustancia se ubicó en 21.2 años (D.E.=11.1 años). En esta población, las metanfetaminas fueron las principales sustancias que motivaron la solicitud de tratamiento (36 casos), seguidas por el fentanilo y análogos (8 casos).

Los estados donde se atendieron casos con consumo de fentanilo y análogos fueron: Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Sonora, Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Yucatán y Zacatecas (Figura 25).

Figura 24. Tendencia del consumo de fentanilo y análogos, 1er semestre de 2021 – 2do semestre de 2024.



Figura 25. Estados que reportan consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos, 2do semestre de 2024.



Entidad Federativa	Casos
Ciudad de México	13
Estado de México	12
Baja California	6
Sonora	5
Guanajuato	4
Chihuahua	3
Puebla	3
Guerrero	2
Quintana Roo	2
Sinaloa	2
Tlaxcala	2
Hidalgo	1
Jalisco	1
Morelos	1
Yucatán	1
Zacatecas	1

2. Nicotina en dispositivos electrónicos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2025), la nicotina que contiene el tabaco es sumamente adictiva y su consumo es un importante factor de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de desarrollar diferentes tipos o subtipos de cáncer.

Los sistemas electrónicos de suministro de nicotina, comúnmente se conocen como cigarrillos electrónicos, son instrumentos que se utilizan para aerolizar sustancias sin el uso de un proceso de combustión para luego ser inhaladas. Si bien, estos dispositivos pueden contener o no nicotina, se ha encontrado que son perjudiciales para la salud (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025; Accinelli et al., 2020).

Los sistemas electrónicos de administración de nicotina surgen en 2003 como una supuesta ayuda para dejar de fumar, sin embargo, en los últimos años ha tenido un crecimiento explosivo a nivel mundial, especialmente entre los jóvenes que se sienten atraídos por sus llamativos sabores y por el despliegue de tecnología que se utiliza en su diseño y funcionamiento (OMS, 2025).

Los sistemas electrónicos de suministro de nicotina suelen contener cantidades variables de nicotina y otras sustancias nocivas como glicidol, piridina, dimetil trisulfuro, acetoína y metilglioxal. Diversos estudios han encontrado que el uso de estos dispositivos eleva en el aire los niveles de nicotina, partículas, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, carbonilos y metales como aluminio; además de que causa inflamación, estrés oxidativo y es tóxico para múltiples tipos de células (pulmonares, endoteliales y células madre), aparte de incrementar la susceptibilidad a infecciones virales y bacterianas (Accinelli et al., 2020; Jara-Reinoso y Arráiz-De Fernández, 2024; Llambí et al., 2020; Martínez-Larenas et al., 2022).

En Centros de Integración Juvenil, el registro del consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivo electrónico se lleva a cabo desde el primer semestre de 2021, a través del cual se puede observar un incremento de más del 1500% entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2024, al pasar de 72 casos (1.1%) a 1,190 casos (12.5%), respectivamente (Figura 26).

Figura 26. Tendencia del consumo de nicotina en dispositivo electrónico, 1er semestre de 2021 – 2do semestre de 2024.



En el segundo semestre de 2024, el consumo de nicotina en dispositivos electrónicos fue reportado en todos los estados del país, por 819 hombres (68.8%) y 371 mujeres (31.2%). La edad promedio de inicio del consumo se ubicó en 16.7 años (DE= 6.1); en 87 casos fue la sustancia que motivó la solicitud de tratamiento (1.0%) y 536 personas reportaron su consumo en los últimos 30 días (5.6%).

Al considerar la edad de ingreso a tratamiento en CIJ y el sexo de las personas que consumen nicotina en dispositivos electrónicos, se observa que el consumo de nicotina a través de estos dispositivos electrónicos es más prevalente en las personas de menor edad y en las mujeres.

Figura 27. Consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivos electrónicos por rangos de edad y sexo.



REFERENCIAS

Accinelli, R. A., Lam, J., & Tafur, K. B. (2020). *El cigarrillo electrónico: un problema de salud pública emergente.* Revista peruana de medicina experimental y salud pública, 37, 122-128. doi.org/10.17843/rpmesp.2020.371.4780

Aurrecoechea, V. R., Gutiérrez-López, A. D., Rodríguez-Kuri, S. E., Velázquez-Altamirano, M., & Fernández-Cáceres, C. (2018). *Increasing methamphetamine use trends alert among patients in Mexico*. Journal of Substance Use, 23(5), 500–505. doi:10.1080/14659891.2018.1430182

Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). *Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México*. Salud Mental 31 (5), 351-359. http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf

Centros de Integración Juvenil, A.C. (2019). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2018.* México: Centros de Integración Juvenil, A. C. http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/Index.html

Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2022b). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en consumidores de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 1er semestre de 2022. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 22-04e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/22-04e.pdf

Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2022c). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 1er semestre de 2022. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 22-04f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/22-04f.pdf

Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2022d). *Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 1er semestre de 2022. (Nivel nacional y entidades federativas)* [Informe de Investigación 22-04g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/22-04g.pdf

Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2022a). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Consumidores exclusivos de tabaco y alcohol. Primer semestre del 2022.* (Informe de Investigación 22-04d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/22-04d.pdf

CEPAL (22 enero, 2025). Grupos en situación de vulnerabilidad. *CEPAL. https://comunidades.cepal.org/desarrollosocial/es/grupos/discusion/grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad#:~:text=Los%20grupos%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad%20abordados%20por%20la%20ARDSI,%3B%20las%20personas%20lesbianas%2C%20gais%2C*

Clarac, P. y Wagner, F. (1987). *Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes* (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).

García V. R., Diaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

García, V. R., Diaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

García-Aurrecoechea, V. R., Diaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Diaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. (2017a). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol.* Villatoro-

Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM.

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas.* Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.

Jara-Reinoso, M. D., & Arráiz-De-Fernández, C. (2024). *Uso del cigarrillo electrónico y riesgo de padecer enfermedades respiratorias en adolescentes y adultos jóvenes.* Ciencia y enfermería, 30. doi.org/10.29393/ce30-1ucmc20001

Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

Llambí, L., Rodríguez, D., Parodi, C., & Soto, E. (2020). *Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema controversial*. Revista Médica del Uruguay, 36(1), 153-191. doi.org/10.29193/rmu.36.1.7

Martínez-Larenas, M. V., Montañez-Aguirre, Á. A., González-Valdelamar, C. A., Fraga-Duarte, M., Cossío-Rodea, G., & Vera-López, J. C. (2022). *Efectos fisiopatológicos del cigarro electrónico: un problema de salud pública. Neumología y cirugía de tórax*, 81(2), 121-130. doi.org/10.35366/108498

Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012a). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol.* México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012b). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas.* México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres*.

México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

NIDA. (2021). El fentanilo – DrugFacts. https://nida.nih.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-fentanilo en 2023, July 21

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2018). *Informe Europeo sobre Drogas 2018: Tendencias y novedades.* Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. (2024). *Informe de la demanda y oferta de Fentanilo en México: generalidades y situación actual.* México. https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/informe-de-la-demanda-y-oferta-de-fentanilo-en-mexico-generalidades-y-situacion-actual?state=published

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2025). Tabaquismo. https://www.who.int/es/health-topics/tobacco#tab=tab_1

Ortiz A, Martínez R., Meza D. (2019). Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. *Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 63, noviembre de 2017*. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México. http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep_71_pdf.pdf

Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

Secretaría de Salud (2009). *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones* (SISVEA). México. Dirección General de Epidemiología.

Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019). *Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas*. https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/observatorio-mexicano-de-drogas-omd

United Nations Office on Drugs and Crime (2024). *World Drug Report 2024*. New York: United Nations. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html

Anexo

Características sociodemográficas de las personas con consumo de drogas ilícitas de primer ingreso a tratamiento a CIJ en el segundo semestre de 2024

Tabla 1. Personas de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	56	0.6	44	0.6	12	0.5	3.7
Álvaro Obregón Oriente	46	0.5	30	0.4	16	0.6	1.9
Atizapán	189	2.0	134	1.9	55	2.1	2.4
Azcapotzalco	98	1.0	65	0.9	33	1.3	2.0
Benito Juárez	142	1.5	98	1.4	44	1.7	2.2
Chalco	327	3.4	228	3.3	99	3.8	2.3
Coyoacán	117	1.2	89	1.3	28	1.1	3.2
Cuajimalpa	129	1.4	74	1.1	55	2.1	1.3
Cuauhtémoc Oriente	78	0.8	47	0.7	31	1.2	1.5
Cuauhtémoc Poniente	83	0.9	50	0.7	33	1.3	1.5
Ecatepec	173	1.8	127	1.8	46	1.7	2.8
Gustavo A. Madero Aragón	144	1.5	109	1.6	35	1.3	3.1
Gustavo A. Madero Norte	139	1.5	92	1.3	47	1.8	2.0
Gustavo A. Madero Oriente	35	0.4	21	0.3	14	0.5	1.5
Iztapalapa Oriente	221	2.3	170	2.5	51	1.9	3.3
Iztapalapa Poniente	89	0.9	66	1.0	23	0.9	2.9
Miguel Hidalgo	72	0.8	50	0.7	22	0.8	2.3
Naucalpan	82	0.9	59	0.9	23	0.9	2.6
Nezahualcóyotl	277	2.9	197	2.9	80	3.0	2.5
Texcoco	160	1.7	130	1.9	30	1.1	4.3
Tlalnepantla	179	1.9	125	1.8	54	2.1	2.3
Tlalpan	186	2.0	125	1.8	61	2.3	2.0
Venustiano Carranza	92	1.0	56	0.8	36	1.4	1.6
UH Ecatepec	41	0.4	40	0.6	1	0.0	40.0
UH Iztapalapa	82	0.9	58	0.8	24	0.9	2.4
UH Naucalpan	84	0.9	61	0.9	23	0.9	2.7
Acapulco	71	0.7	53	0.8	18	0.7	2.9
Acuña	38	0.4	33	0.5	5	0.2	6.6
Aguascalientes	111	1.2	78	1.1	33	1.3	2.4
Apatzingán	21	0.2	12	0.2	9	0.3	1.3
Apodaca	25	0.3	17	0.2	8	0.3	2.1
Cancún	131	1.4	89	1.3	42	1.6	2.1
Celaya	166	1.7	115	1.7	51	1.9	2.3
Chetumal	54	0.6	42	0.6	12	0.5	3.5
Chihuahua	221	2.3	184	2.7	37	1.4	5.0
Chilpancingo	46	0.5	39	0.6	7	0.3	5.6

Continúa

Tabla 1. Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Ciudad del Carmen	36	0.4	21	0.3	15	0.6	1.4
Ciudad Juárez Norte	213	2.2	152	2.2	61	2.3	2.5
Ciudad Victoria	55	0.6	47	0.7	8	0.3	5.9
Colima	61	0.6	48	0.7	13	0.5	3.7
Cozumel	56	0.6	39	0.6	17	0.6	2.3
Cuernavaca	98	1.0	67	1.0	31	1.2	2.2
Culiacán	80	0.8	65	0.9	15	0.6	4.3
Durango	62	0.7	45	0.7	17	0.6	2.6
Escuinapa	20	0.2	11	0.2	9	0.3	1.2
Fresnillo	48	0.5	34	0.5	14	0.5	2.4
Guadalajara Centro	151	1.6	108	1.6	43	1.6	2.5
Guadalajara Sur	95	1.0	70	1.0	25	1.0	2.8
Guadalupe	62	0.7	52	0.8	10	0.4	5.2
Guadalupe Zacatecas	9	0.1	1	0.0	8	0.3	0.1
Guamúchil	48	0.5	40	0.6	8	0.3	5.0
Guanajuato	36	0.4	22	0.3	14	0.5	1.6
Guasave	49	0.5	37	0.5	12	0.5	3.1
Hermosillo	118	1.2	87	1.3	31	1.2	2.8
Huatulco	24	0.3	13	0.2	11	0.4	1.2
Ixbalanqué	6	0.1	4	0.1	2	0.1	2.0
Ixtapa Zihuatanejo	46	0.5	31	0.4	15	0.6	2.1
La Paz	51	0.5	30	0.4	21	0.8	1.4
La Piedad	60	0.6	39	0.6	21	0.8	1.9
Laguna Durango	84	0.9	57	0.8	27	1.0	2.1
León	170	1.8	126	1.8	44	1.7	2.9
Los Cabos	46	0.5	29	0.4	17	0.6	1.7
Los Mochis	66	0.7	51	0.7	15	0.6	3.4
Manzanillo	14	0.1	8	0.1	6	0.2	1.3
Mazatlán	50	0.5	39	0.6	11	0.4	3.5
Mérida	79	0.8	71	1.0	8	0.3	8.9
Mexicali	125	1.3	89	1.3	36	1.4	2.5
Monterrey	133	1.4	112	1.6	21	0.8	5.3
Morelia	74	0.8	49	0.7	25	1.0	2.0
Nogales	88	0.9	63	0.9	25	1.0	2.5
Oaxaca	77	0.8	60	0.9	17	0.6	3.5
Pachuca	131	1.4	100	1.4	31	1.2	3.2
Playa del Carmen	79	0.8	45	0.7	34	1.3	1.3
Poza Rica	45	0.5	30	0.4	15	0.6	2.0
Puebla	109	1.1	78	1.1	31	1.2	2.5

Continúa

Tabla 1. Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Puerto Vallarta	79	0.8	70	1.0	9	0.3	7.8
Querétaro	90	0.9	54	0.8	36	1.4	1.5
Ramos Arizpe	20	0.2	13	0.2	7	0.3	1.9
Reynosa	79	0.8	55	0.8	24	0.9	2.3
Salamanca	56	0.6	45	0.7	11	0.4	4.1
Saltillo	184	1.9	147	2.1	37	1.4	4.0
San Luis Potosí	104	1.1	82	1.2	22	0.8	3.7
San Nicolás de los Garza	76	0.8	62	0.9	14	0.5	4.4
Tampico	75	0.8	48	0.7	27	1.0	1.8
Tapachula	53	0.6	46	0.7	7	0.3	6.6
Tecomán	41	0.4	37	0.5	4	0.2	9.3
Tehuacán	60	0.6	43	0.6	17	0.6	2.5
Tepic	27	0.3	16	0.2	11	0.4	1.5
Tijuana Guaycura	118	1.2	88	1.3	30	1.1	2.9
Tijuana Soler	124	1.3	85	1.2	39	1.5	2.2
Tlaquepaque	155	1.6	107	1.6	48	1.8	2.2
Tlaxcala	100	1.0	67	1.0	33	1.3	2.0
Toluca	139	1.5	105	1.5	34	1.3	3.1
Torreón Oriente	159	1.7	108	1.6	51	1.9	2.1
Tuxtla Gutiérrez	48	0.5	38	0.6	10	0.4	3.8
Villahermosa	48	0.5	42	0.6	6	0.2	7.0
Xalapa	95	1.0	65	0.9	30	1.1	2.2
Yucatán	51	0.5	31	0.4	20	0.8	1.6
Zacatecas	71	0.7	49	0.7	22	0.8	2.2
Zamora	50	0.5	40	0.6	10	0.4	4.0
Zapopan Norte	170	1.8	116	1.7	54	2.1	2.1
UH Cd. Juárez	11	0.1	6	0.1	5	0.2	1.2
UH Culiacán	9	0.1	9	0.1	0	0.0	---
UH Nuevo León	39	0.4	32	0.5	7	0.3	4.6
UH Punta Diamante	31	0.3	24	0.3	7	0.3	3.4
UH Tijuana	21	0.2	18	0.3	3	0.1	6.0
UH Zapopan	55	0.6	46	0.7	9	0.3	5.1
UH Zapotlán el Grande	15	0.2	15	0.2	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	13	0.1	10	0.1	3	0.1	3.3
UTUH Tijuana	3	0.0	3	0.0	0	0.0	---
Total	**9,528**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**2.6**

UH=Unidad de Hospitalización
UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Tabla 2. Principales motivos de consulta declarados

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	**%**	**Frec.**	**%**	**Frec.**	**%**
Consumo de drogas	7,554	79.3	5,755	83.4	1,799	68.4
Consumo de alcohol	2,479	26.0	1,920	27.8	559	21.3
Consumo de tabaco	1,934	20.3	1,464	21.2	470	17.9
Trastornos mentales y conductual del niño y el adolescente	375	3.9	264	3.8	111	4.2
Ludopatía	26	0.3	24	0.3	2	0.1
Depresión	2,304	24.2	1,311	19.0	993	37.8
Ansiedad	2,634	27.6	1,657	24.0	977	37.2
Psicosis	87	0.9	79	1.1	8	0.3
Epilepsia	12	0.1	9	0.1	3	0.1
Demencia	6	0.1	2	0.0	4	0.2
Autolesión no suicida	288	3.0	105	1.5	183	7.0
Suicidio (ideación o intento)	441	4.6	233	3.4	208	7.9
Otro motivo de consulta	185	1.9	131	1.9	54	2.1
2 o más motivos reportados	*4,559*	*47.8*	*3,171*	*46.0*	*1,388*	*52.8*

Tabla 3. Sexo

	Frec.	**%**	**Razón H:M**
Hombres	6,899	72.4	
Mujeres	2,629	27.6	**2.6 : 1**
Total	**9,528**	**100.0**	

Tabla 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	**%**	**Frec.**	**%**	**Frec.**	**%**
Hasta 9 años	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 a 14 años	724	7.6	467	6.8	257	9.8
15 a 19 años	3,464	36.4	2,510	36.4	954	36.3
20 a 24 años	1,410	14.8	1,009	14.6	401	15.3
25 a 29 años	1,130	11.9	840	12.2	290	11.0
30 a 34 años	895	9.4	627	9.1	268	10.2
35 a 39 años	633	6.6	482	7.0	151	5.7
40 a 44 años	456	4.8	339	4.9	117	4.5
45 años y más	815	8.6	624	9.0	191	7.3
Total	**9,528**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**2,629**	**100.0**
Media (DE)	25.4 (11.5) años		25.7 (11.6) años		24.7 (11.2) años	
Mediana	21 años		22 años		21 años	
Moda	17 años		17 años		16 años	
$Decil_1$	15 años		15 años		15 años	

DE= Desviación Estándar

Tabla 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**
Soltero	6,946	72.9	72.9	5,021	72.8	72.8	1,925	73.2	73.2
Casado	794	8.3	8.3	613	8.9	8.9	181	6.9	6.9
Unión libre	1,152	12.1	12.1	816	11.8	11.8	336	12.8	12.8
Separado	456	4.8	4.8	331	4.8	4.8	125	4.8	4.8
Divorciado	133	1.4	1.4	96	1.4	1.4	37	1.4	1.4
Viudo	46	0.5	0.5	22	0.3	0.3	24	0.9	0.9
Sin información	*1*	*0.0*	*Se omite*	*0*	*0.0*	*Se omite*	*1*	*0.0*	*Se omite*
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**

Tabla 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**
Sin estudios	35	0.4	0.4	24	0.3	0.3	11	0.4	0.4
Primaria no concluida	138	1.4	1.5	109	1.6	1.6	29	1.1	1.1
Primaria concluida	365	3.8	3.8	285	4.1	4.1	80	3.0	3.0
Secundaria no concluida	1,191	12.5	12.5	836	12.1	12.1	355	13.5	13.5
Secundaria concluida	1,743	18.3	18.3	1,298	18.8	18.8	445	16.9	16.9
Bachillerato no concluido	2,993	31.4	31.5	2,220	32.2	32.2	773	29.4	29.4
Bachillerato concluido	1,178	12.4	12.4	828	12.0	12.0	350	13.3	13.3
Estudios técnicos o comerciales no concluidos	91	1.0	1.0	68	1.0	1.0	23	0.9	0.9
Estudios técnicos o comerciales concluidos	138	1.4	1.5	94	1.4	1.4	44	1.7	1.7
Estudios superiores no concluidos	952	10.0	10.0	654	9.5	9.5	298	11.3	11.3
Estudios superiores concluidos	612	6.4	6.4	417	6.0	6.1	195	7.4	7.4
Estudios de posgrado no concluidos	32	0.3	0.3	22	0.3	0.3	10	0.4	0.4
Estudios de posgrado concluidos	48	0.5	0.5	34	0.5	0.5	14	0.5	0.5
Sin información	12	0.1	Se omite	10	0.1	Se omite	2	0.1	Se omite
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**

Tabla 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**
Desempleado(a)	1,614	16.9	17.1	1,252	18.1	18.3	362	13.8	13.9
Estudiante	3,049	32.0	32.3	2,037	29.5	29.8	1,012	38.5	38.8
Estudiante que trabaja	737	7.7	7.8	574	8.3	8.4	163	6.2	6.2
Trabaja	3,558	37.3	37.6	2,840	41.2	41.5	718	27.3	27.5
Tareas del hogar	427	4.5	4.5	81	1.2	1.2	346	13.2	13.3
Pensionado	68	0.7	0.7	59	0.9	0.9	9	0.3	0.3
Sin información	75	0.8	Se omite	56	0.8	Se omite	19	0.7	Se omite
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	6,899	100.0	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**

Tabla 8. Estrato social

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Alto	42	0.4	32	0.5	10	0.4
Medio alto	549	5.8	383	5.6	166	6.3
Medio bajo	5,237	55.0	3,804	55.1	1,433	54.5
Bajo	3,388	35.6	2,456	35.6	932	35.5
Muy bajo	312	3.3	224	3.2	88	3.3
Total	**9,528**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**2,629**	**100.0**

Tabla 9. Población en situación de vulnerabilidad

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Pertenece a la comunidad LGBTI	624	6.5	293	4.2	331	12.6
Se considera miembro de alguna comunidad indígena	85	0.9	65	0.9	20	0.8
Se considera miembro de alguna población afrodescendiente	15	0.2	14	0.2	1	0.0
Tiene alguna discapacidad	167	1.8	135	2.0	32	1.2
Ha migrado a otro país en los últimos 12 meses	87	0.9	69	1.0	18	0.7
Ha vivido en condición de migrante en Estados Unidos un año o más	171	1.8	145	2.1	26	1.0

Características del consumo de drogas en personas de primer ingreso a tratamiento en CIJ en el segundo semestre de 2024

Tabla 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones

	Sustancia	General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	422	4.4	5.0	266	3.9	4.2	156	5.9	7.3
	Nicotina en dispositivo electrónico	87	0.9	1.0	56	0.8	0.9	31	1.2	1.5
Alcohol	Bebidas fermentadas	704	7.4	8.3	538	7.8	8.5	166	6.3	7.8
	Bebidas destiladas	372	3.9	4.4	255	3.7	4.0	117	4.5	5.5
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	20	0.2	0.2	17	0.2	0.3	3	0.1	0.1
Cannabis	Mariguana “estándar”	2,178	22.9	25.7	1,727	25.0	27.2	451	17.2	21.2
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	133	1.4	1.6	109	1.6	1.7	24	0.9	1.1
	Hachís - Resina	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Hachís – Aceite o miel	24	0.3	0.3	19	0.3	0.3	5	0.2	0.2
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	15	0.2	0.2	14	0.2	0.2	1	0.0	0.0
	Medicamentos con compuestos cannábicos	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	138	1.4	1.6	114	1.7	1.8	24	0.9	1.1
	Pegamentos	29	0.3	0.3	26	0.4	0.4	3	0.1	0.1
	Esmaltes y pinturas	8	0.1	0.1	5	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Gasolinas y combustibles	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otros inhalables	42	0.4	0.5	35	0.5	0.6	7	0.3	0.3
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	480	5.0	5.7	386	5.6	6.1	94	3.6	4.4
	Crack	288	3.0	3.4	242	3.5	3.8	46	1.7	2.2
	Basuco (pasta base de cocaína)	8	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Otras presentaciones de cocaína	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	3,182	33.4	37.6	2,290	33.2	36.1	892	33.9	41.9
	Metanfetaminas: hielo	23	0.2	0.3	20	0.3	0.3	3	0.1	0.1
	Metanfetaminas: "Metas"	15	0.2	0.2	10	0.1	0.2	5	0.2	0.2
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	21	0.2	0.2	18	0.3	0.3	3	0.1	0.1
	Anorexígenos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	10	0.1	0.1	7	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Otros estimulantes	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0

Continúa

Tabla 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones
(Continuación)

	Sustancia	General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alucinógenos	LSD	26	0.3	0.3	19	0.3	0.3	7	0.3	0.3
	Hongos alucinógenos	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Peyote (mezcalina)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Floripondio	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Ayahuasca	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Ketamina	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	14	0.1	0.2	9	0.1	0.1	5	0.2	0.2
	Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras sustancias con efectos psicodélicos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Benzodiace-pinas	Benzodiacepinas	80	0.8	0.9	44	0.6	0.7	36	1.4	1.7
	Sedantes hipnóticos	10	0.1	0.1	6	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Otros depresores	Otros depresores del SNC	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Heroína	Heroína blanca	10	0.1	0.1	9	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Heroína negra o morena	18	0.2	0.2	15	0.2	0.2	3	0.1	0.1
Opioides	Opioides sintéticos	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Fentanilo y análogos	8	0.1	0.1	4	0.1	0.1	4	0.2	0.2
	Derivados opioides combinados con analgésicos	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Opiáceos	Opio	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticolinérgicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Anticonvulsivos	5	0.1	0.1	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Antidepresivos	9	0.1	0.1	3	0.0	0.0	6	0.2	0.3
	Antihistamínicos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	8	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	Anestésicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Sustancias sin especificar	5	0.1	0.1	4	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Ninguna		*1,060*	*11.1*	*Se omite*	*560*	*8.1*	*Se omite*	*500*	*19.0*	*Se omite*
Total		**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**

Tabla 11. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**
Hasta 9 años	185	1.9	2.7	145	2.1	2.9	40	1.5	2.2
10 a 14 años	2,970	31.2	43.3	2,236	32.4	44.4	734	27.9	40.2
15 a 19 años	3,116	32.7	45.4	2,264	32.8	44.9	852	32.4	46.7
20 a 24 años	395	4.1	5.8	258	3.7	5.1	137	5.2	7.5
25 a 29 años	102	1.1	1.5	70	1.0	1.4	32	1.2	1.8
30 a 34 años	54	0.6	0.8	35	0.5	0.7	19	0.7	1.0
35 a 39 años	20	0.2	0.3	17	0.2	0.3	3	0.1	0.2
40 a 44 años	8	0.1	0.1	3	0.0	0.1	5	0.2	0.3
45 años y más	11	0.1	0.2	9	0.1	0.2	2	0.1	0.1
No consumió	*2,666*	*28.0*	*Se omite*	*1,861*	*27.0*	*Se omite*	*805*	*30.6*	*Se omite*
Sin información	*1*	*0.0*	*Se omite*	*1*	*0.0*	*Se omite*	*0*	*0.0*	*Se omite*
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**
Media (DE)	15.2 (3.9) años			15.0 (3.9) años			15.5 (4.1) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
$Decil_1$	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 12. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**
Hasta 9 años	333	3.5	4.3	250	3.6	4.5	83	3.2	3.9
10 a 14 años	3,155	33.1	41.0	2,286	33.1	41.1	869	33.1	41.0
15 a 19 años	3,715	39.0	48.3	2,720	39.4	48.9	995	37.8	47.0
20 a 24 años	355	3.7	4.6	242	3.5	4.3	113	4.3	5.3
25 a 29 años	84	0.9	1.1	50	0.7	0.9	34	1.3	1.6
30 a 34 años	26	0.3	0.3	13	0.2	0.2	13	0.5	0.6
35 a 39 años	10	0.1	0.1	3	0.0	0.1	7	0.3	0.3
40 a 44 años	5	0.1	0.1	2	0.0	0.0	3	0.1	0.1
45 años y más	4	0.0	0.1	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	*1,834*	*19.2*	*Se omite*	*1,325*	*19.2*	*Se omite*	*509*	*19.4*	*Se omite*
Sin información	*7*	*0.1*	*Se omite*	*6*	*0.1*	*Se omite*	*1*	*0.0*	*Se omite*
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**
Media (DE)	14.9 (3.5) años			14.7 (3.3) años			15.2 (4.0) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
$Decil_1$	12 años			11 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 13. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**
Hasta 9 años	89	0.9	0.9	71	1.0	1.0	18	0.7	0.7
10 a 14 años	3,233	33.9	34.0	2,441	35.4	35.4	792	30.1	30.2
15 a 19 años	4,382	46.0	46.0	3,234	46.9	46.9	1,148	43.7	43.7
20 a 24 años	931	9.8	9.8	616	8.9	8.9	315	12.0	12.0
25 a 29 años	397	4.2	4.2	246	3.6	3.6	151	5.7	5.8
30 a 34 años	197	2.1	2.1	118	1.7	1.7	79	3.0	3.0
35 a 39 años	127	1.3	1.3	77	1.1	1.1	50	1.9	1.9
40 a 44 años	74	0.8	0.8	52	0.8	0.8	22	0.8	0.8
45 años y más	87	0.9	0.9	37	0.5	0.5	50	1.9	1.9
Sin información	*11*	*0.1*	*Se omite*	*7*	*0.1*	*Se omite*	*4*	*0.2*	*Se omite*
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**
Media (DE)	17.1 (6.2) años			16.7 (5.6) años			18.2 (7.5) años		
Mediana	15 años			15 años			16 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
$Decil_1$	12 años			12 años			13 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones

	Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	Mariguana “estándar”	6,011	63.1	4,441	64.4	1,570	59.7
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	202	2.1	159	2.3	43	1.6
	Hachís - Resina	6	0.1	5	0.1	1	0.0
	Hachís - Aceite o miel	31	0.3	23	0.3	8	0.3
Sus. asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	34	0.4	31	0.4	3	0.1
	Medicamentos con compuestos cannábicos	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Inhalables	Solventes y removedores	220	2.3	180	2.6	40	1.5
	Pegamentos	45	0.5	33	0.5	12	0.5
	Esmaltes y pinturas	16	0.2	14	0.2	2	0.1
	Gasolinas y combustibles	2	0.0	1	0.0	1	0.0
	Otros inhalables	62	0.7	44	0.6	18	0.7
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	800	8.4	608	8.8	192	7.3
	Crack	124	1.3	102	1.5	22	0.8
	Basuco (pasta base de cocaína)	6	0.1	6	0.1	0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	7	0.1	4	0.1	3	0.1
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	1,416	14.9	905	13.1	511	19.4
	Metanfetaminas: hielo	15	0.2	13	0.2	2	0.1
	Metanfetaminas: "Metas"	13	0.1	9	0.1	4	0.2
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	37	0.4	30	0.4	7	0.3
	Anorexígenos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
	Drogas de diseño con efecto estimulante	9	0.1	7	0.1	2	0.1
	Otros estimulantes	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Alucinógenos	LSD	37	0.4	25	0.4	12	0.5
	LSA	1	0.0	1	0.0	0	
	Hongos alucinógenos	12	0.1	8	0.1	4	0.2
	Peyote (mezcalina)	3	0.0	2	0.0	1	0.0
	Salvia divinorum u otras variedades de salvia	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Floripondio	1	0.0	0		1	0.0
	Ayahuasca	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	14	0.1	9	0.1	5	0.2
	DMT	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	Otras sustancias con efectos psicodélicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0

Continúa

Tabla 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones
(Continuación)

	Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	6	0.1	5	0.1	1	0.0
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	128	1.3	58	0.8	70	2.7
	Rohypnol	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	12	0.1	3	0.0	9	0.3
	Otros depresores del SNC	3	0.0	0	0.0	3	0.1
Heroína	Heroína blanca	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Heroína negra o morena	9	0.1	9	0.1	0	0.0
Opioides	Morfina (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opiáceos	Opioides sintéticos (uso fuera de prescripción)	3	0.0	2	0.0	1	0.0
	Fentanilo y análogos (uso fuera de prescripción)	3	0.0	1	0.0	2	0.1
	Derivados Opioides combinados con analgésicos Anticolinérgicos	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticonvulsivos	7	0.1	5	0.1	2	0.1
	Antidepresivos	12	0.1	5	0.1	7	0.3
	Antihistamínicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	13	0.1	2	0.0	11	0.4
Otras sustancias de abuso	Nitritos	6	0.1	6	0.1	0	0.0
	Anestésicos	2	0.0	0	0.0	2	0.1
	Bebidas energizantes	150	1.6	108	1.6	42	1.6
	Esteroides anabólicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Sustancias no clasificadas	5	0.1	2	0.0	3	0.1
	Sustancias sin especificar	7	0.1	4	0.1	3	0.1
Total		**9,528**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**2,629**	**100.0**

Tabla 15. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**
< de un año	248	2.6	3.6	166	2.4	3.3	82	3.1	4.5
1 a 5 años	2,836	29.8	41.3	2,023	29.3	40.2	813	30.9	44.6
6 a 10 años	1,173	12.3	17.1	868	12.6	17.2	305	11.6	16.7
11 a 15 años	826	8.7	12.0	628	9.1	12.5	198	7.5	10.9
16 a 20 años	562	5.9	8.2	415	6.0	8.2	147	5.6	8.1
21 a 25 años	447	4.7	6.5	341	4.9	6.8	106	4.0	5.8
26 o más años	769	8.1	11.2	596	8.6	11.8	173	6.6	9.5
No consumió	*2,666*	*28.0*	*Se omite*	*1,861*	*27.0*	*Se omite*	*805*	*30.6*	*Se omite*
Sin información	*1*	*0.0*	*Se omite*	*1*	*0.0*	*Se omite*	***0***	***0.0***	*Se omite*
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**
Media (DE)	10.7 (10.9) años			11.0 (11.0) años			9.9 (10.6) años		
Mediana	7 años			7 años			6 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
$Decil_1$	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Tabla 16. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**
< de un año	179	1.9	2.3	120	1.7	2.2	59	2.2	2.8
1 a 5 años	2,952	31.0	38.4	2,059	29.8	37.0	893	34.0	42.1
6 a 10 años	1,393	14.6	18.1	999	14.5	17.9	394	15.0	18.6
11 a 15 años	1,013	10.6	13.2	743	10.8	13.3	270	10.3	12.7
16 a 20 años	722	7.6	9.4	526	7.6	9.4	196	7.5	9.2
21 a 25 años	528	5.5	6.9	409	5.9	7.3	119	4.5	5.6
26 o más años	900	9.4	11.7	712	10.3	12.8	188	7.2	8.9
No consumió	*1,834*	*19.2*	*Se omite*	*1,325*	*19.2*	*Se omite*	*509*	*19.4*	*Se omite*
Sin información	*7*	*0.1*	*Se omite*	*6*	*0.1*	*Se omite*	*1*	*0.0*	*Se omite*
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**
Media (DE)	11.4 (10.8) años			11.9 (11.1) años			10.1 (9.9) años		
Mediana	8 años			8 años			7 años		
Moda	2 años			2 años			2 año		
$Decil_1$	1 año			1 años			1 año		

DE= Desviación Estándar

Tabla 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**
< de un año	746	7.8	7.8	486	7.0	7.1	260	9.9	9.9
1 a 5 años	4,508	47.3	47.4	3,104	45.0	45.0	1,404	53.4	53.5
6 a 10 años	1,543	16.2	16.2	1,136	16.5	16.5	407	15.5	15.5
11 a 15 años	1,001	10.5	10.5	760	11.0	11.0	241	9.2	9.2
16 a 20 años	562	5.9	5.9	442	6.4	6.4	120	4.6	4.6
21 a 25 años	468	4.9	4.9	376	5.5	5.5	92	3.5	3.5
26 o más años	689	7.2	7.2	588	8.5	8.5	101	3.8	3.8
Sin información	*11*	*0.1*	*Se omite*	*7*	*0.1*	*Se omite*	*4*	*0.2*	*Se omite*
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**
Media (DE)	8.3 (9.6) años			9.0 (10.0) años			6.5 (8.0) años		
Mediana	4 años			5 años			3 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
$Decil_1$	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Tabla 18. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**	**Frec.**	**%**	**% válido**
Experimental	1,169	12.3	12.4	769	11.1	11.3	400	15.2	15.4
Social u ocasional	1,417	14.9	15.0	915	13.3	13.4	502	19.1	19.3
Funcional	4,388	46.1	46.5	3,341	48.4	48.9	1,047	39.8	40.3
Disfuncional	1,712	18.0	18.1	1,311	19.0	19.2	401	15.3	15.4
En remisión	747	7.8	7.9	496	7.2	7.3	251	9.5	9.7
Sin información	*95*	*1.0*	*Se omite*	*67*	*1.0*	*Se omite*	*28*	*1.1*	*Se omite*
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**

Tabla 19. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (Incluye alcohol o tabaco)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	**%**	**Frec.**	**%**	**Frec.**	**%**
1 sustancia	818	8.6	547	7.9	271	10.3
2 sustancias	1,125	11.8	773	11.2	352	13.4
3 sustancias	2,075	21.8	1,436	20.8	639	24.3
4 sustancias	1,916	20.1	1,362	19.7	554	21.1
5 sustancias	1,400	14.7	1,044	15.1	356	13.5
6 sustancias	904	9.5	685	9.9	219	8.3
7 sustancias	543	5.7	436	6.3	107	4.1
8 sustancias	322	3.4	251	3.6	71	2.7
9 sustancias	180	1.9	156	2.3	24	0.9
10 sustancias	102	1.1	84	1.2	18	0.7
11-26 sustancias	143	1.5	125	1.8	18	0.7
Total	**9,528**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**2,629**	**100.0**
Media (DE)	4.2 (2.3) drogas		4.4 (2.3) drogas		3.9 (2.0) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
$Decil_1$	2 drogas		2 drogas		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Tabla 20. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (No incluye ni alcohol ni tabaco)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	**%**	**Frec.**	**%**	**Frec.**	**%**
1 sustancia	3,964	41.6	2,610	37.8	1,354	51.5
2 sustancias	2,330	24.5	1,715	24.9	615	23.4
3 sustancias	1,426	15.0	1,112	16.1	314	11.9
4 sustancias	836	8.8	654	9.5	182	6.9
5 sustancias	429	4.5	349	5.1	80	3.0
6 sustancias	234	2.5	191	2.8	43	1.6
7 sustancias	154	1.6	134	1.9	20	0.8
8 sustancias	74	0.8	62	0.9	12	0.5
9 sustancias	28	0.3	23	0.3	5	0.2
10 sustancias	17	0.2	15	0.2	2	0.1
11-22 sustancias	36	0.4	34	0.5	2	0.1
Total	**9,528**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**2,629**	**100.0**
Media (DE)	2.3 (1.7) drogas		2.5 (1.8) drogas		2.0 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
$Decil_1$	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	**6,862**	**72.0**	**5,038**	**73.0**	**1,824**	**69.4**
Tabaco	6,542	68.7	4,827	70.0	1,715	65.2
Nicotina en dispositivo electrónico	1,190	12.5	819	11.9	371	14.1
Alcohol	**7,694**	**80.8**	**5,574**	**80.8**	**2,120**	**80.6**
Bebidas fermentadas	6,280	65.9	4,638	67.2	1,642	62.5
Bebidas destiladas	3,695	38.8	2,563	37.2	1,132	43.1
Alcohol puro ("alcohol del 96")	168	1.8	132	1.9	36	1.4
Cannabis	**7,454**	**78.2**	**5,529**	**80.1**	**1,925**	**73.2**
Mariguana “estándar”	7,202	75.6	5,330	77.3	1,872	71.2
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	422	4.4	340	4.9	82	3.1
Hachís - Resina	83	0.9	75	1.1	8	0.3
Hachís - Aceite o miel	117	1.2	98	1.4	19	0.7
Sustancias similares al cannabis	**88**	**0.9**	**67**	**1.0**	**21**	**0.8**
“Mariguana" sintética	61	0.6	52	0.8	9	0.3
Medicamentos con compuestos cannábicos	27	0.3	15	0.2	12	0.5
Inhalables	**1,253**	**13.2**	**1,041**	**15.1**	**212**	**8.1**
Solventes y removedores	750	7.9	622	9.0	128	4.9
Pegamentos	252	2.6	216	3.1	36	1.4
Esmaltes y pinturas	113	1.2	93	1.3	20	0.8
Gasolinas y combustibles	15	0.2	13	0.2	2	0.1
Otros inhalables	243	2.6	198	2.9	45	1.7
Cocaína	**3,748**	**39.3**	**2,951**	**42.8**	**797**	**30.3**
Cocaína (clorhidrato)	3,384	35.5	2,648	38.4	736	28.0
Crack	935	9.8	789	11.4	146	5.6
Otro tipo de cocaína	110	1.2	83	1.2	27	1.0
Basuco (pasta base de cocaína)	54	0.6	46	0.7	8	0.3
Otras presentaciones de cocaína	56	0.6	37	0.5	19	0.7
Metanfetaminas	**4,661**	**48.9**	**3,456**	**50.1**	**1,205**	**45.8**
Metanfetaminas: cristal	4,578	48.0	3,397	49.2	1,181	44.9
Metanfetaminas: hielo	59	0.6	46	0.7	13	0.5
Metanfetaminas: "Metas"	137	1.4	102	1.5	35	1.3
Otros estimulantes del SNC	**190**	**2.0**	**152**	**2.2**	**38**	**1.4**
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	117	1.2	91	1.3	26	1.0
Anorexígenos	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Drogas de diseño con efectos estimulantes	37	0.4	30	0.4	7	0.3
Otros estimulantes	33	0.3	29	0.4	4	0.2

Continúa

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	**236**	**2.5**	**185**	**2.7**	**51**	**1.9**
Éxtasis (MDMA)	220	2.3	174	2.5	46	1.7
Sustancias con efectos similares a MDMA	20	0.2	15	0.2	5	0.2
Drogas de diseño con efectos similares	18	0.2	14	0.2	4	0.2
Piperazinas con efectos similares	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Aminoindanos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	**835**	**8.8**	**629**	**9.1**	**206**	**7.8**
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	815	8.6	611	8.9	204	7.8
Rohypnol	27	0.3	24	0.3	3	0.1
Otros depresores del SNC	**95**	**1.0**	**73**	**1.1**	**22**	**0.8**
GHB o similares	15	0.2	14	0.2	1	0.0
Sedantes hipnóticos	54	0.6	39	0.6	15	0.6
Otros depresores del SNC	26	0.3	20	0.3	6	0.2
Alucinógenos	**1,248**	**13.1**	**966**	**14.0**	**282**	**10.7**
LSD /LSA	957	10.0	742	10.8	215	8.2
LSD	953	10.0	740	10.7	213	8.1
LSA	8	0.1	6	0.1	2	0.1
Plantas alucinógenas o disociativas	**420**	**4.4**	**333**	**4.8**	**87**	**3.3**
Hongos alucinógenos	310	3.3	241	3.5	69	2.6
Peyote (mezcalina)	105	1.1	91	1.3	14	0.5
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	29	0.3	26	0.4	3	0.1
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	11	0.1	9	0.1	2	0.1
Ayahuasca	34	0.4	23	0.3	11	0.4
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	12	0.1	11	0.2	1	0.0
Alucinógenos sintéticos	**230**	**2.4**	**180**	**2.6**	**50**	**1.9**
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Análogos del PCP	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Ketamina	24	0.3	24	0.3	0	0.0
Dextrometorfano	159	1.7	126	1.8	33	1.3
DMT	46	0.5	33	0.5	13	0.5
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Grupo 2C x	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	10	0.1	8	0.1	2	0.1
Otras sustancias con efectos psicodélicos	8	0.1	6	0.1	2	0.1

Continúa

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	**106**	**1.1**	**92**	**1.3**	**14**	**0.5**
Heroína blanca	41	0.4	35	0.5	6	0.2
Heroína negra o morena	68	0.7	59	0.9	9	0.3
Opioides (uso fuera de prescripción)	**116**	**1.2**	**83**	**1.2**	**33**	**1.3**
Oxicodona	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Opioides sintéticos	36	0.4	29	0.4	7	0.3
Fentanilo y análogos	59	0.6	42	0.6	17	0.6
Derivados opioides combinados con analgésicos	20	0.2	12	0.2	8	0.3
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	**31**	**0.3**	**26**	**0.4**	**5**	**0.2**
Opio	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	13	0.1	9	0.1	4	0.2
Codeína (uso fuera de prescripción)	16	0.2	16	0.2	0	0.0
Sustancias de uso médico	**180**	**1.9**	**125**	**1.8**	**55**	**2.1**
Anticolinérgicos	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Antiespasmódicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiparkinsónicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	17	0.2	15	0.2	2	0.1
Antidepresivos	96	1.0	66	1.0	30	1.1
Antipsicóticos o neurolépticos	9	0.1	5	0.1	4	0.2
Antihistamínicos	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	54	0.6	36	0.5	18	0.7
Otras sustancias de abuso	**309**	**3.2**	**240**	**3.5**	**69**	**2.6**
Nitritos	34	0.4	29	0.4	5	0.2
Anestésicos	6	0.1	2	0.0	4	0.2
Bebidas energizantes	235	2.5	185	2.7	50	1.9
Drogas o bebidas inteligentes	6	0.1	6	0.1	0	0.0
Esteroides anabólicos	17	0.2	12	0.2	5	0.2
Sustancias no clasificadas	19	0.2	14	0.2	5	0.2
Sustancias sin especificar	68	0.7	59	0.9	9	0.3

Tabla 22. Total de drogas consumidas en el último año (Incluye alcohol o tabaco)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	**%**	**Frec.**	**%**	**Frec.**	**%**
Ninguna	229	2.4	123	1.8	106	4.0
1 sustancia	1,539	16.2	1,014	14.7	525	20.0
2 sustancias	2,123	22.3	1,478	21.4	645	24.5
3 sustancias	2,391	25.1	1,802	26.1	589	22.4
4 sustancias	1,609	16.9	1,223	17.7	386	14.7
5 sustancias	836	8.8	650	9.4	186	7.1
6 sustancias	424	4.5	313	4.5	111	4.2
7 sustancias	207	2.2	165	2.4	42	1.6
8 sustancias	88	0.9	65	0.9	23	0.9
9 sustancias	38	0.4	30	0.4	8	0.3
10 sustancias	20	0.2	16	0.2	4	0.2
11-18 sustancias	24	0.3	20	0.3	4	0.2
Total	**9,528**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**2,629**	**100.0**
Media (DE)	3.1 (1.8) drogas		3.2 (1.8) drogas		2.8 (1.7) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		2 drogas	
$Decil_1$	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Tabla 23. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (No incluye ni alcohol ni tabaco)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	**%**	**Frec.**	**%**	**Frec.**	**%**
Ninguna	1,396	14.7	840	12.2	556	21.1
1 sustancia	4,447	46.7	3,192	46.3	1,255	47.7
2 sustancias	2,200	23.1	1,734	25.1	466	17.7
3 sustancias	881	9.2	660	9.6	221	8.4
4 sustancias	344	3.6	276	4.0	68	2.6
5 sustancias	142	1.5	104	1.5	38	1.4
6 sustancias	68	0.7	53	0.8	15	0.6
7 sustancias	28	0.3	23	0.3	5	0.2
8 sustancias	12	0.1	9	0.1	3	0.1
9 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0 0
10 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11-14 sustancias	5	0.1	3	0.0	2	0.1
Total	**9,528**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**2,629**	**100.0**
Media (DE)	1.5 (1.2) drogas		1.6 (1.2) drogas		1.3 (1.2) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
$Decil_1$	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	**5,684**	**59.7**	**4,255**	**61.7**	**1,429**	**54.4**
Tabaco	5,322	55.9	4,013	58.2	1,309	49.8
Nicotina en dispositivo electrónico	913	9.6	636	9.2	277	10.5
Alcohol	**6,740**	**70.7**	**4,908**	**71.1**	**1,832**	**69.7**
Bebidas fermentadas	5,384	56.5	4,038	58.5	1,346	51.2
Bebidas destiladas	2,975	31.2	2,060	29.9	915	34.8
Alcohol puro ("alcohol del 96")	135	1.4	103	1.5	32	1.2
Cannabis	**5,276**	**55.4**	**4,027**	**58.4**	**1,249**	**47.5**
Mariguana “estándar”	5,047	53.0	3,844	55.7	1,203	45.8
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	341	3.6	283	4.1	58	2.2
Hachís - Resina	32	0.3	27	0.4	5	0.2
Hachís - Aceite o miel	91	1.0	74	1.1	17	0.6
Sustancias similares al cannabis	**65**	**0.7**	**48**	**0.7**	**17**	**0.6**
“Mariguana" sintética	44	0.5	37	0.5	7	0.3
Medicamentos con compuestos cannábicos	21	0.2	11	0.2	10	0.4
Inhalables	**613**	**6.4**	**497**	**7.2**	**116**	**4.4**
Solventes y removedores	388	4.1	309	4.5	79	3.0
Pegamentos	90	0.9	77	1.1	13	0.5
Esmaltes y pinturas	33	0.3	24	0.3	9	0.3
Gasolinas y combustibles	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Otros inhalables	120	1.3	100	1.4	20	0.8
Cocaína	**2,152**	**22.6**	**1,671**	**24.2**	**481**	**18.3**
Cocaína (clorhidrato)	1,806	19.0	1,388	20.1	418	15.9
Crack	493	5.2	407	5.9	86	3.3
Otro tipo de cocaína	60	0.6	40	0.6	20	0.8
Basuco (pasta base de cocaína)	20	0.2	16	0.2	4	0.2
Otras presentaciones de cocaína	40	0.4	24	0.3	16	0.6
Metanfetaminas	**3,932**	**41.3**	**2,895**	**42.0**	**1,037**	**39.4**
Metanfetaminas: cristal	3,884	40.8	2,858	41.4	1,026	39.0
Metanfetaminas: hielo	39	0.4	31	0.4	8	0.3
Metanfetaminas: "Metas"	53	0.6	36	0.5	17	0.6
Otros estimulantes del SNC	**105**	**1.1**	**82**	**1.2**	**23**	**0.9**
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	65	0.7	51	0.7	14	0.5
Anorexígenos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Drogas de diseño con efectos estimulantes	19	0.2	12	0.2	7	0.3
Otros estimulantes	18	0.2	16	0.2	2	0.1

Continúa

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	**77**	**0.8**	**55**	**0.8**	**22**	**0.8**
Éxtasis (MDMA)	71	0.7	51	0.7	20	0.8
Sustancias con efectos similares a MDMA	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Drogas de diseño con efectos similares	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Piperazinas con efectos similares	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	**468**	**4.9**	**334**	**4.8**	**134**	**5.1**
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	463	4.9	330	4.8	133	5.1
Rohypnol	6	0.1	4	0.1	2	0.1
Otros depresores del SNC	**50**	**0.5**	**38**	**0.6**	**12**	**0.5**
GHB o similares	9	0.1	9	0.1	0	0.0
Sedantes hipnóticos	25	0.3	18	0.3	7	0.3
Otros depresores del SNC	16	0.2	11	0.2	5	0.2
Alucinógenos	**550**	**5.8**	**402**	**5.8**	**148**	**5.6**
LSD /LSA	376	3.9	270	3.9	106	4.0
LSD	374	3.9	269	3.9	105	4.0
LSA	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	125	1.3	94	1.4	31	1.2
Hongos alucinógenos	103	1.1	78	1.1	25	1.0
Peyote (mezcalina)	13	0.1	11	0.2	2	0.1
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Ayahuasca	7	0.1	4	0.1	3	0.1
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Alucinógenos sintéticos	117	1.2	87	1.3	30	1.1
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Ketamina	10	0.1	10	0.1	0	0.0
Dextrometorfano	97	1.0	72	1.0	25	1.0
DMT	7	0.1	3	0.0	4	0.2
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Grupo 2C x	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	5	0.1	3	0.0	2	0.1
Otras sustancias con efectos psicodélicos	5	0.1	3	0.0	2	0.1

Continúa

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	**51**	**0.5**	**43**	**0.6**	**8**	**0.3**
Heroína blanca	19	0.2	16	0.2	3	0.1
Heroína negra o morena	32	0.3	27	0.4	5	0.2
Opioides (uso fuera de prescripción)	**78**	**0.8**	**53**	**0.8**	**25**	**1.0**
Oxicodona	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	26	0.3	19	0.3	7	0.3
Fentanilo y análogos	33	0.3	22	0.3	11	0.4
Derivados opioides combinados con analgésicos	18	0.2	11	0.2	7	0.3
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	**13**	**0.1**	**12**	**0.2**	**1**	**0.0**
Opio	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Codeína (uso fuera de prescripción)	5	0.1	5	0.1	0	0.0
Sustancias de uso médico	**112**	**1.2**	**72**	**1.0**	**40**	**1.5**
Anticolinérgicos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Antiespasmódicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiparkinsónicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	10	0.1	9	0.1	1	0.0
Antidepresivos	55	0.6	33	0.5	22	0.8
Antipsicóticos o neurolépticos	8	0.1	4	0.1	4	0.2
Antihistamínicos	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	35	0.4	24	0.3	11	0.4
Otras sustancias de abuso	**234**	**2.5**	**187**	**2.7**	**47**	**1.8**
Nitritos	24	0.3	20	0.3	4	0.2
Anestésicos	3	0.0	0	0.0	3	0.1
Bebidas energizantes	181	1.9	146	2.1	35	1.3
Drogas o bebidas inteligentes	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	5	0.1	5	0.1	0	0.0
Sustancias no clasificadas	10	0.1	7	0.1	3	0.1
Sustancias sin especificar	13	0.1	11	0.2	2	0.1

Tabla 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

	Sustancia	General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	898	9.4	10.8	616	8.9	9.9	282	10.7	13.3
	Nicotina en dispositivo electrónico	141	1.5	1.7	96	1.4	1.5	45	1.7	2.1
Alcohol	Bebidas fermentadas	960	10.1	11.5	740	10.7	11.9	220	8.4	10.4
	Bebidas destiladas	462	4.8	5.5	303	4.4	4.9	159	6.0	7.5
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	25	0.3	0.3	22	0.3	0.4	3	0.1	0.1
Cannabis	Mariguana “estándar”	2,482	26.0	29.7	1,990	28.8	31.9	492	18.7	23.3
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	126	1.3	1.5	108	1.6	1.7	18	0.7	0.9
	Hachís - Resina	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Hachís – Aceite o miel	13	0.1	0.2	11	0.2	0.2	2	0.1	0.1
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	15	0.2	0.2	14	0.2	0.2	1	0.0	0.0
	Medicamentos con compuestos cannábicos	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	94	1.0	1.1	84	1.2	1.3	10	0.4	0.5
	Pegamentos	22	0.2	0.3	18	0.3	0.3	4	0.2	0.2
	Esmaltes y pinturas	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Gasolinas y combustibles	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otros inhalables	30	0.3	0.4	24	0.3	0.4	6	0.2	0.3
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	342	3.6	4.1	277	4.0	4.4	65	2.5	3.1
	Crack	200	2.1	2.4	171	2.5	2.7	29	1.1	1.4
	Basuco (pasta base de cocaína)	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Otras presentaciones de cocaína	10	0.1	0.1	6	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	2,272	23.8	27.2	1,587	23.0	25.5	685	26.1	32.4
	Metanfetaminas: hielo	17	0.2	0.2	16	0.2	0.3	1	0.0	0.0
	Metanfetaminas: "Metas"	10	0.1	0.1	7	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	14	0.1	0.2	12	0.2	0.2	2	0.1	0.1
	Anorexígenos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	8	0.1	0.1	5	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Otros estimulantes	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0

Continúa

Tabla 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

(Continuación)

	Sustancia	General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	válido	Frec.	%	válido	Frec.	%	válido
Alucinógenos	LSD	10	0.1	0.1	5	0.1	0.1	5	0.2	0.2
	Hongos alucinógenos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Ayahuasca	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Dextrometorfano	9	0.1	0.1	5	0.1	0.1	4	0.2	0.2
	Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras sustancias con efectos psicodélicos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	4	0.0	0.0	4	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Benzodiace-pinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	55	0.6	0.7	25	0.4	0.4	30	1.1	1.4
	Rohypnol	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Otros depresores	Otros depresores del SNC	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Heroína	Heroína blanca	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Heroína negra o morena	20	0.2	0.2	18	0.3	0.3	2	0.1	0.1
Opioides	Opioides sintéticos	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Fentanilo y análogos	5	0.1	0.1	2	0.0	0.0	3	0.1	0.1
	Derivados opioides combinados con analgésicos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticolinérgicos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Anticonvulsivos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Antidepresivos	5	0.1	0.1	2	0.0	0.0	3	0.1	0.1
	Antihistamínicos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	6	0.1	0.1	3	0.0	0.0	3	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	Nitritos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	22	0.2	0.3	14	0.2	0.2	8	0.3	0.4
	Sustancias no clasificadas	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Sustancias sin especificar	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Ninguna		*899*	*9.4*	*0.0*	*510*	*7.4*	*0.0*	*389*	*14.8*	*0.0*
No aplica (Sin consumo en los últimos 12 meses)		*229*	*2.4*	*0.0*	*123*	*1.8*	*0.0*	*106*	*4.0*	*0.0*
Sin información		*57*	*0.6*	*0.0*	*37*	*0.5*	*0.0*	*20*	*0.8*	*0.0*
Total		**9,528**	**100.0**	**0.0**	**6,899**	**100.0**	**0.0**	**2,629**	**100.0**	**0.0**

Tabla 26. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (No incluye tabaco)

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**válido**	**Frec.**	**%**	**válido**	**Frec.**	**%**	**válido**
Si combinó drogas	3,889	40.8	59.9	3,039	44.0	61.9	850	32.3	53.4
No combinó drogas	2,608	27.4	40.1	1,867	27.1	38.1	741	28.2	46.6
No aplica	*3,031*	*31.8*	*Se omite*	*1,993*	*28.9*	*Se omite*	*1,038*	*39.5*	*Se omite*
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**

Tabla 27. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (Incluye alcohol o tabaco)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	**%**	**Frec.**	**%**	**Frec.**	**%**
Ninguna	1,552	16.3	927	13.4	625	23.8
1 sustancia	2,738	28.7	1,885	27.3	853	32.4
2 sustancias	2,283	24.0	1,731	25.1	552	21.0
3 sustancias	1,711	18.0	1,364	19.8	347	13.2
4 sustancias	811	8.5	645	9.3	166	6.3
5 sustancias	280	2.9	229	3.3	51	1.9
6 sustancias	100	1.0	74	1.1	26	1.0
7 sustancias	36	0.4	30	0.4	6	0.2
8 sustancias	12	0.1	10	0.1	2	0.1
9 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Total	**9,528**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**2,629**	**100.0**
Media (DE)	1.9 (1.4) drogas		2.0 (1.4) drogas		1.6 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		1 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
$Decil_1$	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

Tabla 28. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (No incluye ni alcohol ni tabaco)

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	**%**	**Frec.**	**%**	**Frec.**	**%**
Ninguna	3,766	39.5	2,434	35.3	1,332	50.7
1 sustancia	4,054	42.5	3,078	44.6	976	37.1
2 sustancias	1,275	13.4	1,046	15.2	229	8.7
3 sustancias	318	3.3	256	3.7	62	2.4
4 sustancias	79	0.8	58	0.8	21	0.8
5 sustancias	27	0.3	22	0.3	5	0.2
6 sustancias	7	0.1	4	0.1	3	0.1
7 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Total	**9,528**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**2,629**	**100.0**
Media (DE)	0.8 (0.9) drogas		0.9 (0.9) drogas		0.7 (0.9) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		0 drogaS	
Moda	1 droga		1 droga		0 drogas	
$Decil_1$	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar

Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	**4,516**	**47.4**	**3,477**	**50.4**	**1,039**	**39.5**
Tabaco	4,251	44.6	3,293	47.7	958	36.4
Nicotina en dispositivo electrónico	536	5.6	386	5.6	150	5.7
Alcohol	**4,424**	**46.4**	**3,328**	**48.2**	**1,096**	**41.7**
Bebidas fermentadas	3,519	36.9	2,724	39.5	795	30.2
Bebidas destiladas	1,627	17.1	1,154	16.7	473	18.0
Alcohol puro ("alcohol del 96")	79	0.8	68	1.0	11	0.4
Cannabis	**3,359**	**35.3**	**2,698**	**39.1**	**661**	**25.1**
Mariguana “estándar”	3,200	33.6	2,568	37.2	632	24.0
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	208	2.2	177	2.6	31	1.2
Hachís - Resina	11	0.1	10	0.1	1	0.0
Hachís - Aceite o miel	38	0.4	32	0.5	6	0.2
Sustancias similares al cannabis	**36**	**0.4**	**31**	**0.4**	**5**	**0.2**
“Mariguana" sintética	31	0.3	28	0.4	3	0.1
Medicamentos con compuestos cannábicos	5	0.1	3	0.0	2	0.1
Inhalables	**315**	**3.3**	**259**	**3.8**	**56**	**2.1**
Solventes y removedores	198	2.1	161	2.3	37	1.4
Pegamentos	42	0.4	37	0.5	5	0.2
Esmaltes y pinturas	11	0.1	7	0.1	4	0.2
Gasolinas y combustibles	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otros inhalables	65	0.7	54	0.8	11	0.4
Cocaína	**1,052**	**11.0**	**848**	**12.3**	**204**	**7.8**
Cocaína (clorhidrato)	802	8.4	634	9.2	168	6.4
Crack	286	3.0	245	3.6	41	1.6
Otro tipo de cocaína	26	0.3	16	0.2	10	0.4
Basuco (pasta base de cocaína)	11	0.1	8	0.1	3	0.1
Otras presentaciones de cocaína	15	0.2	8	0.1	7	0.3
Metanfetaminas	**2,399**	**25.2**	**1,801**	**26.1**	**598**	**22.7**
Metanfetaminas: cristal	2,371	24.9	1,779	25.8	592	22.5
Metanfetaminas: hielo	18	0.2	15	0.2	3	0.1
Metanfetaminas: "Metas"	21	0.2	14	0.2	7	0.3
Otros estimulantes del SNC	**38**	**0.4**	**32**	**0.5**	**6**	**0.2**
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	27	0.3	23	0.3	4	0.2
Anorexígenos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Drogas de diseño con efectos estimulantes	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Otros estimulantes	4	0.0	4	0.1	0	0.0

Continúa

Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	**16**	**0.2**	**11**	**0.2**	**5**	**0.2**
Éxtasis (MDMA)	14	0.1	10	0.1	4	0.2
Sustancias con efectos similares a MDMA	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Drogas de diseño con efectos similares	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Piperazinas con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	**234**	**2.5**	**157**	**2.3**	**77**	**2.9**
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	229	2.4	153	2.2	76	2.9
Rohypnol	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Otros depresores del SNC	**26**	**0.3**	**16**	**0.2**	**10**	**0.4**
GHB o similares	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Sedantes hipnóticos	16	0.2	11	0.2	5	0.2
Otros depresores del SNC	7	0.1	2	0.0	5	0.2
Alucinógenos	**132**	**1.4**	**96**	**1.4**	**36**	**1.4**
LSD /LSA	79	0.8	54	0.8	25	1.0
LSD	79	0.8	54	0.8	25	1.0
LSA	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	21	0.2	18	0.3	3	0.1
Hongos alucinógenos	11	0.1	9	0.1	2	0.1
Peyote (mezcalina)	5	0.1	5	0.1	0	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Ayahuasca	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Alucinógenos sintéticos	36	0.4	25	0.4	11	0.4
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Dextrometorfano	33	0.3	22	0.3	11	0.4
DMT	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0

Continúa

Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	30	0.3	25	0.4	5	0.2
Heroína blanca	10	0.1	8	0.1	2	0.1
Heroína negra o morena	20	0.2	17	0.2	3	0.1
Opioides (uso fuera de prescripción)	39	0.4	24	0.3	15	0.6
Oxicodona	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	15	0.2	11	0.2	4	0.2
Fentanilo y análogos	15	0.2	9	0.1	6	0.2
Derivados opioides combinados con analgésicos	9	0.1	4	0.1	5	0.2
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Opio	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sustancias de uso médico	66	0.7	41	0.6	25	1.0
Anticolinérgicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Antiespasmódicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiparkinsónicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Antidepresivos	32	0.3	16	0.2	16	0.6
Antipsicóticos o neurolépticos	4	0.0	1	0.0	3	0.1
Antihistamínicos	5	0.1	4	0.1	1	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	16	0.2	11	0.2	5	0.2
Otras sustancias de abuso	138	1.4	118	1.7	20	0.8
Nitritos	10	0.1	9	0.1	1	0.0
Anestésicos	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Bebidas energizantes	118	1.2	102	1.5	16	0.6
Drogas o bebidas inteligentes	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	6	0.1	4	0.1	2	0.1
Sustancias sin especificar	2	0.0	2	0.0	0	0.0

Tabla 30. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol[1] en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**válido**	**Frec.**	**%**	**válido**	**Frec.**	**%**	**válido**
Sin consumo abusivo	662	6.9	17.1	454	6.6	15.4	208	7.9	22.5
< de 1 vez a la semana	1,433	15.0	36.9	1,055	15.3	35.7	378	14.4	40.9
1 o 2 veces a la semana	1,073	11.3	27.7	876	12.7	29.6	197	7.5	21.3
Cada tercer día	304	3.2	7.8	239	3.5	8.1	65	2.5	7.0
Diario	407	4.3	10.5	331	4.8	11.2	76	2.9	8.2
No consumió en los últimos 30 días	*5,104*	*53.6*	*Se omite*	*3,571*	*51.8*	*Se omite*	*1,533*	*58.3*	*Se omite*
Sin información	*545*	*5.7*	*Se omite*	*373*	*5.4*	*Se omite*	*172*	*6.5*	*Se omite*
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**

[1] Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Tabla 31. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas[1] en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	**%**	**válido**	**Frec.**	**%**	**válido**	**Frec.**	**%**	**válido**
< de 1 vez a la semana	1,643	17.2	30.5	1,227	17.8	29.4	416	15.8	34.4
1 o 2 veces a la semana	1,183	12.4	22.0	922	13.4	22.1	261	9.9	21.6
Cada tercer día	759	8.0	14.1	614	8.9	14.7	145	5.5	12.0
Diario	1,797	18.9	33.4	1,410	20.4	33.8	387	14.7	32.0
No consumió en los últimos 30 días	*3,766*	*39.5*	*Se omite*	*2,434*	*35.3*	*Se omite*	*1,332*	*50.7*	*Se omite*
Sin información	*380*	*4.0*	*Se omite*	*292*	*4.2*	*Se omite*	*88*	*3.3*	*Se omite*
Total	**9,528**	**100.0**	**100.0**	**6,899**	**100.0**	**100.0**	**2,629**	**100.0**	**100.0**

[1] Consumo de cualquier dosis.

Tabla 32. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	**%**	**Frec.**	**%**	**Frec.**	**%**
Problemas de salud	4,699	49.3	3,462	50.2	1,237	47.1
Problemas familiares	7,376	77.4	5,544	80.4	1,832	69.7
Accidentes o lesiones	2,180	22.9	1,695	24.6	485	18.4
Problemas escolares	3,794	39.8	2,805	40.7	989	37.6
Problemas laborales	2,979	31.3	2,508	36.4	471	17.9
Problemas psicológicos	6,057	63.6	4,455	64.6	1,602	60.9
Problemas legales	1,872	19.6	1,547	22.4	325	12.4
Conducta antisocial o delictiva	1,951	20.5	1,562	22.6	389	14.8
Otros problemas	1,412	14.8	1,043	15.1	369	14.0
Ningún problema asociado reportado	*947*	*9.9*	*512*	*7.4*	*435*	*16.5*
Personas que reportaron dos o más problemas asociados	*7,633*	*80.1*	*5,713*	*82.8*	*1,920*	*73.0*

GLOSARIO

Decil	En estadística descriptiva, es cualquiera de los nueve valores que dividen a un grupo de datos ordenados en diez partes iguales, de manera que cada parte representa 1/10 de la muestra o población.
Droga ilícita de inicio	Es la primera sustancia ilegal que la persona refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto	Sustancia por la que acuden a tratamiento las personas.
Droga de preferencia	Sustancia que la persona solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el profesional de la salud, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Nuevas sustancias de abuso o de uso poco común	Sustancias psicoactivas que han sido conocidas en el mercado por términos tales como “drogas de diseño”, “euforizantes legales”, “hierbas euforizantes”, “sales de baño”, “productos químicos de investigación” y “reactivos de laboratorio” y que no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública. El término “nuevas” no se refiere necesariamente a nuevas invenciones, sino que son sustancias que han aparecido recientemente en el mercado o que su consumo ha cobrado relevancia en los últimos años.
Otras condiciones de salud mental	De acuerdo con la indagación de las personas profesionales de la salud, las personas pueden solicitar atención por otros trastornos mentales y del comportamiento o condiciones asociadas a estos, como son: trastornos mentales y conductual del niño y el adolescente, depresión, ansiedad, psicosis, demencia, epilepsia, ludopatía, autolesiones, ideación o intento suicida (suicidio) u otro motivo de consulta.
Población en situación de vulnerabilidad	De acuerdo con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2025), dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran los pueblos indígenas; la población afrodescendiente; las personas con discapacidad; las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ y personas migrantes. Señalan que las personas que pertenecen a estos grupos poblacionales suelen sufrir desigualdades entrecruzadas.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el consumo de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 82 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.