



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.

REPORTE DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CONSUMO DE DROGAS

CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL.

USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS

PRIMER SEMESTRE DE 2025

Dirección de Investigación y Enseñanza

Subdirección de Investigación

México, septiembre de 2025

Reporte técnico 25-2a





Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Usuarios de drogas ilícitas. Primer semestre de 2025.

Cita sugerida:

Centros de Integración Juvenil, A.C. (2025). Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Usuarios de drogas Ilícitas. Primer semestre del 2025. Ciudad de México, México: CIJ.

Disponible en: <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/Epidemiologica.asp>

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Dra. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR OPERATIVO Y DE PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR NORMATIVO

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Rodrigo Alonzo Marín Navarrete



CRÉDITOS

Elaboración de informe

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Mtra. Karina Jiménez Silvestre

Mtro. Omar Leonardo Ruiz Orona

Diseño

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Procesamiento estadístico

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Supervisión

Dr. Rodrigo Alonzo Marín Navarrete

Mtro. José Nahum Rangel Villafaña

AGRADECIMIENTO

El Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica agradece los continuos esfuerzos del equipo médico-técnico y de los voluntarios responsables de recopilar y reportar los datos de los solicitantes de tratamiento en el Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0, a través del formato de entrevista inicial.

Acapulco: Imelda González Espinobarros, Lorena Salinas Acevedo, María de Lourdes Barrientos Solís, Miriam Galeana Valente, Salvio Vargas Ramírez; **Acuña:** Adolfo Edel González Pérez, Yurieth Daniela Lira Ortiz; **Aguascalientes:** Baciliza Castañeda Briones, Gabriel Flores Loredó, Mario Jesús García Martínez, Martín de Jesús Paredes García, Norma Araceli Terán Reyes, Octavio Israel Rangel Rodríguez, Rodrigo Martínez Odgers, Sandra Gaytan Delgado; **Álvaro Obregón Centro:** Alejandra Arias Mejía, Clemente García Rojas, Gloria Islas Rodríguez, Jocelyn Sarasuadi Reyes Martínez, María del Carmen López Jaimes, Ricardo Fajardo Ortiz, Silvia María Canul Sánchez; **Álvaro Obregón Oriente:** Agnelly Guadalupe Contreras Ávila, Ana Laura Guzmán López, Bryan Antonio Carrillo Lazcano, Irving Alain Aguilar Cuata, Karla Magdalena Vargas Pisaña, Miguel Ángel Corona Dorantes, Sara Elisa Gracia Gutiérrez de Velasco; **Apatzingán:** Claudia Elizabeth Rangel Bastida, Ismael Hernández Juárez, Jennifer Guadalupe Fernández Medina; **Apodaca:** Claudia Maribel Cantú Jiménez, Fernando Cuevas Rivera, Rosio Ibarra Contreras; **Atizapán:** Antonio Isaac Olguín Rubio, Leticia Baza Cruz, Viridiana Ramírez Martínez, Yadira Jiménez García; **Azcapotzalco:** Beatriz González Pérez, Cristhian Dávila Quinto, José Luis Castillo Fontés, Juan Francisco Ramírez Estrada, Leonor Quecholac García, Xóchitl Nava Martínez, Yezmín Estrella Briseño Pérez; **Benito Juárez:** Alma Alicia García Alcaraz, César Mendoza Vázquez, Edith Ledesma Martínez, Leticia Casimiro García, Luz Gabriela Olmos Velázquez, Martha Patricia Alvarado Tello, Néstor Leopoldo Soto Pueyo; **Cancún:** Alfredo Hatchett Anaya, Ana Beatriz Espinosa de Los Reyes Novelo, Aydy Meléndez Ruiz, Juan Bernardo Helguera Carmona, Keyla Esther Segovia Sánchez, Lilliam Negrete Estrella, Manuel Segura Enríquez, Marcela Antonio Joaquín, Rosa Concepción Vázquez Pérez; **Celaya:** Alejandra Pérez Cabrera, Daniela Centeno Mancera, Gerardo Abraham Bustos Rendón, Karina María del Rosario González Sánchez, Laura Virginia Estrada Juárez, Liliana Espinosa Mondragón, Sofía Lorenia Herrera Cuéllar; **Chalco:** Hassibe Hernández Vega, Ivonne Ascona Hidalgo, José Luis Cervantes Flores, María de Lourdes Estévez Encarnación, María del Rocío Silverio Torres, Rodrigo Mora Barajas; **Chetumal:** Erick Gustavo Cruz Calderón, Omar Alejandro Trejo Corona, Sandra Raquel Caamal Chan; **Chihuahua:** Martha María García de La Cadena Lamelas, Miguel Ángel Rodríguez Pérez, Myrna Rojo González, Pablo Espinoza Rojas, Ricardo Eli Salcido Simental, Rosa Margarita Hernández Fierro, Virginia Cruz Holguín; **Chilpancingo:** Julia Berenice Hernández Pérez, Miriam Rodríguez Mancilla, Nayeli Alvarado Andrade; **Ciudad del Carmen:** Cristina Juárez Luna, Omar Contreras Fuentes, Ronaldo Alexis Varguez Yamá, Rossana Mendicuti Chan; **Ciudad Juárez Norte:** Christian Ariel Rascón de La Cruz, German Omar Scott Esparza, María Elizabeth Avendaño Ambrocio, Silvia Selene Prieto Soto, Sonia Guzmán Mota; **Ciudad Victoria:** Ana Gabriela Méndez Gómez, Ana Laura Rodríguez Castillo, Dulce Ivette Aguilar Gámez, Gladys Anayanzzy Estrada Mendoza, Martha Alicia Balderas Félix; **Colima:** Ana Anguiano Valdez, Frida Concepción Ávila Soto, Lilia Margarita Machuca Ayala, Óscar Mireles Pérez, Sandra Ramírez López; **Coyoacán:** Erik Moreno Romero, Francisco Díaz González, Gabriela Alejandra Saucedo García, Judith Hernández Velasco, Karina Canarios Mendoza, María de Lourdes Valverde Morales, Rebeca Morales Hernández, Sandra Rodríguez Sierra; **Cozumel:** Cynthia Cristina del Jesús Barroso Rodríguez, Eduardo Jiménez Cruz, Fabiola Ruiz Gallardo, José María Durán Ontiveros, Mariela del Socorro Cuá Aké; **Cuajimalpa:** Jorge Alejandro Paredes Nava, Marco Antonio Toquero Hernández, María Magdalena Hernández López, Paola Avendaño Villanueva; **Cuauhtémoc Oriente:** Blanca Eloisa Moran Esquivel, Jonathan Israel Hernández Vargas, Martha Beatriz López Suastegui, Miguel Ángel Cortés Vera, Sergio Alejandro Morales Hernández, Yareli



García Mares; **Cauhtémoc Poniente:** Alma Julieta Garmendia Fonoll, Alma Rosa Cuevas Caballero, Leoncio García Astudillo, Leticia Guadalupe Ortiz Ortiz, Lina Raquel Sotres Flores, María Guadalupe Moreno Flores, María Isabel López Márquez, María Isabel Salas Vargas, Mauricio Rosales Méndez; **Cuernavaca:** Andrea Guadalupe Rodríguez Ortega, Eduardo Raúl Herrera Fuentes, Elsa Román González, Irving Alain Aguilar Cuata, Kristal Rosales Ortiz, Laura Hernández Gama, Petra Alicia Ávila Loera, Rosalía Camarillo Moreno; **Culiacán:** Ana Gabriela García Rodríguez, Felipe de Jesús Ramírez, José Luis Araujo Meza, Lidia Irazema Flores Valenzuela, Rosa Isela Vásquez Cabrera, Víctor Abraham Gutiérrez Rivas; **Durango:** Argelia Reyes Fematt, Gabriela Flores Ibarra, José Ibarra Serrano, Nayeli Selene Avalos García, Olga Patricia Molina Vargas; **Ecatepec:** Carlos Eduardo Cruz Rodríguez, Marco Antonio Hernández Delgado, Miryam Ruiz Alizota, Moisés Vázquez Ostigüin, Norma Virginia Hernández Olguín; **Escuinapa:** David Covarrubias Alcaraz, José de Jesús Rodríguez Flores, Maribel Tapia García, Tonantzi Toledo López; **Fresnillo:** Alejandra Leticia Vacio Adame, Juan Antonio Reyes López; **Guadalajara Centro:** Cindy Margarita Reynoso Carreño, Gilberto Heliel Nuñez Martínez, Gilberto Rodríguez de Alba, Hugo Alberto Lomelí Torres, Ileri Mariana González Arias, Laura Rocio Salcedo Fuentes, María Teresa Rosas Ortiz, Norma Angélica Gutiérrez Martínez, Patricia Coronel Vázquez, Silvestre Rivera Tamayo; **Guadalajara Sur:** Edgar Felipe Jileta Bogarin, Elvira Virgen Reyes, Federico Topete González, Juan Emilio López Méndez, Liliana Patricia Ramos Linares, Luis Manuel Lomelí López, Rosa María Ramírez Estrada; **Guadalupe:** Adriana Medina Rodríguez, Humberto Ortiz Morales, Laura Hernández Martínez, María Magdalena González Sánchez, María Yolanda Arellano García; **Guadalupe Zacatecas:** Suheyth Sánchez Ramírez, Verónica Román Acosta; **Guamúchil:** Liliana Guadalupe Cruz Montoya, Maricela Peñuelas García, Yesenia Camacho Armenta; **Guanajuato:** Azael Rojas Macías, Carolina Elizabeth Rocha García, Luis Miguel García Barbosa, María Ofelia Gómez Gutiérrez, Paola Guadalupe Solís Moreno; **Guasave:** Diana Lizeth Rubio Arce, José Carlos Soto Ayala, Julio Cesar González Rochín, Yessica María Morales Pardini; **Gustavo A. Madero Aragón:** Diana Elizabeth Tinoco Pérez, Fernando Eliseo Rodríguez Espinosa, Fernando Valdés Suárez, Heidi Aldana Montero, María Evelyn Ruiz Méndez, María Roxana Negrete Lepe, Maribel Mendoza Rivera, Matomasa Escalera Bustos, Silvia Olguín Rubio, Verónica Martínez Mejía; **Gustavo A. Madero Norte:** Eduardo Antonio Montero Flores, Leticia Barroso Anaya, María del Consuelo González Vargas, María Georgina Radilla Ortiz, Miguel Ángel Corona Dorantes, Rebeca Corona Candelaria, Verónica García Portillo, Yaneth Yerena González; **Gustavo A. Madero Oriente:** María Teresa Rosado Balleza, Xóchitl Espinosa Rodríguez; **Hermosillo:** Alan Fabián Sánchez Ayala, Ariel Sebastián Monroy Eliosa, María Dolores Murrieta Montaño, María Guadalupe Rodríguez García; **Huatulco:** Evelin Odette Casiano Jaimes, Jonathan López Hernández; **Ixbalanqué:** Juan Carlos Coutiño Molina, Martha Alejandra Ramírez Ceballos, Victoria Isabel Escobedo Vidal; **Ixtapa - Zihuatanejo:** Erik Fernando Mendoza Melchor, Gloelia Gallardo Rivera, Laura Yarerí Salgado Vega, Minerva García Rentería; **Iztapalapa Poniente:** Elibeth Cortez López, Elizabeth López Sotres, Josué Martínez Rico, María del Pilar Ávila Cabrera, María Elena Ramírez Luna, Reyna Alejandra Salazar Espiritu, Víctor Jesús Peña Calixto; **Iztapalapa Oriente:** Betzabe Martínez Ávila, Ernesto Tian Chai González Cinco, Félix López Solís, Jannet Galicia Flores, Jessica Alejandra Amador García, Jesús Bautista Reyes, Jesús Iván Yerena González, Julieta Espinosa Carmen, Leticia Martínez Urbina, Manuel Salvador Alcocer Jimenez, María de La Luz Macías Montes, Mariana Contreras Granillo, Jazmín Alcántara Chavarría; **La Paz:** Beatriz Elena Aranda Losoya, Ma Isabel Estrada Carbajal, María del Socorro Ramírez Cota, Myrna Gallegos Ortiz, Nehiva Jetzabel Arauza Rosas; **Laguna Durango:** Claudia Ulloa Valdéz, María de Jesús Robles del Río, Silvia Esther Duarte Rangel; **León:** Ana Luz Hernández Jaramillo, Eva Velázquez Luna, Herlinda López Hernández, Lino Hernández Hernández, María del Socorro Rangel Rodríguez, María Goretti Amador Rocha, Salvador Aceves Fajardo, Silvia Margarita Aragón de Luna; **Los Cabos:** Adriana Araceli Martínez Savín, Dulce Karely Castro Lugo, Juan Rubén Rivera Cabrera, María de Jesús Sainz Santillán; **Los Mochis:** Claudia Zulema Tirado Arredondo, Daniel Rodríguez León, María Elena López Rojo, Zulma Torres Audeves; **Manzanillo:** Alejandra Ramírez Flores, Alma Rosa Barrios del Valle, Ana Jaqueline Lomelí Mancilla, Norma Lorena Bravo García; **Mazatlán:** Alba Sugey Rodrigo Chávez, Alma Verónica Hernández Ruiz, Cesia Judith Cárdenas Viera, David Ontiveros Lizárraga, Deborah Guadalupe Flores Aragón, Rosa Herendida Uribe Chávez; **Mérida:** Carmen Lidia Zapata Martínez, Henry Tulio Ortiz Figueroa, María Isabel Delgado Centeno, Modesta del Carmen Rivero Cruz, Teresita May Baak; **Mexicali:** Gloria Estela Portillo García, Gloria Isabel Sotelo Rios, María Isabel Viramontes Tostado, Raquel Felipe Pacheco, Refugio Adin Flores Angulo, Sadrach Jacob Ceja Altamirano; **Miguel Hidalgo:** Alejandro Zambrano González, Ana Belem Rodríguez Noriega, José Francisco Octavio Gómez González, Juan Carlos Martínez Islas, Lydia Gaona Márquez, María Cristina Gutiérrez Alcántara, Rocio Juana Estrada García; **Monterrey:** Alma Delia Espinosa Treviño, Brisa Marinas Galván, María de Los Ángeles Luévano Díaz, María Julia Aguilar Rosales, Sandra Guadalupe Vela González; **Morelia:** Isabel González Sánchez, Ivonne de Montserrat Galván Ayala, José Ramón Fernández Rius, Patricia González Martínez, René Ibarra Cisneros; **Naucalpan:** Araceli Mijangos Medina, Elisa Martínez Herrera, Erika del Rocio López Fuertes, Raquel Montes Castro, Rosa María Hernández de Jesús; **Nezahualcoyotl:** Beatriz Sofía Rodríguez Jiménez, José Antonio González Duana, Lizeth Guadalupe Ruiz Pineda, Marisol Meza Moreno, Pamela Serrano Covarrubias, Rocio Cuevas Moreno, Samuel Arellano Chávez, Susana Jiménez Ortega; **Nogales:** Claudia Varela Jimenez, Laura Guadalupe Martínez Galaviz, Yanett Cortez Jaime; **Oaxaca:** Francisco Rolando Olivera Aguilar, Heriberto Alejandro Zárate Ochoa, Karla Irasema García Mendoza, Mariana Figueroa Reyes; **Pachuca:** Elsa Ivette Céspedes Camacho, Erick Bejarano Martínez, Norma Chantal Reyes Montaño; **Playa del Carmen:** Carmen Elizabeth García Pérez, Christopher Manuel Cauich Moo, Laura Elena Moreno Carrillo, Marcela Dominique Torres Reynoso, Nancy Clorinda Ramírez Cortés, Nancy Pilar Sosa Ortega; **Poza Rica:** Alejandra Torres Bautista, Rosa Elena Márquez Rosas, Roxana Yarizell Espinosa López, Tania Pacheco Juárez, Zulma Bustos Vera; **Puebla:** Carlos Fernando González Campos, Claudia Lozada Dircio, Estela Hernández López, Fernando Huadi Majluf Mendoza, Lucía Orato Gutiérrez; **Puerto Vallarta:** Ana Karina Llerenas Briceño, Julio César Curiel Pérez, Liz Anel Osuna Sandoval, Susana Gertrudis Linares Cu, Xóchitl Montoy Guzmán; **Querétaro:** Ana Luisa Reynoso Rentería, Donaji Martínez Aguascalientes, María Estela Frías Borja, Olmo Espinosa Ortiz, Simón Honold Espinosa; **Ramos Arizpe:** Andrea Regina Dena Pecina, Dolores Aida García Charles; **Reynosa:** Claudia Patricia Cruz Cruz, Enith Marlenis Ramírez Morales, San Juana Guadalupe Valdez Aguiar, Sandra Jarumy Lozano Medina; **Salamanca:** Aldo Fernando Estrada Ortiz, Cecilia Vargas Palestina, Laura Beatriz López Palma, María Alejandra González Flores; **Saltillo:** Claudia Nuñez Cervantes, Francisco Javier Ruiz Medina, Isela Alejandra Montoya Ramón, Marcos Alejandro Dena González, María Concepción Jaramillo Flores, Norma Leticia Covarrubias Laureano; **San Luis Potosí:** Evelin Areli Cortes de León, Leticia Jaime Reyes, María Margarita Anguiano Izquierdo, Marisol Orocio Contreras, Norma Leticia Alonso Duque, Patricia Eugenia Avilez Hernández, Patricia Rangel Martínez, Rosa Martina Alferez Martínez; **San Nicolás de los Garza:** Miriam Guadalupe Armendáriz Bustos, Narciso Solares Rojas, Noe Gracia Sánchez, Otília Violeta González Elizondo; **Tampico:** Alejandra Altamirano Vizcarra, Gerardo Hernández Lara, Giovana Marisol Medina Carreño, Jorge Ramón Portillo Velázquez, Ma Guadalupe Palacios Torres, Mary Carmen Cruz Islas; **Tapachula:** Ana Gabriela Gamboa Torres, Eduardo de Jesús Piedrasanta Velázquez, Ingrid Iliana Cueto García, Miguel Ángel Mancera Castillo; **Tecomán:** Ana Paulina Esparza Gutiérrez, Katya Elizabeth Rodríguez Reyes; **Tehuacán:** Mónica Vázquez Blanco, Sara Ramos Cuevas; **Tepic:** Eunice Chavarín Aragón, Iris Noemí Casillas Castellón, Luis Gerardo Aguilar Arcadia,



Martha Patricia Rodríguez Plascencia; **Texcoco:** Carmen Naly Santiago Fierro, Eusebia Rojas Herrera, José Juan Bautista Butrón, Laura Jiménez Méndez, María Magdalena Ramos Martínez, Sara Elvira Galicia Gutiérrez; **Tijuana-Guaycúra:** Ángela María Corona Nava, Gemma Lizeth Plascencia Mendoza, José Rosario Álvarez Álvarez, María del Carmen Zavala Monreal, Norma Angélica Guadalupe Moysen Vargas, Víctor Alfonso Guillén Chávez; **Tijuana-Soler:** Cecilia Sarmiento Solano, Deborah Iovana Figueroa Castañeda, María del Carmen Velázquez Flores, Mónica Jazmín Salinas Sánchez, Ninfa Martínez García, Samantha Nieto Pérez; **Tlalnepantla:** Edgar Vera González, María del Rosario Cortés Téllez, Martha Patricia Vázquez Tapia, Mauricio Rosales Méndez, Paulina Sierra García; **Tlalpan:** Alejandra Avalos Torres, Olivia Jani Vega González, Virginia Ortiz González; **Tlaquepaque:** Cindy Margarita Reynoso Carreño, Daniel Chairez Muñoz, Elizabeth Gómez Vargas, Francisco Águila Orosco, Jessica Monserrath Cervantes Hernández, Juan Antonio Chávez Vázquez, Juan Pablo Nungaray Gutiérrez, Laura Flores Fermín, Luis Jorge Ayala Mora, Miriam Esther Trejo Nuñez, Ramiro Cuevas Díaz; **Tlaxcala:** Adriana Guerrero Romero, Hilder Alberto Llanos Gutiérrez, Minerva Paola Moreno Caporal, Xóchitl Janet Alonso Torres; **Toluca:** Araceli Olvera Verdeja, Cruz Cielo Piñón, Elvira Garduño Huertas, Juan Carlos Cruz Miguel, Juana Bernal Malvaez, Martha Susana Escobedo Galindo, Matilde Adriana Cambron Gómez, Xóchitl García Sánchez; **Torreón Oriente:** Cecilia Martínez López, Cecilia Pineda Granados, Elvia Gabriela Sosa Urbina, Enrique David Rocha Rocha, María Teresa Sifuentes González, Nadia Azucena Pedroza Verástegui, Paloma de Los Santos Ortega, Zahid Erubiel Posada Valdez, Zaira Patricia Ibarra Vázquez; **Tuxtla Gutiérrez:** Olga Rossana Gongora Garza, Samy Rubí Solís Méndez, Tania Sevilla Saucedo; **Venustiano Carranza:** Alma Rosa Cuevas Caballero, Ana María González Serrano, Belén Victoria Santamaría Vera, Dulce Carolina Vega Bastida, Gloria Contreras Álvarez, José Adrián Herrera Sánchez, José Ulises Maldonado del Ángel, Miguel Ángel Morales Molina; **Villahermosa:** Ana Silvia Lázaro Valencia, Jorge Clemente Esponda, María del Rosario Mayo Tavares, Naun Hernández Hernández; **Xalapa:** Antonio de Jesús Álvarez Guillén, Brenda Yohaly Vivanco Herrera, Daniel Castañeda Enríquez, Dulce María Meza Loeza, Nayeli Castillo Quiroz, Norma Leticia Sánchez Arauz, Rafael Miguel Contreras Pérez, Reyna Elena Torres Hernández; **Yucatán:** Érica Vargas Sánchez, Julio Ernesto Moreno Rivero, Pedro Luis Arango Torrejón, Rodolfo Jiménez Delgadillo, Ruperta María de los Milagros Lugo Y Pech; **Zacatecas:** Alfredo Álvarez Haro, Jazmín Angélica Treto Martínez, José Martín de León Cruz, Miguel Ángel Solís Ruvalcaba; **Zamora:** Adriana López Rodríguez, Claudio Jesús Baltazar Esquivel, Fátima Esmeralda Valladolid Tamayo, José Manuel Cazares Castillo, María del Pilar Espinoza Parra, María Guadalupe Aviña Rodríguez, Verónica Esperanza Ochoa Valencia; **Zapopan Norte:** José Alfredo Gustavo Fernando Martínez Vargas, Juan Alejandro Serrano Córdova, Martha Gabriela Sánchez Aguilar, Olga Lidia Acosta Nungaray; **Zapotlán el Grande:** Erika Prado Pérez, Isis Anel Trejo Meza, Lendy Sofía Benavides Xochihua, Marco Fernando Espinoza García, Mariana Celeste López Méndez, Rosa Adriana Martínez Cárdenas, Salvador Ramírez Hernández; **UH Ciudad Juárez:** Fátima Alejandra Maya Cabral, José Manuel Carrillo Avendaño; **UH Culiacán:** Danny Eloir Meza Castro, Ernesto Javier Benítez Gaspar, José Noel Iribe Pérez; **UH Ecatepec:** Arturo Contreras Mendoza, Daniel Salinas García, Víctor Hugo Zapata Barrera; **UH Iztapalapa:** Carol Arroyo Ruano, Marco Antonio León Espejel; **UH Naucalpan:** Abraham de Jesús Salas Peniche, Denisse Viridiana Aceves Sánchez, Isabel Rocio Silva Cervantes, Naashiel Nájera Domínguez; **UH Nuevo León:** Agustín Jaime Cadengo Jiménez, Gerardo Torres Estrada, Jorge Fernando Sierra Flores, Martín Isaac Salgado Guerrero; **UH Punta Diamante:** Carina Blanco Bailon, Celia María Hernández Salmerón, Edwin Hernández Quinto, Pedro Daniel Quezada Juárez, Saúl Zeus Enríquez Rodríguez; **UH Tijuana:** Miguel Abdías Ávalos Molina, Miguel Ángel Guardado Arvizu, Miguel Ángel Ortiz Aguilar; **UH Zapopan:** Enrique Nolasco Rodríguez, José Ibarra Serrano, Juan Pablo Preciado Aguirre; **UTUH Ciudad Juárez:** David Alonso Gómez Melchor, Jesús Alfredo Castro Ortiz; **UTUH Tijuana:** Rubí Georgina González Serrano.



CONTENIDO

	PÁG.
Resumen	9
Antecedentes	10
Método	11
Resultados	14
Características sociodemográficas	15
Consumo de drogas	19
Nuevas sustancias de abuso o emergentes	30
Alerta epidemiológica	
Fentanilo y análogos	33
Nicotina en dispositivo electrónico	34
Referencias	36
Anexo	40
Glosario	73



ÍNDICE DE TABLAS

			PÁG.
Tabla 1	Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	41	
Tabla 2	Principales motivos de consulta declarados	44	
Tabla 3	Sexo	44	
Tabla 4	Edad de ingreso a tratamiento	45	
Tabla 5	Estado civil	45	
Tabla 6	Escolaridad	46	
Tabla 7	Ocupación	46	
Tabla 8	Estrato social	47	
Tabla 9	Población en situación de vulnerabilidad	47	
Tabla 10	Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones	48	
Tabla 11	Edad de inicio del consumo de tabaco	50	
Tabla 12	Edad de inicio del consumo de alcohol	50	
Tabla 13	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	51	
Tabla 14	Drogas ilícitas de inicio, según menciones	52	
Tabla 15	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	54	
Tabla 16	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	54	
Tabla 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	55	
Tabla 18	Tipo de consumo de drogas ilícitas	55	
Tabla 19	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	56	
Tabla 20	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	56	
Tabla 21	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	57	
Tabla 22	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	60	
Tabla 23	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	60	
Tabla 24	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	61	
Tabla 25	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	64	
Tabla 26	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	66	
Tabla 27	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	66	
Tabla 28	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	67	
Tabla 29	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	68	
Tabla 30	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol en los últimos 30 días	71	
Tabla 31	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	71	
Tabla 32	Problemas asociados al consumo de sustancias	72	



RESUMEN

En el primer semestre de 2025, se presentaron **10,947 personas con consumo de drogas ilícitas** a solicitar tratamiento por primera vez en Centros de Integración Juvenil (CIJ), de las cuales, el 98.9% lo hizo de manera presencial. Los principales motivos de consulta declarados fueron el consumo de sustancias (88.7%) y otras condiciones de salud mental, principalmente por ansiedad (27.3%) y depresión (24.6%).

Los hombres acuden en mayor frecuencia que las mujeres a solicitar atención por consumo de sustancias, en una proporción de 2.6 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento se situó en 24.4 años. Los hombres tardan un poco más que las mujeres para acudir a solicitar atención en CIJ (24.9 años y 22.8 años, respectivamente).

La edad de inicio del consumo de tabaco y de alcohol se situó alrededor de los 15 años (15.0 años y 14.7 años, respectivamente), en tanto que la edad de inicio del consumo de drogas ilícitas se situó en 16.8 años.

Las drogas de mayor impacto, por las que se solicitó el tratamiento fueron: metanfetaminas (40.8%), cannabis (27.9%) y alcohol (11.8%). Las principales sustancias consumidas alguna vez fueron: alcohol (78.2%), cannabis (76.5%), tabaco (68.7%) y metanfetaminas (51.7%). Mientras que en el mes previo al ingreso a tratamiento se consumió principalmente: tabaco (44.3%), alcohol (43.2%), cannabis (34.4%), metanfetaminas (26.7%) y clorhidrato de cocaína (8.1%).

En cuanto al seguimiento de las Nuevas Sustancias de Abuso (NSA) o de uso poco común se observó que 2,453 personas reportaron haber consumido alguna de estas sustancias al menos una vez (22.4%). Entre las principales NSA se encontró que el consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivos electrónicos fue la sustancia más reportada (15.9%), seguida por marihuana modificada (4.4%), hachís en presentación de aceite o miel (1.6%) y dextrometorfano (1.4%). En relación con el consumo de nicotina en dispositivos electrónicos se observó que es más prevalente entre la población más joven y entre las mujeres. En tanto que, en comparación con el semestre anterior, el consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos registró un incremento en el número de casos que reportaron su uso, al pasar de 59 casos en el segundo semestre de 2024 a 82 casos en el primer semestre de 2025.

Los problemas asociados al consumo de drogas ilícitas más reportados fueron los familiares (78.0%), seguidos de los psicológicos (63.8%), de salud (48.4%), escolares (43.6%) y laborales (29.2%).



ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil A.C. (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento en sus unidades de atención desde el año de 1976 (Sanchez-Huesca y López, 1985). En 1983 inició la aplicación de una cédula homogénea a las personas de nuevo ingreso (Clarac y Wagner, 1987). No obstante, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática (García et al, 1999), lo que permitió la implementación del *Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (RIECD), el cual se ha consolidado a través de los años, gracias al aprovechamiento de los avances tecnológicos, siendo su última modificación en el año 2021.

El RIECD realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen a la toma de decisiones de los servicios institucionales, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del consumo de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) de la Secretaría de Salud (Secretaria de Salud [SS], 2009), Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID), perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM) Ortiz et al, 2024) y el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (SS, 2019).

Por un lado, el RIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados realizados por CIJ. Donde sobresalen los estudios de tendencias del consumo de sustancias (CIJ, 2025b; CIJ, 2025c; CIJ, 2025d; García, Díaz y Balanzario, 2001; García et al, 2018), el perfil de consumidores de drogas y su trayectoria de consumo (García et al, 1998), el consumo de drogas en mujeres (Castillo y Gutiérrez, 2008), el consumo de sustancias en población infantil (Gracia y Balanzario, 2003) o de acuerdo con las etapas de la vida (García et al, 2003). Información que, en su momento, permitió enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que ha servido de sustento en el diseño de estudios sobre características particulares de las personas con consumo de estos alcaloides (Jiménez et al, 2005; Jiménez y Castillo, 2014).

Por otro lado, la información reportada a través del RIECD ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características de las personas que consumen drogas legales solicitantes de tratamiento en CIJ. Así, desde el 2006 se genera un informe de las características de las personas que consumen tabaco y alcohol (Gutiérrez y Castillo, 2007), con lo cual se logró identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores (CIJ, 2022a); suceso que ha motivado que CIJ profundice en esta problemática (Moreno, 2010). Estos hallazgos son consistentes con lo reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco



(Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz et al. [ENCODAT], 2017a), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes.

Asimismo, la información generada por este Reporte, durante más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales (Medina-Mora et al., 2012a; Medina-Mora et al., 2012b; ENCODAT, 2017b) y ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso del *Estudio Básico de Comunidad Objetivo* (CIJ, 2025) realizado por CIJ.

Cabe destacar que, a partir del primer semestre de 2021, CIJ inició el registro y seguimiento de Nuevas Sustancias de Abuso (NSA) o sustancias emergentes. Esto debido a la proliferación de nuevas sustancias psicotrópicas de reciente creación o aparición en el mercado y que no están controladas por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 o la Convención de 1971, pero que pueden representar una amenaza para la salud pública (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2018; United Nations Office on Drugs and Crime, 2024).

El reporte se elaboró con base en la información obtenida del Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0, correspondiente al primer semestre del año 2025. Su objetivo es proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, el patrón de consumo de drogas de las personas solicitantes de tratamiento y variables asociadas a la solicitud de tratamiento de las personas usuarias de drogas ilegales de primer ingreso a tratamiento en CIJ. A través de este, se aportan elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y brindar información para investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: estudio descriptivo, transversal-retrospectivo, con corte semestral.

Población: 10,947 personas con consumo de drogas ilícitas procedentes de 110 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2025 (Anexo, Tabla 1).

Fuente de información: Base de datos recuperada el día 8 de julio de 2025 a las 10.22 hrs., correspondiente al formato electrónico de Entrevista Inicial que requisita el equipo médico-técnico en la primera consulta que tienen las personas en alguna unidad de CIJ. Este formato es parte del Expediente Clínico Electrónico que se captura en el Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0.

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato social y población en situación de vulnerabilidad. Las variables de patrón de consumo incluyen: edad de inicio del consumo de sustancias (tabaco, alcohol y drogas ilícitas), tiempo transcurrido entre el inicio del



consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento (tabaco, alcohol y drogas ilícitas), droga ilícita de inicio, consumo alguna vez en la vida, consumo en el último año, consumo en los últimos 30 días; drogas de preferencia en el último año, droga de mayor impacto (por la cual podría estar solicitando atención en CIJ), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, frecuencia de episodios de abuso, total de drogas consumidas, y el reporte de nuevas sustancias de abuso o de uso poco común. Finalmente, se incluyen variables asociadas a la solicitud de tratamiento, como son los motivos de consulta y los problemas asociados al consumo de sustancias.

El registro del consumo de drogas comprende 82 sustancias. Para las variables de consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes, además están disponibles 25 grupos de sustancias:

Grupo(s) de Sustancias		Sustancias
Tabaco		Tabaco; Nicotina en dispositivo electrónico
Alcohol		Bebidas fermentadas; Bebidas destiladas; Alcohol puro (alc. del 96)
Cannabis		Mariguana "estándar"; Mariguana modificada, con alto nivel de THC; Hachís – Resina; Hachís - Aceite o miel
Sustancias asociadas al cannabis		"Mariguana" sintética; Medicamentos con compuestos cannábicos
Inhalables		Solventes y removedores; Pegamentos; Esmaltes y pinturas; Gasolinas y combustibles; Otros inhalables
Cocaína	Cocaína (clorhidrato)	Cocaína en polvo blanco
	Crack	Crack
	Otra presentación de cocaína	Basuco (pasta base de cocaína); Otras presentaciones de cocaína
Metanfetaminas		Metanfetaminas: cristal, Hielo; "Metas"
Otros estimulantes		Sales de baño; Anfetaminas y derivados; Anorexígenos; Drogas de diseño con efectos estimulantes; Otros estimulantes
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	Éxtasis (MDMA)
	Sust. con efectos similares al éxtasis	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis; Piperazinas con efectos similares al éxtasis; Aminoindanos
Benzodiacepinas		Benzodiacepinas y sustancias relacionadas; Rohypnol
Otros depresores		GHB o similares; Sedantes hipnóticos; Otros depresores del SNC
Alucinógenos	LSD/LSA	LSD; LSA
	Plantas alucinógenas o disociativas	Hongos alucinógenos; Peyote (mezcalina); Salvia divinorum u otras variedades de salvia; Ololiuqui; Floripondio; Ayahuasca; Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos
	Otros alucinógenos	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel); Análogos del PCP; Ketamina; Dextrometorfano; DMT; Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT; Grupo 2C x; Grupo DO x;



Grupo(s) de Sustancias	Sustancias
	Grupo NBOMe; Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos; Otras sustancias con efectos psicodélicos
Heroína	Heroína blanca; Heroína negra o morena
Opioides sintéticos	Oxicodona; Opioides sintéticos; Fentanilo y análogos; Derivados Opioides combinados con analgésicos; Desomorfina
Opio y derivados	Opio; Morfina; Codeína
Sustancias con utilidad médica, utilizadas fuera de prescripción	Anticolinérgicos; Antiespasmódicos; Antiparkinsonianos; Anticonvulsivos; Antidepresivos; Antipsicóticos o neurolepticos; Antihistamínicos; Otras sustancias de abuso con utilidad médica
Otras sustancias de abuso	Nitritos; Anestésicos; Bebidas energizantes; Drogas o bebidas inteligentes; Esteroides anabólicos; Sustancias no clasificadas; Sustancias sin especificar

Para el presente reporte las nuevas sustancias de abuso (NSA) o sustancias emergentes en seguimiento son: Nicotina en dispositivo electrónico, Marihuana modificada -con alto nivel de THC-, Hachís –*Aceite o miel*–, “Marihuana sintética”, Medicamentos con compuestos cannábicos, Sales de baño, Drogas de diseño con efectos estimulantes, Piperazinas con efectos similares al éxtasis, Aminoidanos, Fenciclidina –*PCP, polvo de ángel*– y análogos del PCP, Ketamina, Dextrometorfano, DMT y análogos, Fenitelaminas –*Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe*–, Salvia divinorum, Ayahuasca, GHB o similares, Fentanilo y análogos y Desomorfina. El seguimiento de estas sustancias incluye el consumo alguna vez en la vida, la edad de inicio de cada una de estas sustancias y las entidades federativas donde se registró la solicitud de tratamiento de personas con consumo de estas sustancias.


Los resultados se presentan tanto en forma general como desagregada por sexo, en porcentajes válidos, excluyendo los casos “sin información” y aquellos que no cumplen con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio. Cabe señalar que para contabilizar el total de sustancias consumidas se consideran las 82 sustancias en seguimiento.

RESULTADOS

Entre enero y junio del 2025 se registró a **10,947 personas con consumo de drogas ilícitas** solicitantes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. 10,829 personas lo hicieron de manera presencial (98.9%) y 118 lo hicieron a distancia (telemática: 1.1%).

El principal motivo de consulta declarado fue el consumo de sustancias psicoactivas (88.7%), mientras que 42.9% reportó otras condiciones de salud, 46.9% de los casos declaró más de un motivo de consulta (Figura 1).

Figura 1. Principales motivos de consulta declarados



CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS¹

Sexo. La población se conformó por 7,884 hombres (72.0%) y 3,063 mujeres (28.0%); es decir, por casi tres hombres que solicitan tratamiento en CIJ (2.6 hombres) lo hace una mujer. Cabe señalar que 53 mujeres expresaron estar embarazadas (1.7% de las mujeres).

Edad de ingreso a tratamiento. Se registró un rango de edad de 7 a 77 años, con una media de 24.4 años (DE= 11.1 años), una mediana de 20 años y una moda de 16 años (1,067 personas). El 83.3% tenían entre 13 y 35 años, mientras que el 39.4% de los casos eran menores de edad (4,314 personas).

Figura 2. Edad de ingreso a tratamiento por sexo


	 Años	 Años	Los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres.
Rango	7 a 77	11 a 77	
Media (Desviación estándar)	24.9 (11.4)	22.8 (10.4)	
Mediana	21	18	
Moda	16	16	
Decil₁	15	14	

¹ Cfr., Anexo, Tablas 1 a 9.

Estado civil. El 76.1% de la población refirió ser soltera; el 11.1% indicó que vivía en unión libre; el 7.4% dijo estar casada; el 3.7% estaba separada y el 1.2% ya se había divorciado.


Figura 3. Estado civil por sexo

Los hombres refirieron en mayor proporción que las mujeres estar casados o vivir en unión libre.



Escolaridad. El 43.2% de la población había cursado algún grado de bachillerato, el 33.7% algún grado de educación secundaria, el 14.2% tenía estudios superiores y el 5.5% había cursado solamente estudios de primaria.


Figura 4. Escolaridad por sexo



Los hombres y las mujeres cuentan estudios similares.

Ocupación. El 35.9% reportó ser estudiante de tiempo completo, el 34.1% desempeñaba alguna actividad laboral y el 18.1% estaba desempleado.


Figura 5. Principal ocupación por sexo



Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedicaba a estudiar o al hogar, casi la mitad de la población de hombres contaba con un trabajo remunerado (46.7%), seguidos de los que se dedican a estudiar, no obstante, casi uno de cada cinco hombres no tenía ocupación.

Estrato social. De acuerdo con la percepción de los terapeutas, poco más de la mitad de los casos (54.4%) se ubicaban en el estrato medio bajo, un 35.8% en el nivel bajo, un 5.5% fue clasificado en el estrato medio alto y otro 4.0% en el estrato muy bajo.

Figura 6. Estrato social por sexo



Tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando los estratos medio bajo y bajo.

Población en situación de vulnerabilidad. Entre las personas que se consideran en situación de vulnerabilidad se encuentran las **mujeres** de las cuales (3,063 mujeres solicitaron tratamiento), 1.7% refirió estar embarazada y 0.6% indicó no saber si se encontraba embarazada.

El 6.0% de las personas refirió pertenecer a la **comunidad LGBTIQ+** (661 personas, de las cuales 277 refirió ser bisexual, 228 gays y 85 lesbianas).


El 1.0% dijo ser miembro de alguna **comunidad indígena** (105 personas) y 0.2% de la comunidad **afrodescendiente** (23 personas).

El 1.8% refirió tener algún tipo de **discapacidad**: 97 personas presentan discapacidad sensorial y de la comunicación, 82 discapacidad motriz y 17 discapacidad múltiple.

El 0.9% manifestó haber migrado a otro país en los últimos 12 meses (96 personas).

El 1.7% señaló haber vivido en Estados Unidos un año o más, principalmente en los estados de California (66 casos), Texas (28 casos) y Arizona (16 casos).

Figura 7. Población en situación de vulnerabilidad por sexo




En las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, sobresalen las mujeres. En tanto que un mayor porcentaje de hombres es miembro de alguna comunidad indígena o ha vivido como migrante en Estados Unidos de Norteamérica.

CONSUMO DE DROGAS²

Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto). 9,678 personas refirieron que la solicitud de tratamiento fue por el consumo de alguna sustancia (7,223 hombres y 2,455 mujeres). Las principales sustancias a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: metanfetaminas (40.8%, esencialmente cristal: 40.4%), cannabis (27.9; básicamente marihuana estándar: 25.8%) y alcohol (11.8%); en menor medida se mencionó al tabaco (4.9%), a la cocaína en clorhidrato (5.5%) y al crack (2.9%).

Figura 8. Droga de mayor impacto por sexo



Las metanfetaminas y el cannabis son las principales sustancias por las que se solicita tratamiento; los hombres acuden en mayor proporción que las mujeres por problemas asociados al consumo de cannabis, inhalables, cocaína, crack y heroína. Ellas acuden en mayor proporción que ellos por lo que les ocasiona el uso de metanfetaminas, tabaco, alcohol y benzodiacepinas.

² Cfr., Cuadros 10 a 32.

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco fue a los 15.0 años (DE= 3.9 años), mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.7 años (DE= 3.5 años), la mediana y la moda de ambas sustancias fue a los 15 años. Mientras que la edad promedio de inicio del consumo de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 16.8 años (DE= 5.9 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades más tempranas de inicio, se observa que tanto para el tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas se ubica en los 12 años.


Figura 9. Edad de inicio del consumo de sustancias por sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Media (Desviación estándar)	14.9 (3.9)	14.7 (3.1)	16.6 (5.7)	15.4 (4.1)	14.8 (3.6)	17.2 (6.5)
Mediana	15	15	15	15	15	15
Moda	15	15	15	15	15	15
Decil₁	12	12	12	12	11	13

En general, hombres y mujeres inician el consumo de alcohol y tabaco a la misma edad, al considerar el primer decil como indicador de las edades más tempranas de inicio, ellas inician más temprano el consumo de alcohol y más tarde el de drogas ilícitas.

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias más reportadas fueron: cannabis (63.9%, principalmente marihuana estándar: 61.3%); metanfetaminas (18.8%; principalmente cristal: 17.8%); cocaína (8.6%, básicamente en clorhidrato de cocaína: 7.4% y de crack: 1.0%); e inhalables (3.5%, mayormente en forma de solventes y removedores: 2.2%).

Figura 10. Principales drogas ilícitas de inicio por sexo



El cannabis es la principal droga ilegal de inicio en los hombres y las mujeres, seguida por el consumo de metanfetaminas y de cocaína en polvo blanco (clorhidrato).

Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el haber iniciado el consumo de sustancias ilegales con cannabis, inhalables, cocaína en polvo, crack y heroína. En tanto que las mujeres iniciaron el consumo, en mayor proporción que los hombres, con metanfetaminas y benzodiacepinas.

Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años transcurrido entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se presentó de la siguiente forma: tabaco, 9.8 años (DE=10.3 años), alcohol 10.5 años (DE=10.5 años) y drogas ilícitas 7.6 años (DE =9.2 años).

Cabe señalar que la mitad de las personas con consumo de drogas dejaron pasar hasta seis años desde que iniciaron el consumo de tabaco, hasta siete años desde el inicio de alcohol y hasta cuatro años desde el inicio de drogas ilícitas hasta que acudieron a solicitar tratamiento.


Figura 11. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ por sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	10.4 (10.7)	11.1 (10.9)	8.3 (9.7)	8.1 (9.1)	8.8 (9.1)	5.7 (7.5)
Mediana	6	7	4	4	5	2
Moda	2	2	1	2	1	1
Decil₁	1	1	1	1	1	< 1

Los hombres tardan más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, el 44.7% de los solicitantes de tratamiento fue catalogado con consumo funcional, el 19.7% con consumo disfuncional, el 14.9% con consumo social u ocasional, el 13.3% con consumo experimental y el 7.4% presentaba remisión del consumo.

Figura 12. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo




Si bien, la mayor proporción de hombres y mujeres son catalogados con un consumo funcional de drogas, ellas registran en mayor proporción que los hombres un consumo experimental, social y en remisión.

Total de drogas consumidas. La media de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol y tabaco fue de 4.1 drogas (90.3% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.0 drogas (79.6% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.8 drogas (53.6% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

La media de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco fue de 2.3 drogas (58.0% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.5 drogas (38.4% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 0.8 drogas (19.2% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 13. Promedio de drogas consumidas por sexo




Mujeres y hombres han consumido prácticamente el mismo número de sustancias; siendo ligeramente mayor en los hombres.

Consumo de drogas alguna vez en la vida.³ Las sustancias de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (78.2%; principalmente bebidas fermentadas: 63.2%), cannabis (76.5%; principalmente marihuana estándar: 73.8%), tabaco (68.7%; 15.9% uso nicotina en dispositivo electrónico), metanfetaminas (51.7%, principalmente en su presentación de cristal: 50.9%), clorhidrato de cocaína (33.8%) y crack (8.5%); en menor medida se reportó el consumo de inhalables (12.4%; principalmente solventes y removedores: 7.7%), alucinógenos (12.1%; primordialmente LSD: 9.4% y plantas alucinógenas o disociativas: 4.3%), benzodiacepinas (8.3%), éxtasis y sustancias similares (2.9%), heroína (1.4%) y opioides sin prescripción médica (1.4%).

El 1.6% reportó el consumo de sustancias de uso médico sin prescripción (el 0.8% reportó el consumo de antidepresivos) y el 3.4% reportó otras sustancias de abuso⁴ (principalmente bebidas energizantes: 2.8%).

Figura 14. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sexo



Las sustancias más consumidas por hombres y mujeres fueron el alcohol, el cannabis, el tabaco, las metanfetaminas y la cocaína en polvo (clorhidrato).

En general, sobresale un mayor consumo en los hombres.


³ Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

⁴ Nitritos, anestésicos, bebidas energizantes, drogas o bebidas inteligentes, esteroides anabólicos y sustancias sin clasificar o sin especificar.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses.⁵ 96.9% de las personas reportó haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

En este lapso, las sustancias más consumidas fueron: alcohol (66.5%; principalmente bebidas fermentadas: 52.6%), tabaco (56.5%, nicotina en dispositivo electrónico: 12.0%), cannabis (55.2%; principalmente marihuana estándar: 52.7%), metanfetaminas (43.8%), clorhidrato de cocaína (18.3%), inhalables (5.9%), alucinógenos (4.8%; principalmente LSD: 3.5%), benzodiacepinas (4.8%) y crack (4.6%). En menor medida se reportó el consumo de otras sustancias de abuso⁶ (2.6%, principalmente bebidas energizantes: 2.2%), sustancias de uso médico sin prescripción (1.0%), opioides sin prescripción médica (1.0%), éxtasis (0.8%) y heroína (0.6%).

Figura 15. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sexo




Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco, cannabis, metanfetaminas y cocaína (clorhidrato). En general, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de sustancias, con excepción del consumo de metanfetaminas y benzodiacepinas.

⁵ Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

⁶ Nitritos, anestésicos, bebidas energizantes, drogas o bebidas inteligentes, esteroides anabólicos y sustancias sin clasificar o sin especificar.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Las personas reportaron mayor preferencia por el consumo de cannabis (30.7%, principalmente marihuana estándar: 28.9%), metanfetaminas (30.7%), alcohol (15.6%; en su mayoría bebidas fermentadas: 10.7%) y tabaco (11.2%).


Figura 16. Droga de preferencia en los últimos 12 meses por sexo



En los últimos 12 meses, los hombres y las mujeres prefirieron el consumo de metanfetaminas y cannabis. Ellos reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el consumo de cannabis, cocaína, crack, inhalables y heroína; mientras que la preferencia por el tabaco, alcohol, metanfetaminas, benzodiazepinas y alucinógenos fue mayor en las mujeres que en los hombres.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.⁷ De las personas con consumo de drogas que usaron sustancias en el último año, y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, 58.4% reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

Figura 17. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses según sexo




Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el consumo de dos o más sustancias (no se incluye el consumo de tabaco) en un mismo día.

⁷ No se toman en cuenta 4,631 casos (42.3%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 39.9% de los hombres y 48.5% de las mujeres (ver anexo, cuadro 26).

Consumo de drogas en los últimos 30 días.⁸ En este lapso, 82.0% de los casos reportó el consumo de alcohol, tabaco o drogas ilícitas. Las sustancias más consumidas fueron: tabaco (44.3%), alcohol (43.2%; principalmente bebidas fermentadas: 34.2%), cannabis (34.4%; principalmente marihuana estándar: 32.6%), metanfetaminas (26.7%; principalmente en presentación de cristal: 26.3%), clorhidrato de cocaína (8.1%), crack (2.5%), inhalables (3.0%; principalmente solventes y removedores: 2.0%), benzodiacepinas (2.4%), alucinógenos (1.3%; primordialmente LSD/LSA: 0.7%) y otras sustancias de abuso⁹ (1.6%; principalmente bebidas energizantes: 1.4%)

En menor medida se refirió el consumo de sustancias similares al cannabis (0.5%), opioides (0.5%), heroína (0.4%) y sustancias de uso médico sin prescripción (0.5%; principalmente antidepresivos: 0.3%).

Figura 18. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sexo




Hombres y mujeres consumieron predominantemente alcohol, tabaco, cannabis y metanfetaminas. Las mujeres predominaron en el consumo de benzodiacepinas y de metanfetaminas.

⁸ Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

⁹ Nitritos, anestésicos, bebidas energizantes, drogas o bebidas inteligentes, esteroides anabólicos y sustancias sin clasificar o sin especificar.

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. El 37.9% de quienes reportaron consumo de alcohol en los últimos 30 días reportó consumo abusivo¹⁰ menos de una vez a la semana y 27.2% de una o dos veces a la semana. Por otra parte, 33.9% de las personas con consumo de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 29.9% menos de una vez a la semana, 22.1% de una a dos veces a la semana y 14.1% cada tercer día.

Figura 19. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo




En general, los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso en el consumo de alcohol y de drogas ilícitas que las mujeres.

¹⁰ Se refiere al consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Problemas asociados al consumo de sustancias. El 90.4% de las personas con consumo de drogas ilícitas refirió haber tenido problemas asociados al consumo de sustancias; el 78.0% reconoció tener problemas familiares, el 63.8% presentó problemas psicológicos, el 48.4% de salud, el 43.6% escolares, el 29.2% laborales, el 21.3% tuvo accidentes o lesiones, el 20.3% problemas de conducta antisocial o delictiva y el 18.8% problemas legales. El 81.0% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias.

Figura 20. Problemas asociados al consumo de sustancias por sexo



En general, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres los problemas asociados al consumo de sustancias; mientras que las mujeres rebasan el porcentaje de hombres al no referir problemas asociados.

Entre hombres y mujeres, los problemas familiares son las problemáticas más frecuentemente relacionadas al consumo de drogas, le siguen los problemas psicológicos, de salud y escolares.


Los hombres reportan en mucha mayor proporción que las mujeres los problemas legales, los accidentes o lesiones y la conducta antisocial asociados al consumo de sustancias.

NUEVAS SUSTANCIAS DE ABUSO O SUSTANCIAS EMERGENTES (NSA)

En el presente reporte se da seguimiento a 19 sustancias consideradas nuevas sustancias de abuso o sustancias emergentes (Figura 21). En el primer semestre de 2025 se obtuvo el registro de 2,453 personas que reportaron haber consumido al menos una de estas sustancias en seguimiento (22.4%); el 21.8% de los hombres y el 23.9% de las mujeres.


El consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivos electrónicos fue la sustancia más reportada (15.9%), seguida por la marihuana modificada (4.4%), el hachís en presentación de aceite o miel (1.6%), el dextrometorfano (1.4%), la marihuana sintética (1.1%), el fentanilo y análogos (0.7%), el DMT y análogos (0.5%), la salvia divinorum (0.5%), drogas de diseño con efecto estimulante (0.3%), la ayahuasca (0.3%), los medicamentos con compuestos cannábicos (0.2%) y ketamina (0.2%). En menor medida se reportó el consumo de GHB y sustancias similares (0.1%), fenciclidina y sustancias análogas (0.1%), fenitelaminas (0.1%) y dos casos de sales de baño, un caso con consumo de piperazinas con efectos similares al éxtasis y otro caso con consumo de desomorfina. No se reportó el consumo de aminoidanos.

Figura 21. Consumo alguna vez en la vida de nuevas sustancias de abuso o sustancias emergentes por sexo




El inicio del consumo de las NSA en seguimiento se presenta en promedio entre los 15 y 28 años.

Figura 22. Edad promedio de inicio de las nuevas sustancias de abuso o sustancias emergentes



Los estados con mayor número de personas que reportan el consumo de NSA son la Ciudad de México (395 personas) y el Estado de México (279 persona). Mientras que, como se observa en la figura 23, los estados con mayor número de NSA son Sonora, Jalisco y Querétaro.

Figura 23. Total nuevas sustancias de abuso o de uso emergente (NSA) reportadas por entidad federativa.



ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

1. Fentanilo y análogos

El consumo de fentanilo sigue cobrando relevancia en el seguimiento epidemiológico del consumo de sustancias en México, no solo porque los opioides sintéticos —incluido el fentanilo— son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis en Estados Unidos (NIDA, 2021) y por las implicaciones económicas, políticas y sociales que tiene el consumo para la población mexicana (Observatorio Mexicano de salud Mental y Adicciones, 2024), sino por el incremento constante en el reporte de sustancias consumidas por los solicitantes de atención en las unidades de atención de CIJ (CIJ, 2025a).

Desde el primer semestre de 2021, el Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de CIJ realiza el seguimiento del consumo alguna vez en la vida de fentanilo y sustancias análogas en la población de primer ingreso a tratamiento, lo que permite dar cuenta del incremento del consumo, al pasar de 5 casos en el primer semestre de 2021 a 82 casos en el primer semestre de 2025 (Figura 24).

En el último semestre de seguimiento, 62 hombres y 20 mujeres reportaron el consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos, la edad promedio de inicio de uso de esta sustancia se ubicó en 20.3 años (D.E.=9.2 años). En esta población, las metanfetaminas fueron las principales sustancias que motivaron la solicitud de tratamiento (36 casos), seguidas por el fentanilo y análogos (8 casos).

El mayor número de personas que reportó el uso de fentanilo y análogos se ubicaron en la Ciudad de México y el Estado de México (Figura 25).

Figura 24. Tendencia del consumo de fentanilo y análogos, 1er semestre de 2021 – 1er semestre de 2025.





Figura 25. Estados que reportan consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos, 1er semestre de 2025.





2. Nicotina en dispositivos electrónicos (vapeadores)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS; 2025), la nicotina que contiene el tabaco es sumamente adictiva y su consumo es un importante factor de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de desarrollar diferentes tipos o subtipos de cáncer.


Los sistemas electrónicos de suministro de nicotina, comúnmente se conocen como cigarrillos electrónicos, son instrumentos que se utilizan para aerolizar sustancias sin el uso de un proceso de combustión para luego ser inhaladas. Si bien, estos dispositivos pueden contener o no nicotina, se ha encontrado que son perjudiciales para la salud (OMS, 2025; Accinelli et al., 2020).

Los sistemas electrónicos de administración de nicotina surgen en 2003 como una supuesta ayuda para dejar de fumar, sin embargo, en los últimos años ha tenido un crecimiento explosivo a nivel mundial, especialmente entre los jóvenes que se sienten atraídos por sus llamativos sabores y por el despliegue de tecnología que se utiliza en su diseño y funcionamiento (OMS, 2025).

Los sistemas electrónicos de suministro de nicotina suelen contener cantidades variables de nicotina y otras sustancias nocivas como glicidol, piridina, dimetil trisulfuro, acetoína y metilglioxal. Diversos estudios han encontrado que el uso de estos dispositivos eleva en el aire los niveles de nicotina, partículas, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, carbonilos y metales como aluminio; además de que causa inflamación, estrés oxidativo y es tóxico para múltiples tipos de células (pulmonares, endoteliales y células madre), aparte de incrementar la susceptibilidad a infecciones virales y bacterianas (Accinelli et al., 2020; Jara-Reinoso y Arráiz-De Fernández, 2024; Llambí et al., 2020; Martínez-Larenas et al., 2022).

En Centros de Integración Juvenil, el registro del consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivo electrónico se lleva a cabo desde el primer semestre de 2021, a través del cual se puede observar un incremento de más del 2300% entre el primer semestre de 2021 y el primer semestre de 2025, al pasar de 72 casos (1.1%) a 1,738 casos (15.9%), respectivamente (Figura 26).


**Figura 26. Tendencia del consumo de nicotina en dispositivo electrónico,
1er semestre de 2021 – 1er semestre de 2025.**



En el primer semestre de 2025, el consumo de nicotina en dispositivos electrónicos fue reportado en casi todos los estados del país (con excepción del estado de Tlaxcala), por 1,185 hombres (68.2%) y 553 mujeres (31.8%). La edad promedio de inicio del consumo se ubicó en 16.5 años (DE= 6.4); en 125 casos fue la sustancia que motivó la solicitud de tratamiento (7.2%) y 731 personas reportaron su consumo en los últimos 30 días (42.1%).

Al considerar la edad de ingreso a tratamiento en CIJ y el sexo de las personas con consumo de nicotina en dispositivos electrónicos, se observa que el consumo de nicotina a través de estos dispositivos electrónicos es más prevalente en las personas de menor edad y en las mujeres.

Figura 27. Consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivos electrónicos por rangos de edad y sexo.





REFERENCIAS

- Accinelli, R. A., Lam, J., & Tafur, K. B. (2020). *El cigarrillo electrónico: un problema de salud pública emergente*. Revista peruana de medicina experimental y salud pública, 37, 122-128. doi.org/10.17843/rpmesp.2020.371.4780
- Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). *Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México*. Salud Mental 31 (5), 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, A.C. (2025). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2024-2030*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/ebco2024-2030/Index.html>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2025a). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Consumidores de drogas ilícitas. Segundo semestre del 2024*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/25-1d.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2025b). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil al 2° semestre de 2024. (Nivel nacional y entidades federativas) (Nivel Nacional y Entidades Federativas)*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/25-1e.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2025c). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil al 2° semestre de 2024. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/25-1f.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2025d). *Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil al 2° semestre de 2024. (Nivel nacional y entidades federativas) [Informe de Investigación 22-04g]*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/25-1g.pdf>
- CEPAL (22 enero, 2025). Grupos en situación de vulnerabilidad. CEPAL. <https://comunidades.cepal.org/desarrollosocial/es/grupos/discusion/grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad#:~:text=Los%20grupos%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad%20abordados%20por%20la%20ARDSI,%3B%20las%20personas%20lesbianas%2C%20gais%2C>



- Clarac, P. y Wagner, F. (1987). *Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes* (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
- García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
- García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
- García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
- García-Aurrecoechea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Díaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
- García-Aurrecoechea, V. R., Gutiérrez-López, A. D., Rodríguez-Kuri, S. E., Velázquez-Altamirano, M., & Fernández-Cáceres, C. (2018). *Increasing methamphetamine use trends alert among patients in Mexico*. *Journal of Substance Use*, 23(5), 500–505. doi:10.1080/14659891.2018.1430182
- Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
- Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
- Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. (2017a). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol*. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de



México, México: INPRFM.

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud (2017b). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas*. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM.

Jara-Reinoso, M. D., & Arráiz-De-Fernández, C. (2024). *Uso del cigarrillo electrónico y riesgo de padecer enfermedades respiratorias en adolescentes y adultos jóvenes*. Ciencia y enfermería, 30. doi.org/10.29393/ce30-1ucmc20001

Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

Llambí, L., Rodríguez, D., Parodi, C., & Soto, E. (2020). *Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema controversial*. Revista Médica del Uruguay, 36(1), 153-191. doi.org/10.29193/rmu.36.1.7

Martínez-Larenas, M. V., Montañez-Aguirre, Á. A., González-Valdelamar, C. A., Fraga-Duarte, M., Cossío-Rodea, G., & Vera-López, J. C. (2022). *Efectos fisiopatológicos del cigarro electrónico: un problema de salud pública*. Neumología y cirugía de tórax, 81(2), 121-130. doi.org/10.35366/108498

Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012a). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012b). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

NIDA. (2021). El fentanilo – DrugFacts. <https://nida.nih.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-fentanilo> en 2023, July 21



Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2018). *Informe Europeo sobre Drogas 2018: Tendencias y novedades*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. (2024). *Informe de la demanda y oferta de Fentanilo en México: generalidades y situación actual*. México.

<https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/informe-de-la-demanda-y-oferta-de-fentanilo-en-mexico-generalidades-y-situacion-actual?state=published>

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2025). Tabaquismo. https://www.who.int/es/health-topics/tobacco#tab=tab_1

Ortiz A, Martínez R., Meza D. (2024). Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. *Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 76, junio de 2024*. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México. http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep_76_pdf.pdf

Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

Secretaría de Salud (2009). *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología.

Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019). *Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas*. <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/observatorio-mexicano-de-drogas-omd>

United Nations Office on Drugs and Crime (2024). *World Drug Report 2024*. New York: United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html>



Anexo



Características sociodemográficas de las personas con consumo de drogas ilícitas de primer ingreso a tratamiento a CIJ en el primer semestre de 2025

Tabla 1. Personas de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	75	0.7	53	0.7	22	0.7	2.4 : 1
Álvaro Obregón Oriente	57	0.5	47	0.6	10	0.3	4.7 : 1
Atizapán	224	2.0	145	1.8	79	2.6	1.8 : 1
Azcapotzalco	116	1.1	83	1.1	33	1.1	2.5 : 1
Benito Juárez	148	1.4	103	1.3	45	1.5	2.3 : 1
Chalco	373	3.4	247	3.1	126	4.1	2.0 : 1
Coyoacán	146	1.3	97	1.2	49	1.6	2.0 : 1
Cuajimalpa	113	1.0	73	0.9	40	1.3	1.8 : 1
Cuauhtémoc Oriente	139	1.3	102	1.3	37	1.2	2.8 : 1
Cuauhtémoc Poniente	82	0.7	54	0.7	28	0.9	1.9 : 1
Ecatepec	238	2.2	172	2.2	66	2.2	2.6 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	230	2.1	164	2.1	66	2.2	2.5 : 1
Gustavo A. Madero Norte	175	1.6	111	1.4	64	2.1	1.7 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	3	0.0	2	0.0	1	0.0	2.0 : 1
Iztapalapa Oriente	270	2.5	196	2.5	74	2.4	2.6 : 1
Iztapalapa Poniente	108	1.0	71	0.9	37	1.2	1.9 : 1
Miguel Hidalgo	124	1.1	84	1.1	40	1.3	2.1 : 1
Naucalpan	123	1.1	77	1.0	46	1.5	1.7 : 1
Nezahualcóyotl	276	2.5	194	2.5	82	2.7	2.4 : 1
Texcoco	211	1.9	150	1.9	61	2.0	2.5 : 1
Tlalnepantla	224	2.0	153	1.9	71	2.3	2.2 : 1
Tlalpan	201	1.8	150	1.9	51	1.7	2.9 : 1
Venustiano Carranza	80	0.7	60	0.8	20	0.7	3.0 : 1
UH Ecatepec	41	0.4	41	0.5	0	0.0	---
UH Iztapalapa	89	0.8	61	0.8	28	0.9	2.2 : 1
UH Naucalpan	72	0.7	57	0.7	15	0.5	3.8 : 1
Acapulco	86	0.8	61	0.8	25	0.8	2.4 : 1
Acuña	39	0.4	27	0.3	12	0.4	2.3 : 1
Aguascalientes	140	1.3	109	1.4	31	1.0	3.5 : 1
Apatzingán	18	0.2	9	0.1	9	0.3	1.0 : 1
Apodaca	10	0.1	8	0.1	2	0.1	4.0 : 1
Cancún	160	1.5	106	1.3	54	1.8	2.0 : 1
Celaya	174	1.6	115	1.5	59	1.9	1.9 : 1
Chetumal	49	0.4	41	0.5	8	0.3	5.1 : 1
Chihuahua	305	2.8	247	3.1	58	1.9	4.3 : 1
Chilpancingo	55	0.5	43	0.5	12	0.4	3.6 : 1

Continúa



Tabla 1. Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Ciudad del Carmen	45	0.4	34	0.4	11	0.4	3.1 : 1
Ciudad Juárez Norte	211	1.9	148	1.9	63	2.1	2.3 : 1
Ciudad Victoria	57	0.5	41	0.5	16	0.5	2.6 : 1
Colima	60	0.5	48	0.6	12	0.4	4.0 : 1
Cozumel	44	0.4	32	0.4	12	0.4	2.7 : 1
Cuernavaca	140	1.3	98	1.2	42	1.4	2.3 : 1
Culiacán	102	0.9	94	1.2	8	0.3	11.8 : 1
Durango	68	0.6	49	0.6	19	0.6	2.6 : 1
Escuinapa	35	0.3	22	0.3	13	0.4	1.7 : 1
Fresnillo	38	0.3	32	0.4	6	0.2	5.3 : 1
Guadalajara Centro	165	1.5	112	1.4	53	1.7	2.1 : 1
Guadalajara Sur	93	0.8	67	0.8	26	0.8	2.6 : 1
Guadalupe	87	0.8	71	0.9	16	0.5	4.4 : 1
Guadalupe Zacatecas	15	0.1	12	0.2	3	0.1	4.0 : 1
Guamúchil	41	0.4	32	0.4	9	0.3	3.6 : 1
Guanajuato	41	0.4	26	0.3	15	0.5	1.7 : 1
Guasave	51	0.5	40	0.5	11	0.4	3.6 : 1
Hermosillo	101	0.9	80	1.0	21	0.7	3.8 : 1
Huatulco	30	0.3	16	0.2	14	0.5	1.1 : 1
Ixbalanqué	17	0.2	14	0.2	3	0.1	4.7 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	72	0.7	53	0.7	19	0.6	2.8 : 1
La Paz	71	0.6	44	0.6	27	0.9	1.6 : 1
La Piedad	47	0.4	31	0.4	16	0.5	1.9 : 1
Laguna Durango	90	0.8	60	0.8	30	1.0	2.0 : 1
León	160	1.5	124	1.6	36	1.2	3.4 : 1
Los Cabos	71	0.6	49	0.6	22	0.7	2.2 : 1
Los Mochis	63	0.6	47	0.6	16	0.5	2.9 : 1
Manzanillo	37	0.3	24	0.3	13	0.4	1.8 : 1
Mazatlán	43	0.4	32	0.4	11	0.4	2.9 : 1
Mérida	87	0.8	72	0.9	15	0.5	4.8 : 1
Mexicali	99	0.9	70	0.9	29	0.9	2.4 : 1
Monterrey	147	1.3	113	1.4	34	1.1	3.3 : 1
Morelia	76	0.7	55	0.7	21	0.7	2.6 : 1
Nogales	105	1.0	69	0.9	36	1.2	1.9 : 1
Oaxaca	106	1.0	76	1.0	30	1.0	2.5 : 1
Pachuca	144	1.3	90	1.1	54	1.8	1.7 : 1
Playa del Carmen	126	1.2	78	1.0	48	1.6	1.6 : 1
Poza Rica	60	0.5	48	0.6	12	0.4	4.0 : 1
Puebla	139	1.3	101	1.3	38	1.2	2.7 : 1

Continúa



Tabla 1. Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Puerto Vallarta	100	0.9	90	1.1	10	0.3	9.0 : 1
Querétaro	131	1.2	77	1.0	54	1.8	1.4 : 1
Ramos Arizpe	32	0.3	21	0.3	11	0.4	1.9 : 1
Reynosa	71	0.6	59	0.7	12	0.4	4.9 : 1
Salamanca	56	0.5	40	0.5	16	0.5	2.5 : 1
Saltillo	180	1.6	149	1.9	31	1.0	4.8 : 1
San Luis Potosí	129	1.2	105	1.3	24	0.8	4.4 : 1
San Nicolás de los Garza	69	0.6	52	0.7	17	0.6	3.1 : 1
Tampico	101	0.9	71	0.9	30	1.0	2.4 : 1
Tapachula	57	0.5	41	0.5	16	0.5	2.6 : 1
Tecomán	39	0.4	28	0.4	11	0.4	2.5 : 1
Tehuacán	70	0.6	48	0.6	22	0.7	2.2 : 1
Tepic	20	0.2	17	0.2	3	0.1	5.7 : 1
Tijuana Guaycura	156	1.4	105	1.3	51	1.7	2.1 : 1
Tijuana Soler	114	1.0	83	1.1	31	1.0	2.7 : 1
Tlaquepaque	153	1.4	116	1.5	37	1.2	3.1 : 1
Tlaxcala	95	0.9	67	0.8	28	0.9	2.4 : 1
Toluca	179	1.6	135	1.7	44	1.4	3.1 : 1
Torreón Oriente	133	1.2	84	1.1	49	1.6	1.7 : 1
Tuxtla Gutiérrez	51	0.5	35	0.4	16	0.5	2.2 : 1
Villahermosa	62	0.6	49	0.6	13	0.4	3.8 : 1
Xalapa	98	0.9	80	1.0	18	0.6	4.4 : 1
Yucatán	65	0.6	52	0.7	13	0.4	4.0 : 1
Zacatecas	68	0.6	53	0.7	15	0.5	3.5 : 1
Zamora	57	0.5	39	0.5	18	0.6	2.2 : 1
Zapopan Norte	207	1.9	134	1.7	73	2.4	1.8 : 1
UH Cd. Juárez	17	0.2	15	0.2	2	0.1	7.5 : 1
UH Culiacán	13	0.1	13	0.2	0	0.0	---
UH Nuevo León	62	0.6	45	0.6	17	0.6	2.6 : 1
UH Punta Diamante	53	0.5	46	0.6	7	0.2	6.6 : 1
UH Tijuana	29	0.3	25	0.3	4	0.1	6.3 : 1
UH Zapopan	48	0.4	40	0.5	8	0.3	5.0 : 1
UH Zapotlán el Grande	44	0.4	31	0.4	13	0.4	2.4 : 1
UTUH Cd. Juárez	26	0.2	18	0.2	8	0.3	2.3 : 1
UTUH Tijuana	4	0.0	4	0.1	0	0.0	---
Total	10,947	100.0	7,884	100.0	3,063	100.0	2.6 : 1

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína



Tabla 2. Principales motivos de consulta declarados

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas	8,922	81.5	6,713	85.1	2,209	72.1
Consumo de alcohol	2,450	22.4	1,881	23.9	569	18.6
Consumo de tabaco	1,876	17.1	1,442	18.3	434	14.2
Trastornos mentales y conductual del niño y el adolescente	522	4.8	370	4.7	152	5.0
Ludopatía	31	0.3	27	0.3	4	0.1
Depresión	2,690	24.6	1,556	19.7	1,134	37.0
Ansiedad	2,988	27.3	1,880	23.8	1,108	36.2
Psicosis	111	1.0	85	1.1	26	0.8
Epilepsia	9	0.1	6	0.1	3	0.1
Demencia	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Autolesión	339	3.1	127	1.6	212	6.9
Suicidio (ideación o intento)	468	4.3	259	3.3	209	6.8
Otro motivo de consulta	225	2.1	163	2.1	62	2.0
<i>2 o más motivos reportados</i>	<i>5,138</i>	<i>46.9</i>	<i>3,530</i>	<i>44.8</i>	<i>1,608</i>	<i>52.5</i>

Tabla 3. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	7,884	72.0	2.6 : 1
Mujeres	3,063	28.0	
Total	10,947	100.0	

Tabla 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Hasta 9 años	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 a 14 años	1,104	10.1	695	8.8	409	13.4
15 a 19 años	4,294	39.2	3,011	38.2	1,283	41.9
20 a 24 años	1,502	13.7	1,102	14.0	400	13.1
25 a 29 años	1,166	10.7	845	10.7	321	10.5
30 a 34 años	949	8.7	719	9.1	230	7.5
35 a 39 años	648	5.9	505	6.4	143	4.7
40 a 44 años	469	4.3	369	4.7	100	3.3
45 años y más	814	7.4	637	8.1	177	5.8
Total	10,947	100.0	7,884	100.0	3,063	100.0
Media (DE)	24.4 (11.1) años		24.9 (11.4) años		22.8 (10.4) años	
Mediana	20 años		21 años		18 años	
Moda	16 años		16 años		16 años	
Decil ₁	14 años		15 años		14 años	

DE= Desviación Estándar

Tabla 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,332	76.1	76.1	5,921	75.1	75.1	2,411	78.7	78.8
Casado	810	7.4	7.4	666	8.4	8.4	144	4.7	4.7
Unión libre	1,217	11.1	11.1	883	11.2	11.2	334	10.9	10.9
Separado	406	3.7	3.7	300	3.8	3.8	106	3.5	3.5
Divorciado	127	1.2	1.2	93	1.2	1.2	34	1.1	1.1
Viudo	51	0.5	0.5	19	0.2	0.2	32	1.0	1.0
<i>Sin información</i>	4	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0

Tabla 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin estudios	43	0.4	0.4	29	0.4	0.4	14	0.5	0.5
Primaria no concluida	168	1.5	1.5	136	1.7	1.7	32	1.0	1.0
Primaria concluida	430	3.9	3.9	322	4.1	4.1	108	3.5	3.5
Secundaria no concluida	1,865	17.0	17.1	1,282	16.3	16.3	583	19.0	19.1
Secundaria concluida	1,822	16.6	16.7	1,380	17.5	17.5	442	14.4	14.5
Bachillerato no concluido	3,482	31.8	31.9	2,472	31.4	31.4	1,010	33.0	33.0
Bachillerato concluido	1,237	11.3	11.3	937	11.9	11.9	300	9.8	9.8
Estudios técnicos o comerciales no concluidos	121	1.1	1.1	80	1.0	1.0	41	1.3	1.3
Estudios técnicos o comerciales concluidos	127	1.2	1.2	83	1.1	1.1	44	1.4	1.4
Estudios superiores no concluidos	951	8.7	8.7	677	8.6	8.6	274	8.9	9.0
Estudios superiores concluidos	606	5.5	5.5	415	5.3	5.3	191	6.2	6.2
Estudios de posgrado no concluidos	34	0.3	0.3	21	0.3	0.3	13	0.4	0.4
Estudios de posgrado concluidos	45	0.4	0.4	39	0.5	0.5	6	0.2	0.2
<i>Sin información</i>	16	0.1	<i>Se omite</i>	11	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0

Tabla 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	1,965	18.0	18.1	1,503	19.1	19.2	462	15.1	15.2
Estudiante	3,902	35.6	35.9	2,534	32.1	32.4	1,368	44.7	45.0
Estudiante que trabaja	820	7.5	7.5	633	8.0	8.1	187	6.1	6.1
Trabaja	3,708	33.9	34.1	3,024	38.4	38.6	684	22.3	22.5
Tareas del hogar	421	3.8	3.9	83	1.1	1.1	338	11.0	11.1
Pensionado	55	0.5	0.5	51	0.6	0.7	4	0.1	0.1
<i>Sin información</i>	76	0.7	<i>Se omite</i>	56	0.7	<i>Se omite</i>	20	0.7	<i>Se omite</i>
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0



Tabla 8. Estrato social

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Alto	37	0.3	31	0.4	6	0.2
Medio alto	597	5.5	446	5.7	151	4.9
Medio bajo	5,960	54.4	4,270	54.2	1,690	55.2
Bajo	3,914	35.8	2,835	36.0	1,079	35.2
Muy bajo	439	4.0	302	3.8	137	4.5
Total	10,947	100.0	7,884	100.0	3,063	100.0

Tabla 9. Población en situación de vulnerabilidad

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Pertenece a la comunidad LGBTI	661	6.0	317	4.0	344	11.2
Se considera miembro de alguna comunidad indígena	105	1.0	85	1.1	20	0.7
Se considera miembro de alguna población afrodescendiente	23	0.2	17	0.2	6	0.2
Tiene alguna discapacidad	196	1.8	140	1.8	56	1.8
Ha migrado a otro país en los últimos 12 meses	96	0.9	75	1.0	21	0.7
Ha vivido en condición de migrante en Estados Unidos un año o más	188	1.7	158	2.0	30	1.0



Características del consumo de drogas en personas de primer ingreso a tratamiento en CIJ en el primer semestre de 2025

Tabla 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones

Sustancia		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	347	3.2	3.6	245	3.1	3.4	102	3.3	4.2
	Nicotina en dispositivo electrónico	125	1.1	1.3	72	0.9	1.0	53	1.7	2.2
Alcohol	Bebidas fermentadas	754	6.9	7.8	560	7.1	7.8	194	6.3	7.9
	Bebidas destiladas	373	3.4	3.9	263	3.3	3.6	110	3.6	4.5
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	14	0.1	0.1	11	0.1	0.2	3	0.1	0.1
Cannabis	Mariguana "estándar"	2,501	22.8	25.8	2,009	25.5	27.8	492	16.1	20.0
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	157	1.4	1.6	124	1.6	1.7	33	1.1	1.3
	Hachís - Resina	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Hachís – Aceite o miel	38	0.3	0.4	27	0.3	0.4	11	0.4	0.4
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	32	0.3	0.3	26	0.3	0.4	6	0.2	0.2
	Medicamentos con compuestos cannábicos	5	0.0	0.1	4	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	143	1.3	1.5	118	1.5	1.6	25	0.8	1.0
	Pegamentos	34	0.3	0.4	29	0.4	0.4	5	0.2	0.2
	Esmaltes y pinturas	5	0.0	0.1	4	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Gasolinas y combustibles	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otros inhalables	27	0.2	0.3	22	0.3	0.3	5	0.2	0.2
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	530	4.8	5.5	438	5.6	6.1	92	3.0	3.7
	Crack	282	2.6	2.9	252	3.2	3.5	30	1.0	1.2
	Basuco (pasta base de cocaína)	8	0.1	0.1	8	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	3,909	35.7	40.4	2,736	34.7	37.9	1,173	38.3	47.8
	Metanfetaminas: hielo	29	0.3	0.3	20	0.3	0.3	9	0.3	0.4
	Metanfetaminas: "Metas"	14	0.1	0.1	11	0.1	0.2	3	0.1	0.1
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	28	0.3	0.3	27	0.3	0.4	1	0.0	0.0
	Anorexígenos	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Otros estimulantes	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0

Continúa



**Tabla 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto),
según menciones**
(Continuación)

Sustancia		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alucinógenos	LSD	23	0.2	0.2	17	0.2	0.2	6	0.2	0.2
	Hongos alucinógenos	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Ayahuasca	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Ketamina	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	11	0.1	0.1	9	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	5	0.0	0.1	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	102	0.9	1.1	58	0.7	0.8	44	1.4	1.8
	Rohypnol	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	GHB o similares	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Sedantes hipnóticos	10	0.1	0.1	5	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Otros depresores	Otros depresores del SNC	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Heroína	Heroína blanca	11	0.1	0.1	10	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Heroína negra o morena	38	0.3	0.4	34	0.4	0.5	4	0.1	0.2
Opioides	Opioides sintéticos	12	0.1	0.1	7	0.1	0.1	5	0.2	0.2
	Fentanilo y análogos	14	0.1	0.1	12	0.2	0.2	2	0.1	0.1
	Derivados opioides combinados con analgésicos	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Opiáceos	Morfina	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	0.1	0.2
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticonvulsivos	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Antidepresivos	10	0.1	0.1	4	0.1	0.1	6	0.2	0.2
	Antihistamínicos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	12	0.1	0.1	9	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	Nitritos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	17	0.2	0.2	10	0.1	0.1	7	0.2	0.3
	Sustancias no clasificadas	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Sustancias sin especificar	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Ninguna		1,269	11.6	Se omite	661	8.4	Se omite	608	19.8	Se omite
Total		10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0



Tabla 11. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	211	1.9	2.8	171	2.2	3.1	40	1.3	2.0
10 a 14 años	3,430	31.3	45.6	2,534	32.1	45.9	896	29.3	44.7
15 a 19 años	3,304	30.2	43.9	2,427	30.8	44.0	877	28.6	43.8
20 a 24 años	372	3.4	4.9	251	3.2	4.5	121	4.0	6.0
25 a 29 años	118	1.1	1.6	78	1.0	1.4	40	1.3	2.0
30 a 34 años	45	0.4	0.6	32	0.4	0.6	13	0.4	0.6
35 a 39 años	21	0.2	0.3	11	0.1	0.2	10	0.3	0.5
40 a 44 años	12	0.1	0.2	9	0.1	0.2	3	0.1	0.1
45 años y más	12	0.1	0.2	9	0.1	0.2	3	0.1	0.1
No consumió	3,422	31.3	Se omite	2,362	30.0	Se omite	1,060	34.6	Se omite
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0
Media (DE)	15.0 (3.9) años			14.9 (3.9) años			15.4 (4.1) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil ₁	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 12. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	338	3.1	4.0	247	3.1	4.0	91	3.0	3.9
10 a 14 años	3,665	33.5	42.8	2,635	33.4	42.5	1,030	33.6	43.6
15 a 19 años	4,110	37.5	48.0	3,005	38.1	48.5	1,105	36.1	46.8
20 a 24 años	336	3.1	3.9	241	3.1	3.9	95	3.1	4.0
25 a 29 años	71	0.6	0.8	50	0.6	0.8	21	0.7	0.9
30 a 34 años	19	0.2	0.2	8	0.1	0.1	11	0.4	0.5
35 a 39 años	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
40 a 44 años	8	0.1	0.1	2	0.0	0.0	6	0.2	0.3
45 años y más	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	2,385	21.8	Se omite	1,686	21.4	Se omite	699	22.8	Se omite
Sin información	6	0.1	Se omite	5	0.1	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0
Media (DE)	14.7 (3.3) años			14.7 (3.1) años			14.8 (3.6) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil ₁	12 años			12 años			11 años		

DE= Desviación Estándar



Tabla 13. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	95	0.9	0.9	83	1.1	1.1	12	0.4	0.4
10 a 14 años	3,992	36.5	36.5	2,905	36.8	36.9	1,087	35.5	35.5
15 a 19 años	5,063	46.3	46.3	3,644	46.2	46.2	1,419	46.3	46.4
20 a 24 años	906	8.3	8.3	668	8.5	8.5	238	7.8	7.8
25 a 29 años	386	3.5	3.5	257	3.3	3.3	129	4.2	4.2
30 a 34 años	213	1.9	1.9	143	1.8	1.8	70	2.3	2.3
35 a 39 años	129	1.2	1.2	85	1.1	1.1	44	1.4	1.4
40 a 44 años	60	0.5	0.5	38	0.5	0.5	22	0.7	0.7
45 años y más	97	0.9	0.9	57	0.7	0.7	40	1.3	1.3
<i>Sin información</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	4	0.1	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0
Media (DE)	16.8 (5.9) años			16.6 (5.7) años			17.2 (6.5) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil ₁	12 años			12 años			13 años		

DE= Desviación Estándar



Tabla 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones

Sustancia		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	Mariguana "estándar"	6,708	61.3	5,020	63.7	1,688	55.1
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	222	2.0	165	2.1	57	1.9
	Hachís - Resina	9	0.1	7	0.1	2	0.1
	Hachís - Aceite o miel	54	0.5	34	0.4	20	0.7
Sus. asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	61	0.6	42	0.5	19	0.6
	Medicamentos con compuestos cannábicos	8	0.1	6	0.1	2	0.1
Inhalables	Solventes y removedores	242	2.2	191	2.4	51	1.7
	Pegamentos	72	0.7	59	0.7	13	0.4
	Esmaltes y pinturas	12	0.1	11	0.1	1	0.0
	Gasolinas y combustibles	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	Otros inhalables	56	0.5	47	0.6	9	0.3
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	805	7.4	639	8.1	166	5.4
	Crack	113	1.0	87	1.1	26	0.8
	Basuco (pasta base de cocaína)	13	0.1	12	0.2	1	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	1,947	17.8	1,164	14.8	783	25.6
	Metanfetaminas: hielo	16	0.1	9	0.1	7	0.2
	Metanfetaminas: "Metas"	18	0.2	12	0.2	6	0.2
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	32	0.3	29	0.4	3	0.1
	Anorexígenos	4	0.0	3	0.0	1	0.0
	Drogas de diseño con efecto estimulante	3	0.0	1	0.0	2	0.1
	Otros estimulantes	9	0.1	8	0.1	1	0.0
Alucinógenos	LSD	31	0.3	24	0.3	7	0.2
	Hongos alucinógenos	10	0.1	7	0.1	3	0.1
	Peyote (mezcalina)	2	0.0	1	0.0	1	0.0
	Salvia divinorum u otras variedades de salvia	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Ayahuasca	2	0.0	0	0.0	2	0.1
	Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	18	0.2	14	0.2	4	0.1
	DMT	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0

Continúa



Tabla 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones
(Continuación)

Sustancia		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	11	0.1	6	0.1	5	0.2
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	144	1.3	67	0.8	77	2.5
	Rohypnol	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	8	0.1	2	0.0	6	0.2
	Otros depresores del SNC	14	0.1	9	0.1	5	0.2
Heroína	Heroína blanca	5	0.0	4	0.1	1	0.0
	Heroína negra o morena	11	0.1	10	0.1	1	0.0
Opioides	Morfina (uso fuera de prescripción)	6	0.1	1	0.0	5	0.2
	Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opiáceos	Opioides sintéticos (uso fuera de prescripción)	4	0.0	2	0.0	2	0.1
	Fentanilo y análogos (uso fuera de prescripción)	5	0.0	2	0.0	3	0.1
	Derivados Opioides combinados con analgésicos Anticolinérgicos	6	0.1	3	0.0	3	0.1
Sustancias de abuso con utilidad médica	Antiespasmódicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Anticonvulsivos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Antidepresivos	12	0.1	7	0.1	5	0.2
	Antipsicóticos o neurolépticos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Antihistamínicos	2	0.0	1	0.0	1	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	16	0.1	11	0.1	5	0.2
Otras sustancias de abuso	Nitritos	8	0.1	6	0.1	2	0.1
	Bebidas energizantes	198	1.8	139	1.8	59	1.9
	Sustancias no clasificadas	5	0.0	1	0.0	4	0.1
	Sustancias sin especificar	5	0.0	5	0.1	0	0.0
Total		10,947	100.0	7,884	100.0	3,063	100.0



Tabla 15. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	313	2.9	4.2	211	2.7	3.8	102	3.3	5.1
1 a 5 años	3,448	31.5	45.8	2,415	30.6	43.7	1,033	33.7	51.6
6 a 10 años	1,190	10.9	15.8	878	11.1	15.9	312	10.2	15.6
11 a 15 años	823	7.5	10.9	624	7.9	11.3	199	6.5	9.9
16 a 20 años	608	5.6	8.1	468	5.9	8.5	140	4.6	7.0
21 a 25 años	398	3.6	5.3	311	3.9	5.6	87	2.8	4.3
26 o más años	745	6.8	9.9	615	7.8	11.1	130	4.2	6.5
No consumió	3,422	31.3	Se omite	2,362	30.0	Se omite	1,060	34.6	Se omite
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0
Media (DE)	9.8 (10.3) años			10.4 (10.7) años			8.1 (9.1) años		
Mediana	6 años			6 años			4 años		
Moda	2 año			2 año			2 año		
Decil ₁	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Tabla 16. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	284	2.6	3.3	187	2.4	3.0	97	3.2	4.1
1 a 5 años	3,628	33.1	42.4	2,515	31.9	40.6	1,113	36.3	47.1
6 a 10 años	1,485	13.6	17.4	1,054	13.4	17.0	431	14.1	18.2
11 a 15 años	980	9.0	11.5	727	9.2	11.7	253	8.3	10.7
16 a 20 años	775	7.1	9.1	584	7.4	9.4	191	6.2	8.1
21 a 25 años	492	4.5	5.8	378	4.8	6.1	114	3.7	4.8
26 o más años	912	8.3	10.7	748	9.5	12.1	164	5.4	6.9
No consumió	2,385	21.8	Se omite	1,686	21.4	Se omite	699	22.8	Se omite
Sin información	6	0.1	Se omite	5	0.1	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0
Media (DE)	10.5 (10.5) años			11.1 (10.9) años			8.8 (9.1) años		
Mediana	7 años			7 años			5 años		
Moda	2 años			2 años			1 año		
Decil ₁	1 año			1 años			1 año		

DE= Desviación Estándar



Tabla 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,149	10.5	10.5	717	9.1	9.1	432	14.1	14.1
1 a 5 años	5,354	48.9	48.9	3,686	46.8	46.8	1,668	54.5	54.5
6 a 10 años	1,599	14.6	14.6	1,206	15.3	15.3	393	12.8	12.8
11 a 15 años	1,059	9.7	9.7	795	10.1	10.1	264	8.6	8.6
16 a 20 años	648	5.9	5.9	519	6.6	6.6	129	4.2	4.2
21 a 25 años	394	3.6	3.6	328	4.2	4.2	66	2.2	2.2
26 o más años	738	6.7	6.7	629	8.0	8.0	109	3.6	3.6
<i>Sin información</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	4	0.1	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0
Media (DE)	7.6 (9.2) años			8.3 (9.7) años			5.7 (7.5) años		
Mediana	4 años			4 años			2 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil ₁	< 1 año			1 año			< 1 año		

DE= Desviación Estándar

Tabla 18. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,456	13.3	13.3	909	11.5	11.5	547	17.9	17.9
Social u ocasional	1,635	14.9	14.9	1,092	13.9	13.9	543	17.7	17.7
Funcional	4,887	44.6	44.7	3,659	46.4	46.4	1,228	40.1	40.1
Disfuncional	2,153	19.7	19.7	1,650	20.9	20.9	503	16.4	16.4
En remisión	810	7.4	7.4	571	7.2	7.2	239	7.8	7.8
<i>Sin información</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	3	0.1	<i>Se omite</i>
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0



**Tabla 19. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	1,065	9.7	701	8.9	364	11.9
2 sustancias	1,470	13.4	1,016	12.9	454	14.8
3 sustancias	2,214	20.2	1,521	19.3	693	22.6
4 sustancias	2,177	19.9	1,524	19.3	653	21.3
5 sustancias	1,556	14.2	1,159	14.7	397	13.0
6 sustancias	1,040	9.5	823	10.4	217	7.1
7 sustancias	560	5.1	451	5.7	109	3.6
8 sustancias	376	3.4	287	3.6	89	2.9
9 sustancias	211	1.9	162	2.1	49	1.6
10 sustancias	105	1.0	87	1.1	18	0.6
11-22 sustancias	173	1.6	153	1.9	20	0.7
Total	10,947	100.0	7,884	100.0	3,063	100.0
Media (DE)	4.1 (2.3) drogas		4.3 (2.3) drogas		3.8 (2.0) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		4 drogas		3 drogas	
Decil ₁	2 drogas		2 drogas		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Tabla 20. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,598	42.0	3,043	38.6	1,555	50.8
2 sustancias	2,739	25.0	1,993	25.3	746	24.4
3 sustancias	1,639	15.0	1,259	16.0	380	12.4
4 sustancias	878	8.0	695	8.8	183	6.0
5 sustancias	517	4.7	410	5.2	107	3.5
6 sustancias	262	2.4	214	2.7	48	1.6
7 sustancias	127	1.2	108	1.4	19	0.6
8 sustancias	86	0.8	71	0.9	15	0.5
9 sustancias	54	0.5	50	0.6	4	0.1
10 sustancias	18	0.2	15	0.2	3	0.1
11-18 sustancias	29	0.3	26	0.3	3	0.1
Total	10,947	100.0	7,884	100.0	3,063	100.0
Media (DE)	2.3 (1.7) drogas		2.4 (1.8) drogas		2.0 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar



Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	7,525	68.7	5,522	70.0	2,003	65.4
Tabaco	6,983	63.8	5,196	65.9	1,787	58.3
Nicotina en dispositivo electrónico	1,738	15.9	1,185	15.0	553	18.1
Alcohol	8,562	78.2	6,198	78.6	2,364	77.2
Bebidas fermentadas	6,922	63.2	5,109	64.8	1,813	59.2
Bebidas destiladas	4,346	39.7	3,045	38.6	1,301	42.5
Alcohol puro ("alcohol del 96")	132	1.2	95	1.2	37	1.2
Cannabis	8,370	76.5	6,190	78.5	2,180	71.2
Mariguana "estándar"	8,077	73.8	5,976	75.8	2,101	68.6
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	481	4.4	362	4.6	119	3.9
Hachís - Resina	122	1.1	103	1.3	19	0.6
Hachís - Aceite o miel	171	1.6	125	1.6	46	1.5
Sustancias similares al cannabis	140	1.3	106	1.3	34	1.1
"Mariguana" sintética	121	1.1	92	1.2	29	0.9
Medicamentos con compuestos cannábicos	19	0.2	14	0.2	5	0.2
Inhalables	1,358	12.4	1,123	14.2	235	7.7
Solventes y removedores	845	7.7	697	8.8	148	4.8
Pegamentos	284	2.6	248	3.1	36	1.2
Esmaltes y pinturas	73	0.7	64	0.8	9	0.3
Gasolinas y combustibles	17	0.2	14	0.2	3	0.1
Otros inhalables	242	2.2	196	2.5	46	1.5
Cocaína	4,066	37.1	3,243	41.1	823	26.9
Cocaína (clorhidrato)	3,698	33.8	2,946	37.4	752	24.6
Crack	930	8.5	802	10.2	128	4.2
Otro tipo de cocaína	135	1.2	109	1.4	26	0.8
Basuco (pasta base de cocaína)	51	0.5	48	0.6	3	0.1
Otras presentaciones de cocaína	85	0.8	62	0.8	23	0.8
Metanfetaminas	5,665	51.7	4,076	51.7	1,589	51.9
Metanfetaminas: cristal	5,571	50.9	4,010	50.9	1,561	51.0
Metanfetaminas: hielo	58	0.5	42	0.5	16	0.5
Metanfetaminas: "Metas"	143	1.3	107	1.4	36	1.2
Otros estimulantes del SNC	187	1.7	142	1.8	45	1.5
Sales de baño	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Anfetaminas y derivados	107	1.0	88	1.1	19	0.6
Anorexígenos	13	0.1	8	0.1	5	0.2
Drogas de diseño con efectos estimulantes	34	0.3	18	0.2	16	0.5
Otros estimulantes	36	0.3	29	0.4	7	0.2

Continúa

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	314	2.9	243	3.1	71	2.3
Éxtasis (MDMA)	299	2.7	232	2.9	67	2.2
Sustancias con efectos similares a MDMA	18	0.2	14	0.2	4	0.1
Drogas de diseño con efectos similares	17	0.2	13	0.2	4	0.1
Piperazinas con efectos similares	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	906	8.3	678	8.6	228	7.4
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	898	8.2	671	8.5	227	7.4
Rohypnol	17	0.2	15	0.2	2	0.1
Otros depresores del SNC	93	0.8	57	0.7	36	1.2
GHB o similares	8	0.1	6	0.1	2	0.1
Sedantes hipnóticos	45	0.4	24	0.3	21	0.7
Otros depresores del SNC	40	0.4	27	0.3	13	0.4
Alucinógenos	1,325	12.1	1,029	13.1	296	9.7
LSD /LSA	1,026	9.4	786	10.0	240	7.8
LSD	1,024	9.4	785	10.0	239	7.8
LSA	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	466	4.3	360	4.6	106	3.5
Hongos alucinógenos	361	3.3	274	3.5	87	2.8
Peyote (mezcalina)	94	0.9	79	1.0	15	0.5
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	52	0.5	44	0.6	8	0.3
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	12	0.1	10	0.1	2	0.1
Ayahuasca	30	0.3	24	0.3	6	0.2
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	14	0.1	11	0.1	3	0.1
Alucinógenos sintéticos	233	2.1	191	2.4	42	1.4
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	25	0.2	21	0.3	4	0.1
Dextrometorfano	152	1.4	129	1.6	23	0.8
DMT	56	0.5	41	0.5	15	0.5
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogos del DMT	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Grupo 2C x	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	9	0.1	9	0.1	0	0.0

Continúa



Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	148	1.4	125	1.6	23	0.8
Heroína blanca	61	0.6	48	0.6	13	0.4
Heroína negra o morena	89	0.8	79	1.0	10	0.3
Opioides (uso fuera de prescripción)	155	1.4	120	1.5	35	1.1
Oxicodona	5	0.0	5	0.1	0	0.0
Opioides sintéticos	45	0.4	35	0.4	10	0.3
Fentanilo y análogos	82	0.7	62	0.8	20	0.7
Derivados opioides combinados con analgésicos	25	0.2	20	0.3	5	0.2
Desomorfina	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opiáceos	38	0.3	26	0.3	12	0.4
Opio	15	0.1	11	0.1	4	0.1
Morfina (uso fuera de prescripción)	13	0.1	6	0.1	7	0.2
Codeína (uso fuera de prescripción)	12	0.1	11	0.1	1	0.0
Sustancias de uso médico	170	1.6	110	1.4	60	2.0
Anticolinérgicos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Antiespasmódicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Antidepresivos	87	0.8	61	0.8	26	0.8
Antipsicóticos o neurolépticos	7	0.1	2	0.0	5	0.2
Antihistamínicos	10	0.1	5	0.1	5	0.2
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	61	0.6	40	0.5	21	0.7
Otras sustancias de abuso	372	3.4	277	3.5	95	3.1
Nitritos	49	0.4	40	0.5	9	0.3
Anestésicos	5	0.0	4	0.1	1	0.0
Bebidas energizantes	304	2.8	226	2.9	78	2.5
Drogas o bebidas inteligentes	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Esteroides anabólicos	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Sustancias no clasificadas	13	0.1	8	0.1	5	0.2
Sustancias sin especificar	10	0.1	8	0.1	2	0.1

**Tabla 22. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	341	3.1	195	2.5	146	4.8
1 sustancia	1,888	17.2	1,220	15.5	668	21.8
2 sustancias	2,518	23.0	1,771	22.5	747	24.4
3 sustancias	2,552	23.3	1,915	24.3	637	20.8
4 sustancias	1,799	16.4	1,330	16.9	469	15.3
5 sustancias	984	9.0	772	9.8	212	6.9
6 sustancias	470	4.3	379	4.8	91	3.0
7 sustancias	190	1.7	149	1.9	41	1.3
8 sustancias	111	1.0	78	1.0	33	1.1
9 sustancias	58	0.5	46	0.6	12	0.4
10 sustancias	19	0.2	17	0.2	2	0.1
11-15 sustancias	17	0.2	12	0.2	5	0.2
Total	10,947	100.0	7,884	100.0	3,063	100.0
Media (DE)	3.0 (1.7) drogas		3.1 (1.7) drogas		2.7 (1.7) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		2 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		2 drogas	
Decil ₁	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Tabla 23. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,442	13.2	866	11.0	576	18.8
1 sustancia	5,299	48.4	3,784	48.0	1,515	49.5
2 sustancias	2,535	23.2	1,915	24.3	620	20.2
3 sustancias	1,020	9.3	819	10.4	201	6.6
4 sustancias	380	3.5	292	3.7	88	2.9
5 sustancias	157	1.4	118	1.5	39	1.3
6 sustancias	65	0.6	51	0.6	14	0.5
7 sustancias	25	0.2	22	0.3	3	0.1
8 sustancias	13	0.1	9	0.1	4	0.1
9 sustancias	6	0.1	5	0.1	1	0.0
10 sustancias	2	0.0	1	0.0	1	0.0
11-12 sustancias	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Total	10,947	100.0	7,884	100.0	3,063	100.0
Media (DE)	1.5 (1.2) drogas		1.6 (1.2) drogas		1.3 (1.1) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar



Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,185	56.5	4,650	59.0	1,535	50.1
Tabaco	5,616	51.3	4,296	54.5	1,320	43.1
Nicotina en dispositivo electrónico	1,311	12.0	903	11.5	408	13.3
Alcohol	7,284	66.5	5,321	67.5	1,963	64.1
Bebidas fermentadas	5,760	52.6	4,305	54.6	1,455	47.5
Bebidas destiladas	3,364	30.7	2,355	29.9	1,009	32.9
Alcohol puro ("alcohol del 96")	90	0.8	61	0.8	29	0.9
Cannabis	6,038	55.2	4,594	58.3	1,444	47.1
Mariguana "estándar"	5,766	52.7	4,394	55.7	1,372	44.8
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	393	3.6	303	3.8	90	2.9
Hachís - Resina	39	0.4	32	0.4	7	0.2
Hachís - Aceite o miel	126	1.2	92	1.2	34	1.1
Sustancias similares al cannabis	97	0.9	73	0.9	24	0.8
"Mariguana" sintética	84	0.8	63	0.8	21	0.7
Medicamentos con compuestos cannábicos	13	0.1	10	0.1	3	0.1
Inhalables	644	5.9	528	6.7	116	3.8
Solventes y removedores	409	3.7	339	4.3	70	2.3
Pegamentos	113	1.0	95	1.2	18	0.6
Esmaltes y pinturas	29	0.3	26	0.3	3	0.1
Gasolinas y combustibles	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Otros inhalables	112	1.0	88	1.1	24	0.8
Cocaína	2,340	21.4	1,886	23.9	454	14.8
Cocaína (clorhidrato)	2,005	18.3	1,601	20.3	404	13.2
Crack	506	4.6	441	5.6	65	2.1
Otro tipo de cocaína	60	0.5	47	0.6	13	0.4
Basuco (pasta base de cocaína)	17	0.2	15	0.2	2	0.1
Otras presentaciones de cocaína	43	0.4	32	0.4	11	0.4
Metanfetaminas	4,791	43.8	3,415	43.3	1,376	44.9
Metanfetaminas: cristal	4,732	43.2	3,370	42.7	1,362	44.5
Metanfetaminas: hielo	41	0.4	31	0.4	10	0.3
Metanfetaminas: "Metas"	61	0.6	48	0.6	13	0.4
Otros estimulantes del SNC	113	1.0	87	1.1	26	0.8
Sales de baño	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Anfetaminas y derivados	67	0.6	56	0.7	11	0.4
Anorexígenos	7	0.1	4	0.1	3	0.1
Drogas de diseño con efectos estimulantes	20	0.2	12	0.2	8	0.3
Otros estimulantes	22	0.2	16	0.2	6	0.2

Continúa



Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	98	0.9	69	0.9	29	0.9
Éxtasis (MDMA)	92	0.8	65	0.8	27	0.9
Sustancias con efectos similares a MDMA	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Drogas de diseño con efectos similares	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Piperazinas con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	520	4.8	367	4.7	153	5.0
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	517	4.7	365	4.6	152	5.0
Rohypnol	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Otros depresores del SNC	59	0.5	35	0.4	24	0.8
GHB o similares	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Sedantes hipnóticos	28	0.3	14	0.2	14	0.5
Otros depresores del SNC	27	0.2	19	0.2	8	0.3
Alucinógenos	527	4.8	385	4.9	142	4.6
LSD /LSA	386	3.5	272	3.5	114	3.7
LSD	385	3.5	272	3.5	113	3.7
LSA	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	110	1.0	79	1.0	31	1.0
Hongos alucinógenos	92	0.8	66	0.8	26	0.8
Peyote (mezcalina)	10	0.1	10	0.1	0	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Ayahuasca	5	0.0	3	0.0	2	0.1
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Alucinógenos sintéticos	112	1.0	89	1.1	23	0.8
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	12	0.1	10	0.1	2	0.1
Dextrometorfano	88	0.8	73	0.9	15	0.5
DMT	12	0.1	6	0.1	6	0.2
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	5	0.0	5	0.1	0	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	4	0.0	4	0.1	0	0.0

Continúa



Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	65	0.6	57	0.7	8	0.3
Heroína blanca	18	0.2	15	0.2	3	0.1
Heroína negra o morena	47	0.4	42	0.5	5	0.2
Opioides (uso fuera de prescripción)	112	1.0	83	1.1	29	0.9
Oxicodona	4	0.0	4	0.1	0	0.0
Opioides sintéticos	32	0.3	22	0.3	10	0.3
Fentanilo y análogos	58	0.5	44	0.6	14	0.5
Derivados opioides combinados con analgésicos	18	0.2	13	0.2	5	0.2
Desomorfina	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opiáceos	13	0.1	7	0.1	6	0.2
Opio	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	7	0.1	1	0.0	6	0.2
Codeína (uso fuera de prescripción)	5	0.0	5	0.1	0	0.0
Sustancias de uso médico	111	1.0	72	0.9	39	1.3
Anticolinérgicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiespasmódicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Antidepresivos	56	0.5	40	0.5	16	0.5
Antipsicóticos o neurolepticos	7	0.1	2	0.0	5	0.2
Antihistamínicos	7	0.1	3	0.0	4	0.1
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	38	0.3	26	0.3	12	0.4
Otras sustancias de abuso	287	2.6	212	2.7	75	2.4
Nitritos	28	0.3	20	0.3	8	0.3
Anestésicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Bebidas energizantes	246	2.2	184	2.3	62	2.0
Drogas o bebidas inteligentes	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	10	0.1	6	0.1	4	0.1
Sustancias sin especificar	5	0.0	4	0.1	1	0.0



Tabla 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

Sustancia		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	809	7.4	8.5	601	7.6	8.5	208	6.8	8.5
	Nicotina en dispositivo electrónico	255	2.3	2.7	165	2.1	2.3	90	2.9	3.7
Alcohol	Bebidas fermentadas	1,013	9.3	10.7	741	9.4	10.5	272	8.9	11.1
	Bebidas destiladas	454	4.1	4.8	308	3.9	4.4	146	4.8	6.0
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	13	0.1	0.1	10	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Cannabis	Mariguana "estándar"	2,739	25.0	28.9	2,230	28.3	31.6	509	16.6	20.8
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	163	1.5	1.7	127	1.6	1.8	36	1.2	1.5
	Hachís - Resina	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Hachís – Aceite o miel	27	0.2	0.3	21	0.3	0.3	6	0.2	0.2
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	39	0.4	0.4	31	0.4	0.4	8	0.3	0.3
	Medicamentos con compuestos cannábicos	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	109	1.0	1.1	87	1.1	1.2	22	0.7	0.9
	Pegamentos	25	0.2	0.3	21	0.3	0.3	4	0.1	0.2
	Esmaltes y pinturas	5	0.0	0.1	4	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Gasolinas y combustibles	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otros inhalables	19	0.2	0.2	15	0.2	0.2	4	0.1	0.2
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	404	3.7	4.3	335	4.2	4.8	69	2.3	2.8
	Crack	200	1.8	2.1	177	2.2	2.5	23	0.8	0.9
	Basuco (pasta base de cocaína)	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Otras presentaciones de cocaína	5	0.0	0.1	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	2,882	26.3	30.4	1,935	24.5	27.5	947	30.9	38.7
	Metanfetaminas: hielo	23	0.2	0.2	18	0.2	0.3	5	0.2	0.2
	Metanfetaminas: "Metas"	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	16	0.1	0.2	15	0.2	0.2	1	0.0	0.0
	Anorexígenos	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	6	0.1	0.1	3	0.0	0.0	3	0.1	0.1
	Otros estimulantes	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.0	0.0

Continúa

Tabla 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

(Continuación)

Sustancia		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alucinógenos	LSD	16	0.1	0.2	9	0.1	0.1	7	0.2	0.3
	Hongos alucinógenos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Peyote (mezcalina)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Ayahuasca	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Ketamina	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Dextrometorfano	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	DMT	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	71	0.6	0.7	38	0.5	0.5	33	1.1	1.4
	Rohypnol	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Sedantes hipnóticos	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otros depresores	Otros depresores del SNC	8	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Heroína	Heroína blanca	9	0.1	0.1	9	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Heroína negra o morena	37	0.3	0.4	34	0.4	0.5	3	0.1	0.1
Opioides	Oxicodona	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Opioides sintéticos	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Fentanilo y análogos	11	0.1	0.1	10	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Derivados opioides combinados con analgésicos	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Desomorfina	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	Morfina (uso fuera de prescripción)	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	0.1	0.2
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticonvulsivos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Antidepresivos	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Antihistamínicos	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	Nitritos	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Anestésicos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	32	0.3	0.3	22	0.3	0.3	10	0.3	0.4
	Sustancias no clasificadas	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Ninguna		1,034	9.4	Se omite	582	7.4	Se omite	452	14.8	Se omite
No aplica (Sin consumo en los últimos 12 meses)		341	3.1	Se omite	195	2.5	Se omite	146	4.8	Se omite
Sin información		79	0.7	Se omite	58	0.7	Se omite	21	0.7	Se omite
Total		10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0



**Tabla 26. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	3,691	33.7	58.4	2,895	36.7	61.1	796	26.0	50.4
No combinó drogas	2,625	24.0	41.6	1,843	23.4	38.9	782	25.5	49.6
<i>No aplica</i>	<i>4,631</i>	<i>42.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>3,146</i>	<i>39.9</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,485</i>	<i>48.5</i>	<i>Se omite</i>
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0

**Tabla 27. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,966	18.0	1,250	15.9	716	23.4
1 sustancia	3,109	28.4	2,125	27.0	984	32.1
2 sustancias	2,724	24.9	2,019	25.6	705	23.0
3 sustancias	1,847	16.9	1,445	18.3	402	13.1
4 sustancias	844	7.7	678	8.6	166	5.4
5 sustancias	304	2.8	249	3.2	55	1.8
6 sustancias	98	0.9	72	0.9	26	0.8
7 sustancias	33	0.3	25	0.3	8	0.3
8 sustancias	14	0.1	13	0.2	1	0.0
9 sustancias	6	0.1	6	0.1	0	0.0
10 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Total	10,947	100.0	7,884	100.0	3,063	100.0
Media (DE)	1.8 (1.4) drogas		1.9 (1.4) drogas		1.6 (1.3) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		1 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar



**Tabla 28. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	4,229	38.6	2,777	35.2	1,452	47.4
1 sustancia	4,817	44.0	3,595	45.6	1,222	39.9
2 sustancias	1,438	13.1	1,147	14.5	291	9.5
3 sustancias	341	3.1	267	3.4	74	2.4
4 sustancias	88	0.8	69	0.9	19	0.6
5 sustancias	21	0.2	16	0.2	5	0.2
6 sustancias	11	0.1	11	0.1	0	0.0
7 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Total	10,947	100.0	7,884	100.0	3,063	100.0
Media (DE)	0.8 (0.9) drogas		0.9 (0.9) drogas		0.7 (0.8) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		0 drogas	
Decil ₁	0 drogas		0 drogas		0 drogas	

DE= Desviación Estándar



Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	4,849	44.3	3,723	47.2	1,126	36.8
Tabaco	4,440	40.6	3,465	43.9	975	31.8
Nicotina en dispositivo electrónico	731	6.7	500	6.3	231	7.5
Alcohol	4,727	43.2	3,514	44.6	1,213	39.6
Bebidas fermentadas	3,745	34.2	2,839	36.0	906	29.6
Bebidas destiladas	1,782	16.3	1,275	16.2	507	16.6
Alcohol puro ("alcohol del 96")	48	0.4	35	0.4	13	0.4
Cannabis	3,770	34.4	2,988	37.9	782	25.5
Mariguana "estándar"	3,567	32.6	2,830	35.9	737	24.1
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	225	2.1	182	2.3	43	1.4
Hachís - Resina	16	0.1	13	0.2	3	0.1
Hachís - Aceite o miel	68	0.6	52	0.7	16	0.5
Sustancias similares al cannabis	54	0.5	42	0.5	12	0.4
"Mariguana" sintética	48	0.4	37	0.5	11	0.4
Medicamentos con compuestos cannábicos	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Inhalables	328	3.0	274	3.5	54	1.8
Solventes y removedores	215	2.0	182	2.3	33	1.1
Pegamentos	53	0.5	45	0.6	8	0.3
Esmaltes y pinturas	9	0.1	9	0.1	0	0.0
Gasolinas y combustibles	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Otros inhalables	55	0.5	43	0.5	12	0.4
Cocaína	1,110	10.1	921	11.7	189	6.2
Cocaína (clorhidrato)	886	8.1	724	9.2	162	5.3
Crack	274	2.5	245	3.1	29	0.9
Otro tipo de cocaína	23	0.2	19	0.2	4	0.1
Basuco (pasta base de cocaína)	11	0.1	9	0.1	2	0.1
Otras presentaciones de cocaína	12	0.1	10	0.1	2	0.1
Metanfetaminas	2,918	26.7	2,089	26.5	829	27.1
Metanfetaminas: cristal	2,883	26.3	2,063	26.2	820	26.8
Metanfetaminas: hielo	24	0.2	18	0.2	6	0.2
Metanfetaminas: "Metas"	18	0.2	13	0.2	5	0.2
Otros estimulantes del SNC	56	0.5	44	0.6	12	0.4
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	32	0.3	28	0.4	4	0.1
Anorexígenos	5	0.0	3	0.0	2	0.1
Drogas de diseño con efectos estimulantes	7	0.1	3	0.0	4	0.1
Otros estimulantes	14	0.1	11	0.1	3	0.1

Continúa



Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	19	0.2	13	0.2	6	0.2
Éxtasis (MDMA)	18	0.2	12	0.2	6	0.2
Sustancias con efectos similares a MDMA	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Drogas de diseño con efectos similares	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Piperazinas con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	270	2.5	175	2.2	95	3.1
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	267	2.4	173	2.2	94	3.1
Rohypnol	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Otros depresores del SNC	39	0.4	25	0.3	14	0.5
GHB o similares	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Sedantes hipnóticos	17	0.2	9	0.1	8	0.3
Otros depresores del SNC	19	0.2	14	0.2	5	0.2
Alucinógenos	140	1.3	113	1.4	27	0.9
LSD /LSA	81	0.7	65	0.8	16	0.5
LSD	81	0.7	65	0.8	16	0.5
LSA	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	21	0.2	16	0.2	5	0.2
Hongos alucinógenos	18	0.2	14	0.2	4	0.1
Peyote (mezcalina)	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ayahuasca	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Alucinógenos sintéticos	45	0.4	36	0.5	9	0.3
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Dextrometorfano	38	0.3	31	0.4	7	0.2
DMT	5	0.0	3	0.0	2	0.1
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0

Continúa



Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	46	0.4	40	0.5	6	0.2
Heroína blanca	8	0.1	7	0.1	1	0.0
Heroína negra o morena	38	0.3	33	0.4	5	0.2
Opioides (uso fuera de prescripción)	57	0.5	44	0.6	13	0.4
Oxicodona	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	17	0.2	12	0.2	5	0.2
Fentanilo y análogos	29	0.3	23	0.3	6	0.2
Derivados opioides combinados con analgésicos	10	0.1	8	0.1	2	0.1
Desomorfina	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opiáceos	7	0.1	2	0.0	5	0.2
Opio	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	5	0.0	0	0.0	5	0.2
Codeína (uso fuera de prescripción)	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Sustancias de uso médico	59	0.5	41	0.5	18	0.6
Anticolinérgicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiespasmódicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Antidepresivos	26	0.2	19	0.2	7	0.2
Antipsicóticos o neurolepticos	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Antihistamínicos	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	23	0.2	17	0.2	6	0.2
Otras sustancias de abuso	170	1.6	134	1.7	36	1.2
Nitritos	10	0.1	8	0.1	2	0.1
Anestésicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Bebidas energizantes	149	1.4	119	1.5	30	1.0
Drogas o bebidas inteligentes	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Esteroides anabólicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	9	0.1	6	0.1	3	0.1
Sustancias sin especificar	2	0.0	1	0.0	1	0.0



Tabla 30. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	708	6.5	17.1	497	6.3	15.9	211	6.9	21.1
< de 1 vez a la semana	1,565	14.3	37.9	1,135	14.4	36.2	430	14.0	43.1
1 o 2 veces a la semana	1,124	10.3	27.2	911	11.6	29.1	213	7.0	21.3
Cada tercer día	339	3.1	8.2	271	3.4	8.6	68	2.2	6.8
Diario	397	3.6	9.6	321	4.1	10.2	76	2.5	7.6
No consumió en los últimos 30 días	6,220	56.8	Se omite	4,370	55.4	Se omite	1,850	60.4	Se omite
Sin información	594	5.4	Se omite	379	4.8	Se omite	215	7.0	Se omite
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Tabla 31. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,875	17.1	29.9	1,374	17.4	28.8	501	16.4	33.7
1 o 2 veces a la semana	1,383	12.6	22.1	1,066	13.5	22.3	317	10.3	21.3
Cada tercer día	886	8.1	14.1	699	8.9	14.6	187	6.1	12.6
Diario	2,122	19.4	33.9	1,639	20.8	34.3	483	15.8	32.5
No consumió en los últimos 30 días	4,229	38.6	Se omite	2,777	35.2	Se omite	1,452	47.4	Se omite
Sin información	452	4.1	Se omite	329	4.2	Se omite	123	4.0	Se omite
Total	10,947	100.0	100.0	7,884	100.0	100.0	3,063	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.



Tabla 32. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	5,297	48.4	3,837	48.7	1,460	47.7
Problemas familiares	8,534	78.0	6,338	80.4	2,196	71.7
Accidentes o lesiones	2,334	21.3	1,813	23.0	521	17.0
Problemas escolares	4,777	43.6	3,396	43.1	1,381	45.1
Problemas laborales	3,194	29.2	2,720	34.5	474	15.5
Problemas psicológicos	6,982	63.8	5,054	64.1	1,928	62.9
Problemas legales	2,056	18.8	1,727	21.9	329	10.7
Conducta antisocial o delictiva	2,226	20.3	1,775	22.5	451	14.7
Otros problemas	1,755	16.0	1,303	16.5	452	14.8
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>1,048</i>	<i>9.6</i>	<i>579</i>	<i>7.3</i>	<i>469</i>	<i>15.3</i>
<i>Personas que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>8,868</i>	<i>81.0</i>	<i>6,559</i>	<i>83.2</i>	<i>2,309</i>	<i>75.4</i>



GLOSARIO

Decil	En estadística descriptiva, es cualquiera de los nueve valores que dividen a un grupo de datos ordenados en diez partes iguales, de manera que cada parte representa 1/10 de la muestra o población.
Droga ilícita de inicio	Es la primera sustancia ilegal que la persona refirió como la droga con la cual inició el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto	Sustancia por la que acuden a tratamiento las personas.
Droga de preferencia	Sustancia que la persona solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el profesional de la salud, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Nuevas sustancias de abuso o de uso poco común	Sustancias psicoactivas que han sido conocidas en el mercado por términos tales como “drogas de diseño”, “euforizantes legales”, “hierbas euforizantes”, “sales de baño”, “productos químicos de investigación” y “reactivos de laboratorio” y que no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública. El término “nuevas” no se refiere necesariamente a nuevas invenciones, sino que son sustancias que han aparecido recientemente en el mercado o que su consumo ha cobrado relevancia en los últimos años.
Otras condiciones de salud mental	De acuerdo con la indagación de las personas profesionales de la salud, las personas pueden solicitar atención por otros trastornos mentales y del comportamiento o condiciones asociadas a estos, como son: trastornos mentales y conductual del niño y el adolescente, depresión, ansiedad, psicosis, demencia, epilepsia, ludopatía, autolesiones, ideación o intento suicida (suicidio) u otro motivo de consulta.
Población en situación de vulnerabilidad	De acuerdo con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2025), dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres; los pueblos indígenas; la población afrodescendiente; las personas con discapacidad; las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ y personas migrantes. Señalan que las personas que pertenecen a estos grupos poblacionales suelen sufrir desigualdades entrecruzadas.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el consumo de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 82 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.