
**CONSUMO DE DROGAS ENTRE PACIENTES QUE
INGRESARON A TRATAMIENTO EN CENTROS DE
INTEGRACIÓN JUVENIL EN 2003**

Alma Delia Gutiérrez López
P. Isaías Castillo Franco
Abelardo Guerrero Huesca
Sara Elisa Gracia Gutiérrez de Velasco
Mario C. Balanzario Lorenzana

*Centros de Integración Juvenil
Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
México, junio de 2004*

Informe de Investigación 04-04

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

PRESIDENTE VITALICIO

Lic. José Gómez Gordo

VICEPRESIDENTE

Lic. Ernesto Enríquez Rubio

VICEPRESIDENTE

Lic. Mario Luis Fuentes Alcalá

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Sra. Kena Moreno

DIRECTOR GENERAL

Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD

Dr. Lino Díaz-Barriga Salgado

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE OPERACIÓN Y DE PATRONATOS

Psic. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Edith Escudero Coria

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Psic. David Bruno Diaz Negrete

Citación: Gutiérrez López, A.D., Castillo Franco, P.I., Guerrero Huesca, A., Gracia Gutiérrez de Velasco, S.E., y Balanzario Lorenzana, M.C. *Consumo de drogas entre pacientes que ingresaron a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2003*. Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 04-04**, México, 2004.

CONTENIDOS

RESUMEN	5
PRESENTACIÓN	5
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	6
CONSUMO DE DROGAS	7
PERFIL DEL CONSUMO DE DROGAS DE USUARIOS ACTIVOS	11
OBSERVACIONES FINALES	20
ANEXOS	23

RESUMEN

Se presentan características sociodemográficas y del consumo de drogas, así como el perfil de pacientes diferenciados por patrón de consumo actual (últimos 30 días), de **20,179** usuarios de drogas que acudieron a tratamiento a CIJ en 2003. Se comparan los resultados sociodemográficos y del consumo de drogas con los obtenidos en 2002 y se describe y compara el perfil de usuarios activos de distintas drogas. Los datos revelan un incremento de la demanda de tratamiento por parte de mujeres, elevados índices de consumo de tabaco y alcohol, así como de marihuana, cocaína, solventes inhalables y *crack*. Finalmente, se observa que los grupos de consumidores activos (últimos 30 días) de alucinógenos, solventes inhalables y heroína muestran perfiles relativamente atípicos; mientras que los usuarios activos de alcohol y tabaco son muy similares. Contra lo esperado, los usuarios activos de *crack* presentan claras diferencias en relación con los de cocaína.

PRESENTACIÓN

El presente informe responde al interés de mantener actualizada la información epidemiológica sobre el consumo de drogas entre los pacientes que acuden por primera vez a solicitar tratamiento a Centros de Integración Juvenil (CIJ) y de ampliar el conocimiento sobre la forma y tendencia en la que se manifiesta este problema. Además de contribuir a la identificación de problemas emergentes y de aportar elementos útiles para el diseño o ajuste de los servicios institucionales de prevención y atención curativo-rehabilitatoria.

Este informe comprende la descripción de las características sociodemográficas, del consumo de drogas y un perfil¹ de quienes solicitaron por primera vez los servicios de tratamiento en 2003. Los datos fueron extraídos y capturados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, a partir del formato de Entrevista Inicial del Expediente Clínico de los **20,179** usuarios de drogas que acudieron personalmente a solicitar tratamiento por primera vez a alguna de las 73 unidades de CIJ que aportaron información para este estudio (Anexo 1, Cuadro 1). También presenta la comparación de los resultados obtenidos con los datos correspondientes a 2002,² identificándose las variaciones observadas.

¹ Caracterización sociodemográfica y de consumo de drogas de casos que reportaron el uso de alcohol, tabaco, marihuana, solventes inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas, heroína o alucinógenos en los 30 días previos a la solicitud de tratamiento.

² Cfr. Castillo Franco PI, Gutiérrez López, AD. y Gracia Gutiérrez de Velasco SE, *El Consumo de Drogas entre Pacientes que Ingresaron a Tratamiento en*

Se consideran únicamente **porcentajes válidos**, excluyendo los casos de “sin información”.

Para la validación de la base de datos se revisaron cuatro muestras trimestrales, considerando un nivel de confianza del 95%. El procesamiento de datos se realizó mediante el programa SPSS v. 10 para Windows.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS³

Consultantes. En el 52.6% de los casos el usuario de drogas acudió solo a solicitar tratamiento, mientras que el 47.4% lo hizo en compañía de sus familiares u otras personas.

Sexo. Predomina la afluencia de pacientes hombres, con una razón de 5 hombres por cada mujer. Con relación a 2002, se observa un incremento de 2.4 puntos porcentuales de mujeres que acuden a solicitar tratamiento.

Edad de ingreso a tratamiento. La edad promedio de ingreso a tratamiento se situó en 25.5 años, la mediana en 23 años y la moda en 17 años; 28.1% ingresaron entre los 15 y 19 años. Con relación a la media de edad de ingreso del año inmediato anterior, se observó un incremento de un año ($\mu=24.5$ años). Sin embargo, al igual que en 2002, una mayor proporción de pacientes acudió a tratamiento a los 17 años.

Estado civil. El 57.8% refirió ser soltero, 23.4% estar casado y 10.8% vivir en unión libre, observándose con relación al 2002 un decremento de 2.3 puntos porcentuales entre los pacientes solteros y un incremento de 0.9 y 0.7 puntos porcentuales entre quienes reportaron estar separados o vivir en unión libre, respectivamente.

Escolaridad. El 44.1% afirmó cursar o haber cursado algún grado de instrucción secundaria y el 19.3% reportó estudios de educación primaria, porcentajes menores a los registrados en 2002; mientras que los pacientes con estudios de preparatoria (22.4%) y profesionales (7.8%) muestran un incremento de 1.4 y 0.9 puntos porcentuales, respectivamente.

Ocupación. El 51.6% refirió trabajar, 18.2% estudiar y 25.3% estar desempleado. En relación con el año 2002, se observa una disminución de 0.6 puntos porcentuales entre quienes estudiaban y un aumento de 0.8 puntos porcentuales de quienes se dedicaban al hogar.

Centros de Integración Juvenil durante el 2002, Informe de Investigación 03-01. Centros de Integración Juvenil A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, México, 2003.

³ Cfr. Cuadros del Anexo 1.

Fuente de referencia. El 39.3% señaló haber sido referido a CIJ por algún familiar o amigo, 12.5% por alguna institución de salud y 9.2% por alguna instancia de tipo judicial, en tanto que 8.3% refirió haber asistido por medio de las campañas en medios masivos de comunicación (MMC) y 6.3% por *motu proprio*; similares proporciones registraron quienes fueron remitidos por la escuela (6.3%) o quienes asistieron a partir de los propios programas institucionales (6.0%).

Con relación al año 2002 se observó una disminución de 1.9 puntos porcentuales entre quienes asistieron a tratamiento motivados por las campañas en medios de comunicación, así mismo de 1.4 y 1.1 puntos porcentuales entre quienes señalaron haber asistido por *motu proprio* y por el servicio de orientación telefónica; a diferencia, quienes asistieron referidos por una institución de salud o por los programas institucionales mostraron un incremento de 1.8 y 1.4 puntos porcentuales, respectivamente.

CONSUMO DE DROGAS⁴

Droga de inicio. Las principales sustancias registradas como drogas de inicio fueron: tabaco (40.6%), alcohol (32.8%), marihuana (12.2%), solventes inhalables (7.1%) y cocaína (3.9%). En proporciones menores se sitúa el uso de crack (1.0%), tranquilizantes menores (0.6%), metanfetaminas (0.5%) y Rohypnol® (0.3%).

En relación con los datos de 2002, se observa un incremento de 4.8 puntos porcentuales en el uso de tabaco y de 0.4 puntos en el uso de alcohol como sustancias de inicio; así como una disminución de 2 puntos porcentuales en el uso de solventes inhalables y de 1.3 puntos en el uso de marihuana y de cocaína, respectivamente.

Edad de inicio del uso de drogas. Incluyendo alcohol y tabaco, la edad promedio de inicio en el consumo de drogas se situó en 14.7 años, la mediana y la moda en 14 años; el 47.9% iniciaron el consumo de drogas entre los 10 y 14 años y el 40.3% entre los 15 y 19 años. Cabe destacar que la moda y la mediana de edad son similares a las reportadas en 2002. Sin embargo, hubo un incremento de 0.5 puntos porcentuales entre el grupo de edad de 15 a 19 años.

Primera droga ilegal de consumo. Entre los 17,304 usuarios de drogas ilegales, la marihuana (46.0%), la cocaína (23.6%) y los solventes inhalables (17.5%) fueron referidas con mayor frecuencia como la primera dro-

⁴ Cfr. Cuadros del Anexo 2.

ga ilegal consumida; en menor proporción se encuentran el crack (4.6%), las metanfetaminas (2.2%) y los tranquilizantes menores (1.7%). Con relación al año anterior se observa un incremento de 1.5, 0.7 y 0.4 puntos porcentuales en el consumo de marihuana, de metanfetaminas y crack, respectivamente y un decremento de 1.2 y 0.8 puntos porcentuales en el consumo de solventes inhalables y cocaína, respectivamente.

Edad de inicio del uso de drogas ilegales. El promedio de edad de inicio del consumo de drogas ilegales se situó en 17 años, la mediana en 16 años y la moda en 15 años. El 47.8% iniciaron el consumo de sustancias ilegales entre los 15 y 19 años y 30.9% entre los 10 y 14 años. Respecto al año anterior, las medidas de tendencia central fueron iguales.

Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas y el ingreso a tratamiento. El lapso promedio es de 10.8 años. El 25.3% acudió a consulta cuando tenía entre dos y cinco años de haber iniciado el consumo, 22.0% lo hizo entre seis y diez años y el 40.5% después de diez años. Al comparar la media del lapso con la del año anterior ($\mu=9.7$ años), se advirtió un incremento de 1.1 años.

Tipo de consumo. El 84.0% de los casos fue diagnosticado como **dependiente** de sustancias (incluye consumo "funcional" y "disfuncional"), mientras que 15.5% fue diagnosticado como **usuario** (incluye consumo "social u ocasional" y "experimental").⁵ Con relación a los datos de 2002, hay un incremento de 2.7 puntos porcentuales de los pacientes diagnosticados como dependientes.

Policonsumo de drogas. Entendido como el uso de dos o más sustancias (alcohol, tabaco y/o drogas ilegales) alguna vez en la vida, el policonsumo afectaba al 89.0% de los casos atendidos, lo cual representa un incremento de 0.6 puntos porcentuales en relación con 2002.

Entre quienes manifestaron el uso de bebidas alcohólicas y/o tabaco ($n=18,052$), 67.6% reportó el uso de ambas sustancias. Respecto al año anterior, hubo un incremento de 4.8 puntos porcentuales.

En el caso de los que reportaron consumo de drogas ilegales ($n=17,304$), 67.4% refirió haber utilizado dos o más sustancias ilegales alguna vez en la vida, lo cual representa un incremento de 1.5 puntos porcentuales con relación al registro del año 2002.

Entre quienes reportaron consumo en el mes previo a la solicitud de tratamiento ($n=17,000$), el uso de dos o más sustancias afectó al 67.2% de

⁵ Ver definiciones en Anexo 2, cuadro 6.

los casos atendidos. De quienes reportaron el uso de bebidas alcohólicas y/o tabaco (n=14,306), el 43.9% reportó el uso de ambas sustancias. En tanto quienes consumieron drogas ilegales (n=11,392), el 30.5% refirió haber utilizado dos o más sustancias ilícitas en dicho periodo.

Uso de drogas alguna vez en la vida.⁶ Exceptuando el uso de alcohol y tabaco (79.1% y 70.9%, respectivamente), las drogas más frecuentemente consumidas alguna vez en la vida fueron: marihuana (57.0%), cocaína (53.5%, no incluye *crack* y *basuco*) y solventes inhalables (27.7%); seguidas por el uso de *crack* (18.7%), metanfetaminas (11.5%), tranquilizantes menores (7.9%, no incluye Rohypnol[®]) y Rohypnol[®] (5.9%).

Respecto al año 2002 se observó aumento de 7.8 puntos porcentuales en el consumo de tabaco, 4 en el de alcohol, 3.3 en el de *crack* y 2.3 en el de metanfetaminas. Así como una disminución de 4.4 puntos porcentuales en el uso de cocaína, 2.2 en el de solventes inhalables, 1.5 en el de marihuana y 1.6 en el de Rohypnol[®].

Uso de drogas en el último año. El 98.4% de los casos (**18,993** usuarios) reportaron el uso de sustancias en el año previo a su ingreso a tratamiento.

Exceptuando el uso de alcohol y tabaco (65.4% y 61.0%, respectivamente), las drogas más consumidas en el último año fueron: cocaína (37.1%, no incluye *crack* y *basuco*), marihuana (36.8%), solventes inhalables (15.6%) y *crack* (15.2%), seguidas por el uso de metanfetaminas (8.8%), tranquilizantes menores (4.5%, no incluye Rohypnol[®]) y Rohypnol[®] (3.0%).

En relación al año 2002, se registró incremento de 13.6 puntos porcentuales en el uso de tabaco, de 9.6 en el de alcohol, 4.4 en el de *crack*, 3.8 en el de marihuana, 3 en el de metanfetaminas y 1 en el de solventes inhalables; en tanto que el uso de cocaína y Rohypnol[®] registraron una disminución de 0.3 puntos porcentuales, respectivamente.

Uso de drogas en el mes previo a la solicitud de tratamiento.⁷ El 84.2% de los casos (**17,000** usuarios) reportó el uso de sustancias en los 30 días previos a su ingreso a tratamiento. Con relación al año anterior, se registraron 3,588 pacientes más.

⁶ Dado que el 89.0% de los casos refirió ser poliusuario de drogas alguna vez en la vida, el uso de una droga no excluye el uso de otras sustancias.

⁷ Dado que el 67.2% de los casos refirió ser poliusuario durante el mes previo a la solicitud de tratamiento, el uso de una droga no excluye del uso de otras sustancias.

El uso de tabaco y de alcohol muestra altos índices de consumo actual (54.8% y 47.2%, respectivamente).

La marihuana es la droga de curso ilegal que durante este lapso presentó el mayor porcentaje de uso (22.8%), seguida por la cocaína (21.3%), el crack (10.5%) y los solventes inhalables (9.5%). En proporciones menores se registró el consumo de metanfetaminas (5.4%), tranquilizantes menores (2.4%) y heroína (2.1%).

Con relación al 2002, se registró un incremento de 12.4 puntos porcentuales en el uso actual de tabaco, 6.8 en el de alcohol, 2.6 en el de crack, 1.9 en el de metanfetaminas y 1.8 en el de marihuana; mientras que el uso de cocaína registró una disminución de 1.9 puntos porcentuales.

Droga de mayor impacto. Entre las sustancias cuyo uso, según la percepción del propio paciente, les produjo mayor daño a su salud o les afectó más seriamente en su desempeño familiar, laboral o social, se mencionaron con mayor frecuencia, a la cocaína (21.4%), el alcohol (17.9%), la marihuana (16.6%), el crack (11.3%), el tabaco (10.5%), los solventes inhalables (9.7%) y las metanfetaminas (6.1%).

Con relación a los datos obtenidos en el año 2002, se observó un incremento de 3.2 puntos porcentuales en el uso de alcohol, de 2.5 puntos en el del crack y tabaco, respectivamente; y de 1.8 puntos en el de metanfetaminas, en tanto que se registra un decremento de 7.1, 1.5 y 1.1 puntos porcentuales en el consumo de cocaína, marihuana y solventes inhalables, respectivamente.

PERFIL DEL CONSUMO DE DROGAS DE USUARIOS ACTIVOS⁸

A continuación se presentan resultados que tienen como propósito delinear el perfil sociodemográfico y de consumo de drogas de los consumidores activos⁹ de alcohol, tabaco, marihuana, solventes inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas, heroína o alucinógenos; para de esta manera poder incidir en los programas de prevención y tratamiento institucionales de acuerdo a los perfiles de los pacientes que usan estas drogas.

Consumidores activos de alcohol. De los 15,959 pacientes que reportaron el consumo de alcohol alguna vez en la vida, 9,518 reportó su uso en el mes previo a tratamiento (59.6%). De estos últimos, 50.6% acudió sin compañía de familiares o amigos a solicitar los servicios de CIJ a la edad promedio de 25.4 años, con un rango de edad entre 9 y 54 años y una razón de 6.2 hombres por cada mujer; 56.7% reportó ser soltero, 24.9% estar casado y 11.0% vivir en unión libre; 44.0% expresó haber cursado algún grado de educación secundaria, 25.2% de nivel medio superior, 16.6% de nivel primaria y 8.7% de nivel profesional; 56.0% manifestó trabajar, 16.4% estudiar, 2.4% dedicarse al hogar y 23.7% no contar con alguna ocupación; 54.9% fue ubicado en el nivel socio-urbano medio bajo y 21.0% en el bajo; 42.6% llegó a CIJ referido por familiares y amigos, 12.2% por instituciones de salud, 8.7% por publicidad de CIJ en medios masivos y 7.0% por instituciones judiciales.

La edad promedio de inicio del consumo de drogas, en este grupo de usuarios, es de 14.5 años; donde las principales drogas de inicio son el alcohol (43.0%) y el tabaco (41.2%). El 26.3% reportó al alcohol como la droga que más problemas le ha ocasionado en el ámbito personal, familiar, escolar o laboral (droga de mayor impacto), seguida por la cocaína (23.8%); 87.1% fue diagnosticado con dependencia a drogas.

En promedio, estos usuarios dejan pasar 10.9 años entre el inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ.

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los usuarios activos de alcohol, son tabaco (76.3%), marihuana (59.7%) y cocaína (59.8%); en menor proporción refieren el uso de solventes inhalables (25.6%), crack (20.3%) y metanfetaminas (11.0%).

⁸ Cfr. Cuadro del Anexo 3.

⁹ Casos que reportaron haber consumido drogas en los 30 días previos a la solicitud de tratamiento.

Por último, el 87.2% reportó el uso de dos o más sustancias en el último mes. Así mismo, las sustancias más consumidas **POR ESTE GRUPO** son tabaco (66.0%), cocaína (29.8%), mariguana (27.6%), crack (12.7%) y solventes inhalables (9.2%).

Consumidores activos de tabaco. De los 14,298 pacientes que reportaron el consumo de tabaco alguna vez en la vida, 11,067 reportó su uso en el mes previo a tratamiento (77.4%). De estos últimos, 52.5% acudió sin compañía de familiares o amigos a solicitar los servicios de CIJ a la edad promedio de 25.9 años, con un rango de edad entre 9 y 63 años y una razón de 4.7 hombres por cada mujer; 56.5% reportó ser solteros, 24.1% casados y 10.7% vivir en unión libre; 42.7% refirió haber cursado algún grado de educación secundaria, 23.7% de nivel medio superior, 18.4% de nivel primaria y 8.3% de nivel profesional; 52.9% manifestó trabajar, 16.3% estudiar, 4.2% dedicarse al hogar y 25.2% no contar con alguna ocupación; 55.1% fue clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo y 21.1% en el bajo; 40.9% llegó a CIJ referido por familiares y amigos, 13.1% por alguna institución de salud, 9.1% por publicidad de CIJ en medios masivos y 8.5% por alguna institución judicial.

La edad promedio de inicio del consumo de sustancias, en este grupo de consumidores, es de 14.3 años y las principales drogas de inicio son el tabaco (59.4%) y el alcohol (26.5%). El 21.6% reportó a la cocaína como la droga de mayor impacto, seguida del uso de tabaco (16.1%), alcohol (15.0%), mariguana (14.6%) y crack (12.4%); 88.0% fue diagnosticado con dependencia a drogas.

En promedio, estos usuarios dejan pasar 11.6 años entre el inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ.

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida por los usuarios activos de tabaco, son alcohol (85.1%), mariguana (58.2%) y cocaína (54.9%); en menor proporción refieren a los solventes inhalables (25.9%) y al crack (20.1%).

Por último, el 78.7% manifestó haber utilizado dos o más sustancias en el último mes. Así mismo, las sustancias más consumidas, por este grupo, son alcohol (56.7%), mariguana (24.5%) y cocaína (23.6%).

Consumidores activos de mariguana. De los 11,496 pacientes que reportaron el consumo de mariguana alguna vez en la vida, 4,604 reportó su uso en el mes previo a tratamiento (40.0%). De estos últimos, el 50.5% acudió en compañía de familiares y/o amigos a solicitar los servicios de CIJ a la edad promedio de 23.2 años, con un rango de edad entre 9 y 48

años y una razón de 9.4 hombres por cada mujer; 67.6% reportó ser solteros, 16.2% estar casados y 10.6% vivir en unión libre; 43.7% expresó haber cursado algún grado de educación secundaria, 24.9% de nivel medio superior, 21.8% de nivel primaria y 5.0% de nivel profesional; 47.6% manifestó trabajar, 19.8% estudiar y 30.0% no contar con alguna ocupación; 52.1% fue clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo y 25.6% en el bajo; 38.3% acudió a CIJ referido por familiares y amigos, 12.8% por instituciones judiciales y 12.5% por instituciones de salud.

Entre los usuarios activos de marihuana, la edad promedio de inicio del consumo de drogas es de 13.7 años y las principales drogas de inicio son el tabaco (38.2%), el alcohol (26.9%) y la marihuana (24.2%). El 49.3% reportó a la marihuana como la droga de mayor impacto, seguida por la cocaína (15.0%) y el crack (8.1%); 90.6% fue diagnosticado con dependencia a drogas.

En promedio, estos usuarios dejan pasar 9.4 años entre el inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ. Cabe señalar que el 35.4% dejó pasar más de 10 años

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los usuarios activos de marihuana, son alcohol (78.8%), tabaco (70.3%), cocaína (62.2%) y solventes inhalables (39.1%); en menor proporción refirieron el uso de crack (19.8%), metanfetaminas (16.6%), tranquilizantes menores (13.6%), Rohypnol[®] (11.9%) y alucinógenos (9.7%).

Por último, el 88.7% reportó el uso de dos o más sustancias en el mes previo a tratamiento. Así también, las sustancias más consumidas por estos usuarios son tabaco (58.8%) y alcohol (57.1%), seguidas por el uso de cocaína (27.6%), solventes inhalables (14.7%), crack (11.0%) y metanfetaminas (8.5%).

Consumidores activos de solventes inhalables. De los 5,594 pacientes que reportaron el consumo de solventes inhalables alguna vez en la vida, 1,927 reportó su uso en el mes previo a tratamiento (34.4%). De estos últimos, 66.4% acudió a solicitar los servicios de CIJ en compañía de familiares y/o amigos a la edad promedio de 18.4 años, con un rango de edad entre 9 y 36 años y una razón de 5.6 hombres por cada mujer; 84.9% reportó ser solteros, 5.7% estar casados y 5.5% vivir en unión libre; 57.2% declaró haber cursado algún grado de educación secundaria, 26.2% de nivel primaria y 12.4% de nivel medio superior; 35.3% manifestó no contar con alguna ocupación, 34.1% estudiar y 27.8% trabajar; 54.2% fue ubicado en el nivel socio-urbano medio bajo y 33.5% en el bajo; 33.0% asistió a CIJ referido por familiares y amigos, 14.8% por instituciones de

salud, 13.6% por instituciones escolares y 9.2% por instituciones judiciales.

La edad promedio de inicio del consumo de drogas, entre los usuarios de solventes inhalables, es de 13.2 años y las principales drogas de inicio son tabaco (34.5%), alcohol (22.7%) y solventes inhalables (29.9%). Por otra parte, 68.3% reportó a los solventes inhalables como la droga de mayor impacto, seguida de la marihuana (13.2%); 75.4% fue diagnosticado con dependencia a drogas.

En promedio, estos usuarios dejan pasar 5.2 años entre el inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ. Cabe señalar que el 25.6% dejó pasar entre tres y cinco años.

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los consumidores activos de solventes inhalables, son alcohol (68.9%), tabaco (64.1%), marihuana (60.2%) y cocaína (37.1%); en menor proporción se registró el consumo de crack, (13.9%), Rohypnol® (8.3%), tranquilizantes menores (8.1%) y metanfetaminas (5.1%).

Por último, el 76.4% reportó del uso de dos o más sustancias en el mes previo al tratamiento y las sustancias más consumidas, por este grupo de usuarios, son tabaco (52.1%), alcohol (45.6%), marihuana (35.1%) y cocaína (14.4%).

Consumidores activos de cocaína. De los 10,791 pacientes que reportaron el consumo de cocaína alguna vez en la vida, 4,297 reportó su uso en el mes previo a tratamiento (39.8%). De estos últimos, el 53.2% acudió a solicitar los servicios de CIJ sin compañía de familiares y/o amigos a la edad promedio de 25.9 años, con un rango de edad entre 12 y 50 años y una razón de 8.2 hombres por cada mujer; 50.3% reportó ser solteros, 29.0% casados y 12.5% vivir en unión libre; 43.6% refirió haber cursado algún grado de educación secundaria, 25.5% de nivel medio superior, 17.8% de nivel primaria y 7.5% de nivel profesional; 62.8% manifestó trabajar, 8.3% estudiar y 25.7% no contar con alguna ocupación; 53.9% fue clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo, 23.7% en el bajo y 13.1% en el medio alto; 46.3% llegó a CIJ referido por familiares y amigos, 12.0% por instituciones de salud y 10.0% por publicidad de CIJ en medios masivos.

En este grupo de usuarios activos, la edad promedio de inicio del consumo de sustancias es de 14.9 años y las principales drogas de inicio son tabaco (37.8%), alcohol (34.4%) y marihuana (12.8%). El 62.9% reportó a la co-

caína como la droga de mayor impacto; 93.7% fue diagnosticado con dependencia a drogas.

En promedio, estos usuarios dejan pasar 11 años entre el inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ.

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los usuarios activos de cocaína, son alcohol (84.5%), tabaco (70.7%), mariguana (62.0%) y solventes inhalables (23.2%).

Por último, el 90.4% reportó el uso de dos o más drogas en el mes previo a tratamiento y las sustancias más consumidas, en este grupo, son alcohol (65.9%), tabaco (60.7%), mariguana (29.6%) y crack (9.1%).

Consumidores activos de crack. De los 3,779 pacientes que reportaron el uso de crack alguna vez en la vida, 2,112 reportó su uso en el mes previo a tratamiento (55.9%). De estos últimos, 53.6% acudió a solicitar los servicios de CIJ en compañía de familiares y/o amigos a la edad promedio de 24.7 años, con un rango de edad entre 13 y 48 años y una razón de 13.1 hombres por cada mujer; 52.3% reportó ser soltero, 25.7% casado, 13.9% vivir en unión libre y 6.7% estar separado; 48.5% manifestó haber cursado algún grado de educación secundaria, 25.4% de nivel medio superior, 14.0% de nivel primaria y 6.0% de nivel profesional; 59.3% refirió trabajar, 8.1% estudiar y 30.9% no contar con alguna ocupación; 60.8% fue clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo y 19.6 en el bajo; 45.3% asistió a CIJ referido por familiares y amigos, 12.9% por publicidad de CIJ en medios masivos y 8.6% por instituciones de salud.

La edad promedio de inicio en este grupo es de 14.6 años y las principales drogas de inicio son tabaco (42.8%), alcohol (30.4%), mariguana (10.5%) y crack (6.3%). El 73.7% refirió al crack como la droga de mayor impacto, seguida de la cocaína (13.6%); 96.1% fue diagnosticado con dependencia a drogas.

En promedio, estos usuarios dejan pasar 10.2 años entre el inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ. Cabe señalar que el 41.6% dejó pasar once años o más.

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los usuarios activos de crack, son alcohol (82.1%), tabaco (73.0%), mariguana (60.7%), cocaína (55.3%) y solventes inhalables (27.7%).

Por último, el 87.3% reportó el uso de dos o más sustancias en el último mes y las sustancias más consumidas, en este periodo, son tabaco (63.7%), alcohol (57.1%), mariguana (24.1%) y cocaína (18.5%).

Consumidores activos de metanfetaminas. De los 2,320 pacientes que reportaron el consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida, 1,086 reportó su uso en el mes previo a tratamiento (46.8%). De los cuales, el 63.4% acudió acompañado por sus familiares o amigos a los servicio de tratamiento de CIJ a la edad promedio de 25 años, con un rango entre 12 y 46 años y una razón de 4.7 hombres por cada mujer; 53.2% reportó ser solteros, 21.5% casados, 15.9% unión libre y 7.9% separados; 44.9% refirió haber cursado algún grado de educación secundaria, 24.5% de nivel primaria, 23.5% de nivel medio superior y 4.0% de nivel profesional; 44.2% manifestó trabajar, 9.0% estudiar y 42.1% no contar con alguna ocupación; 47.3% fue clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo y 25.1% en el medio alto; 49.1% llegó a CIJ referido por familiares y amigos y 17.2% por instituciones de salud.

La edad promedio de inicio del consumo de sustancias, entre los usuarios de metanfetaminas, es de 14.2 años y las principales drogas de inicio son tabaco (40.8%), alcohol (29.6%) y marihuana (17.0%). El 72.5% reportó a las metanfetaminas como la droga de mayor impacto; 94.5% fue diagnosticado con dependencia a drogas.

En promedio, estos usuarios dejan pasar 10.8 años entre el inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ. Cabe señalar que el 44.5% dejó pasar once años o más.

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los consumidores activos de metanfetaminas, son alcohol (77.5%), tabaco (75.2%), marihuana (73.7%) y cocaína (64.1%); en menor proporción se registró el consumo de solventes inhalables (17.8%), tranquilizantes menores (12.1%), heroína (9.6%) y alucinógenos (6.6%).

Por último, el 91.0% reportó el uso de dos o más sustancias en el último mes y las sustancias más consumidas, por este grupo de usuarios, son tabaco (66.6%), alcohol (52.6%), marihuana (36.1%) y cocaína (18.0%).

Consumidores activos de heroína. De los 853 pacientes que reportaron el consumo de heroína alguna vez en la vida, 414 reportó su uso en el mes previo a tratamiento (48.5%). De estos últimos, 59.4% acudió a solicitar los servicios de CIJ sin la compañía de familiares o amigos a la edad promedio de 30.7 años, con un rango de edad entre 14 y 55 años y una razón de 10.2 hombres por cada mujer; 44.0% refirió ser solteros, 21.0% vivir en unión libre, 15.7% estar casados y 14.5% separados; 38.5% señaló haber cursado algún grado de educación secundaria, 36.7% de nivel primaria, 17.4% de nivel medio superior y 2.9% de nivel profesional; 53.1% manifestó estar trabajando y 42.5% no contar con alguna ocupación;

43.5% fue ubicado en el nivel socio-urbano medio bajo y 38.8% en el bajo; 62.3% ingresó a CIJ referido por familiares y amigos y 10.6% por instituciones de salud.

En este grupo de usuarios, la edad promedio de inicio del consumo de drogas es de 13.9 años y las principales drogas de inicio son tabaco (36.0%), alcohol (20.5%) y mariguana (26.8%). El 90.6% refirió a la heroína como la droga de mayor impacto; 99.7% fue diagnosticado con dependencia a drogas.

En promedio, estos usuarios dejaron pasar 16.9 años entre el inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ.

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los usuarios activos de heroína, son mariguana (78.0%), cocaína (71.5%), tabaco (71.5%) y alcohol (62.3%); seguidas por el uso de solventes inhalables (28.7%), metanfetaminas (23.2%) y tranquilizantes menores (18.6%).

Por último, el 88.6% reportó el uso de dos o más sustancias en el último mes y las sustancias más consumidas por este grupo de usuarios, son tabaco (64.3%), cocaína (33.1%), mariguana (30.2%), alcohol (29.2%) y metanfetaminas (12.6%).

Consumidores activos de alucinógenos. De los 915 pacientes que reportaron el consumo de alucinógenos alguna vez en la vida, 51 sujetos reportó su uso en el mes previo a tratamiento (5.6%). De los cuales, el 56.9% acudió sin compañía de familiares y/o amigos a solicitar los servicios de CIJ a la edad promedio de 22 años, con un rango entre 15 y 44 años y una razón de 2.9 hombres por cada mujer; 90.2% reportó ser solteros y 5.9% vivir en unión libre; 49.1% refirió haber cursado algún grado de educación de nivel medio superior, 23.5% de nivel profesional y 17.6% de nivel secundaria; 35.3% manifestó trabajar, 31.4% estudiar y 31.4% no contar con ocupación; 58.1% fue clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo y 27.9% en el medio alto; 56.9% llegó a CIJ referido por familiares y amigos y 13.7% por publicidad de CIJ en medios masivos.

La edad promedio de inicio del consumo de sustancias, en este grupo de consumidores, es de 13.7 años y las principales drogas de inicio son tabaco (31.4%) y alcohol (49.0%); seguidas por el uso de mariguana (9.8%) y alucinógenos (3.9%). El 51.1% reportó a la mariguana como la droga de mayor impacto, seguida de la cocaína (22.2%) y los alucinógenos (8.9%). 90.0% fue diagnosticado con dependencia a drogas.

En promedio, estos usuarios dejan pasar 8.3 años entre el inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ. Cabe señalar que el 37.3% dejó pasar entre seis y diez años y 35.3% entre tres y cinco años.

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los consumidores activos de alucinógenos, son marihuana (96.1%), alcohol (84.3%), cocaína (82.4%), tabaco (68.6%), metanfetaminas (43.1%) y solventes inhalables (31.4%), en menor proporción refieren el uso de tranquilizantes menores (19.6%), estimulantes anfetamínicos (13.7%), crack (11.8%) y opio y derivados (11.8%).

Por último, el 98.0% (50 casos) reportó el uso de dos o más sustancias en mes previo a tratamiento y las sustancias más consumidas, en este periodo, son marihuana (78.4%), alcohol (62.7%), tabaco (60.8%), cocaína (29.4%) y metanfetaminas (23.5%).

Comparación de los consumidores activos

En México el uso de alcohol y tabaco, al igual que en otros países es social y legalmente aceptado entre la población mayor de edad; sin embargo, en el caso de los pacientes atendidos en CIJ, los consumidores activos de dichas sustancias inician el consumo siendo menores de edad.

Los consumidores activos de alcohol o tabaco muestran perfiles sociodemográficos y de patrón de consumo semejantes; sin embargo, también presentan algunas diferencias. Así podemos observar una mayor presencia de mujeres en el grupo de tabaco; otra diferencia es que el grupo de consumidores de alcohol registra un mayor índice de policonsumo actual; por otro lado, los consumidores activos de alcohol refieren a esta misma sustancia como la droga de mayor impacto, mientras que los usuarios activos de tabaco señalan a la cocaína.

El grupo de consumidores activos de marihuana presentan características semejantes a los usuarios activos de tabaco. No obstante, los usuarios de marihuana acuden en su mayoría acompañados por familiares, amigos o conocidos; registran una mayor proporción de hombres, así como una mayor proporción de solteros o de personas que viven en pareja, pero es menor el porcentaje de quienes trabajan y mayor el índice de desempleados; además, los usuarios activos de marihuana son en mayor proporción policonsumidores actuales y diagnosticados con problemas de dependencia a drogas. Si bien, los consumidores de marihuana inician el consumo de drogas a una edad similar a la de los consumidores de tabaco, dejan pasar menos tiempo entre el inicio del consumo y el ingreso a tratamiento.

Por otro lado, el grupo de consumidores activos de cocaína también presentan características semejantes a los usuarios activos de tabaco, sin embargo, entre los usuarios de cocaína se registra una mayor presencia de hombres, casados o en unión libre y consecuentemente una menor proporción de solteros; asimismo, entre los usuarios activos de cocaína es mayor la proporción de aquéllos que trabajan, que presentan policonsumo actual y que son diagnosticados con problemas de dependencia a drogas.

Por otra parte, los consumidores activos de crack presentan características distintas a los usuarios activos de cocaína. Entre los usuarios de crack, la mayoría prefiere acudir a solicitar tratamiento en compañía de familiares, amigos o conocidos, así mismo es mayor la proporción de desempleados; en contraste, es menor la proporción de mujeres que acude a tratamiento; así como la proporción de policonsumidores actuales, no obstante que son más los usuarios diagnosticados con problemas de dependencia a drogas. Pero llama la atención que el grupo de usuarios activos de crack, reportó en el mes previo a tratamiento el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias antes que de cocaína, al igual que los usuarios activos de cocaína no refieren al crack. Finalmente, los consumidores activos de crack refieren como la droga de mayor impacto al crack y los usuarios activos de cocaína a la cocaína.

Los consumidores activos de metanfetaminas presentan un perfil de consumo similar a los usuarios activos de crack; no así, en el perfil sociodemográfico. Los consumidores de metanfetaminas acuden en su mayoría acompañados de familiares, amigos o conocidos; es mayor la proporción de mujeres, de solteros y de quienes viven en unión libre, de los desempleados y de quienes fueron clasificados como pertenecientes al estrato socio-urbano medio alto. Por otro lado, llama la atención que los usuarios activos de metanfetaminas presentan una mayor proporción de policonsumidores actuales y una menor proporción de usuarios diagnosticados con dependencia a drogas.

Por otra parte, los usuarios activos de solventes inhalables son quienes llegan antes a tratamiento; los que presentan menores porcentajes de casados o de quienes viven en unión libre, de que llegan referidos a CIJ por los familiares o amigos, de quienes inician el consumo de drogas a edades menores, de quienes dejan pasar menos tiempo entre el inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento, así como de usuarios con estudios de nivel profesional; en cambio, sobresalen los desempleados y los que están estudiando. Finalmente, en este grupo se registró la menor proporción de poliusuarios actuales y de quienes presentan diagnóstico de dependencia a drogas (tres de cada cuatro usuarios).

Los usuarios activos de heroína presentan un perfil característico. No obstante que inician el consumo de drogas alrededor de los 14 años como la mayoría de los usuarios activos, son quienes demoran más tiempo entre el inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento, lo cual puede deberse a que son quienes ingresan a mayor edad, así mismo esto puede deberse a que antes de consumir heroína han utilizado otras drogas como alcohol, tabaco y mariguana. Aun cuando en este grupo sobresalen los solteros, la proporción es menor que la registrada en los otros grupos, registrando la mayor proporción de usuarios en unión libre; en contraste este grupo registra una menor escolaridad. Cabe señalar que este grupo de usuarios presenta el mayor porcentaje de dependencia a drogas, no obstante que el índice de policonsumo actual es similar al de los consumidores activos de alcohol, mariguana y crack, siendo menor al índice que presentan los usuarios de alucinógenos, metanfetaminas y cocaína.

Finalmente, el grupo de consumidores activos de alucinógenos presentan un perfil sociodemográfico y de consumo de drogas diferente a los otros grupos. Entre estos usuarios es mayor la proporción de mujeres, de solteros, de personas con estudios de nivel medio superior y profesional, clasificados como pertenecientes al nivel socio-urbano medio alto y de poliusuarios actuales de drogas. Así mismo, registran la mayor proporción en el consumo alguna vez en la vida y en el mes previo a tratamiento de mariguana, alcohol, tabaco, cocaína y metanfetaminas, así como el uso alguna vez en la vida de solventes inhalables.

OBSERVACIONES FINALES

El ingreso de usuarios de drogas que acuden por primera vez a tratamiento en 2003, presentó un incremento de 12.2% con relación al 2002 (2,201 personas) —en 2003 entraron en operación seis nuevas unidades de atención de CIJ—. ¹⁰

La información epidemiológica generada recientemente muestra un cambio gradual en la forma del consumo de drogas; dicha situación parece confirmarse en el registro obtenido con pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ en 2003. Hace más de un decenio el problema tenía una expresión básicamente masculina. Sin embargo, en los últimos años ha sido cada vez más evidente la implicación de las mujeres en este problema. El hecho se manifiesta en la creciente demanda de tratamiento por

¹⁰ Cuajimalpa, Cd. Victoria, Clínica de Metadona, Tecomán, Manzanillo y Cozumel.

parte de las mujeres, que este último año alcanzó el registro más alto, con una razón de una mujer por cada cinco hombres (en 1990, la razón era de una mujer por cada doce hombres)¹¹.

Entre las principales sustancias utilizadas alguna vez en la vida destacan, por sus elevados índices de consumo, el alcohol y tabaco —conservando un nivel similar al observado en el año anterior—, así como el uso de marihuana, cocaína, solventes inhalables y *crack*. No obstante, destaca que en 2003 el consumo de cocaína registra una disminución de 4.4 puntos porcentuales en relación con el año anterior, mientras que el consumo de *crack* aumenta 3.3 puntos porcentuales, por lo que podría suponerse que la utilización de estas dos sustancias guarda quizá una relación de interdependencia, aunque faltaría evaluar si ésta deriva de su accesibilidad, costo, efectos, etc.

Por otra parte, la información indica un temprano inicio del uso de sustancias, afectando a un grupo importante de jóvenes. El promedio de la edad de inicio en el consumo de drogas se situó —cuando se incluyen alcohol y tabaco— en 14.7 años; cuando se trata exclusivamente del consumo de drogas ilegales, la edad promedio es de 17 años. Al respecto, conviene señalar que tres de cada cuatro solicitantes de tratamiento inició el consumo de drogas ilegales entre los 10 y 19 años. Así mismo, debe destacarse que dos de cada tres casos admitieron haber utilizado dos o más sustancias ilegales alguna vez en la vida y que aproximadamente uno de cada tres de quienes reportaron haber usado drogas actualmente (n=11,392), admitió haber utilizado dos o más sustancias ilegales en los 30 días previos a la solicitud de tratamiento.

Dos de cada cinco pacientes acudieron a tratamiento después de 10 años de haber iniciado el consumo, lo que permite suponer que entre estas personas el consumo de drogas ya habría operado un importante impacto en la salud, determinando mayores contingencias en el proceso de atención curativo-rehabilitatoria.

Finalmente, la presentación y comparación del perfil sociodemográfico y de consumo de los usuarios activos de distintas sustancias arrojan diferencias y semejanzas que vale la pena considerar en la aplicación de programas preventivos y de tratamiento. A *grosso modo* puede subrayarse que se encontró que los grupos de consumidores activos de alucinógenos, solventes inhalables y heroína muestran perfiles relativamente atípicos; mientras

¹¹ Centros de Integración Juvenil (CIJ), *Estudio epidemiológico del consumo de drogas en pacientes atendidos en 1990*, Informe final, México, 1992.

que los usuarios activos de alcohol y tabaco son muy similares. Así mismo, contra lo esperado, los usuarios activos de *crack* presentan más diferencias que semejanzas en relación con los de cocaína.

ANEXOS

ANEXO 1

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL AÑO 2003

**Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento
por unidad de atención**

Unidad de atención	Total de casos (Usuarios de drogas)	%
Álvaro Obregón	288	1.4
Azcapotzalco	390	1.9
Benito Juárez	234	1.2
Coyoacán	302	1.5
Cuajimalpa	78	0.4
Cuauhtémoc Oriente	311	1.5
Cuauhtémoc Poniente	119	0.6
Chalco	347	1.7
Ecatepec	635	3.1
Gustavo A. Madero Norte	367	1.8
Iztapalapa Centro	290	1.4
Iztapalapa Sur	892	4.4
Miguel Hidalgo	233	1.2
Naucalpan	432	2.1
Nezahualcóyotl	582	2.9
Tlalpan	364	1.8
Tlalnepantla	400	2.0
Venustiano Carranza	377	1.9
UTCE Zona Norte	540	2.7
UTCE Zona Poniente	370	1.8
Acapulco	573	2.8
Aguascalientes	353	1.7
Apodaca	94	0.5
Cancún	368	1.8
Celaya	271	1.3
Chihuahua	266	1.3
Cd. Juárez / Clínica de Metadona	684	3.4
Cd. Victoria	79	0.4
Colima	413	2.0
Cozumel	98	0.5
Cuernavaca	168	0.8
Culiacán	224	1.1
Durango	192	1.0
Guadalajara Centro	456	2.3

(Continúa)

**Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento
por unidad de atención (Continuación)**

Unidad de atención	Total de casos (Usuarios de drogas)	%
Guadalajara Sur	240	1.2
Guadalupe	169	0.8
Guamúchil	84	0.4
Guasave	212	1.1
Hermosillo	203	1.0
Laguna	423	2.1
La Paz	172	0.9
León	299	1.5
Los Mochis	192	1.0
Manzanillo	24	0.1
Mazatlán	352	1.7
Mérida	277	1.4
Mexicali	280	1.4
Monterrey	374	1.9
Oaxaca	8	0.0
Pachuca	183	0.9
Poza Rica	125	0.6
Puebla	309	1.5
Puerto Vallarta	93	0.5
Querétaro	290	1.4
Salamanca	108	0.5
Saltillo	191	0.9
San Luis Potosí	214	1.1
Tampico	247	1.2
Tecomán	43	0.2
Tehuacán	68	0.3
Tepic	10	0.0
Tlaquepaque	408	2.0
Toluca	258	1.3
Tuxtla Gutiérrez	183	0.9
UTCE Tijuana	497	2.5
UTCE Zapopan	535	2.7
UTR Noroccidental	258	1.3
UTR Nuevo León	172	0.9
UTR Occidental	266	1.3
Xalapa	265	1.3
Zacatecas	181	0.9
Zamora	176	0.9
Total	20,179	100.0

Cuadro 2. Personas que acudieron a solicitar tratamiento

	Frec.	%
Paciente usuario de drogas	10,610	52.6
Paciente y familiares u otras personas	9,569	47.4
Total	20,179	100.0

Cuadro 3. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	16,796	83.2	5:1
Mujeres	3,383	16.8	
Total	20,179	100.0	

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	Frec.	%	% válido
Menos de 10 años	9	0.0	0.0
10 a 14 años	1,445	7.2	7.2
15 a 19 años	5,677	28.1	28.1
20 a 24 años	4,098	20.3	20.3
25 a 29 años	3,094	15.3	15.3
30 a 34 años	2,334	11.6	11.6
35 a 39 años	1,423	7.1	7.1
40 a 44 años	938	4.6	4.7
45 años y más	1,152	5.7	5.7
<i>Sin información</i>	9	0.0	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Cuadro 5. Estado civil

	Frec.	%	% válido
Soltero(a)	11,628	57.6	57.8
Casado(a)	4,714	23.4	23.4
Unión libre	2,169	10.7	10.8
Divorciado(a)	407	2.0	2.0
Separado(a)	1,098	5.4	5.5
Viudo(a)	112	0.6	0.6
<i>Sin información</i>	51	0.3	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	Frec.	%	% válido
Primaria incompleta	1,251	6.2	6.3
Primaria completa	2,600	12.9	13.0
Secundaria incompleta	3,557	17.6	17.8
Secundaria completa	5,269	26.1	26.3
Preparatoria incompleta	2,704	13.4	13.5
Preparatoria completa	1,786	8.9	8.9
Estudios técnicos	1,106	5.5	5.5
Estudios profesionales	1,558	7.7	7.8
Ninguna	155	0.8	0.8
Otros estudios	12	0.1	0.1
<i>Sin información</i>	181	0.9	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	Frec.	%	% válido
Desempleado	5,039	25.0	25.3
Hogar	716	3.5	3.6
Estudia	3,633	18.0	18.2
Estudia y trabaja	250	1.2	1.3
Trabaja	10,272	50.9	51.6
<i>Sin información</i>	269	1.3	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Cuadro 8. Fuente de referencia

	Frec.	%	% válido
<i>Motu propio</i>	1,274	6.3	6.3
Institución judicial	1,844	9.1	9.2
Institución salud	2,510	12.4	12.5
Familia o amigos	7,907	39.2	39.3
Escuela	1,262	6.3	6.3
Trabajo	417	2.1	2.1
Servicio de orientación telefónica de CIJ	447	2.2	2.2
Campañas de CIJ en medios de comunicación	1,677	8.3	8.3
Programas preventivos de CIJ	1,204	6.0	6.0
Otro	1,594	7.9	7.9
<i>Sin información</i>	43	0.2	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Anexo 2

CARACTERÍSTICAS DEL USO DE DROGAS ENTRE PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN 2003

Cuadro 1. Droga de inicio

	Frec.	%
Alcohol	6,617	32.8
Tabaco	8,190	40.6
Mariguana	2,458	12.2
Solventes inhalables	1,436	7.1
Cocaína ¹	777	3.9
Tranquilizantes menores ²	118	0.6
Heroína	29	0.1
Metanfetaminas	109	0.5
Alucinógenos	16	0.1
<i>Crack</i>	200	1.0
<i>Basuco</i> (pasta base de cocaína)	16	0.1
Sedantes barbitúricos	20	0.1
Rohypnol [®]	61	0.3
Antidepresivos	12	0.1
Estimulantes anfetamínicos	43	0.2
Otros estimulantes del SNC ³	1	0.0
Opio y derivados ⁴	11	0.1
Refractil Ofteno [®]	6	0.0
Sustancias no identificadas	59	0.3
Total	20,179	100.0

¹ Excluye el uso de crack y de *basuco*

² Excluye el uso de Rohypnol[®]

³ Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos.

⁴ Excluye el uso de heroína

Cuadro 2. Edad de inicio del uso de drogas

	Frec.	%	% válido
Menos de 10 años	960	4.8	4.8
10 a 14 años	9,554	47.3	47.9
15 a 19 años	8,022	39.8	40.3
20 a 24 años	900	4.5	4.5
25 a 29 años	278	1.4	1.4
30 a 34 años	118	0.6	0.6
35 a 39 años	49	0.2	0.2
40 a 44 años	20	0.1	0.1
45 años y más	26	0.1	0.1
<i>Sin información</i>	252	1.2	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Cuadro 3. Primera droga ilegal de consumo

	Frec.	%	% válido
Mariguana	7,955	39.4	46.0
Solventes inhalables	3,020	15.0	17.5
Cocaína ¹	4,078	20.2	23.6
Tranquilizantes menores ²	288	1.4	1.7
Heroína	74	0.4	0.4
Metanfetaminas	374	1.9	2.2
Alucinógenos	50	0.2	0.3
<i>Crack</i>	798	4.0	4.6
<i>Basuco</i> (pasta base de cocaína)	43	0.2	0.2
Sedantes barbitúricos	61	0.3	0.4
Rohypnol®	140	0.7	0.8
Antidepresivos	21	0.1	0.1
Estimulantes anfetamínicos	163	0.8	0.9
Otros estimulantes del SNC ³	3	0.0	0.0
Opio y derivados ⁴	30	0.1	0.2
Refractil Ofteno®	17	0.1	0.1
Sustancias no identificadas	189	0.9	1.1
No consumió	2,875	14.2	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

¹Excluye el uso de crack y de *basuco*²Excluye el uso de Rohypnol®³Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos.⁴Excluye el uso de heroína

Cuadro 4. Edad de inicio del uso de drogas ilegales

	Frec.	%	% válido
Menos de 10 años	267	1.3	1.6
10 a 14 años	5,251	26.0	30.9
15 a 19 años	8,118	40.2	47.8
20 a 24 años	1,790	8.9	10.5
25 a 29 años	848	4.2	5.0
30 a 34 años	396	2.0	2.3
35 a 39 años	180	0.9	1.1
40 a 44 años	89	0.4	0.5
45 años y más	45	0.2	0.3
<i>Sin información</i>	3,195	15.8	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Cuadro 5. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de drogas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	Frec.	%	% válido
Menos de un año	966	4.8	4.8
Un año	1,456	7.2	7.3
Dos años	1,526	7.6	7.7
Tres a cinco años	3,508	17.4	17.6
Seis a diez años	4,388	21.7	22.0
Once años o más	8,076	40.0	40.5
<i>Sin información</i>	259	1.3	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Cuadro 6. Tipo de consumo

	Frec.	%	% válido
Experimental ^a	984	4.9	5.0
Social u ocasional ^b	2,084	10.3	10.5
Funcional ^c	12,967	64.3	65.6
Disfuncional ^d	3,645	18.1	18.4
En remisión ^e	89	0.4	0.5
<i>Sin información</i>	410	2.0	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

a) Consumidor que ha probado drogas motivado en general por la curiosidad, pero que no se ha sentido impulsado por repetir la experiencia

b) Consumidor que utiliza drogas por lo general en un contexto social en donde el resto del grupo la consume. Sin embargo no se siente interesado en repetir la experiencia fuera de ese medio, ni lo hace frecuentemente.

c) Consumidor que utiliza drogas con frecuencia ya que ha desarrollado problemas de dependencia de algún tipo, pero se desenvuelve en su medio familiar, laboral, escolar y social sin que tales problemas le provoquen conflictos.

d) Consumidor que no sólo utiliza las drogas con frecuencia, sino que su vida gira en torno al consumo, lo que se hace evidente por los problemas en relación con su medio, por las consecuencias que la droga produce en su organismo y funciones mentales.

e) Consumidor que ha dejado de usar drogas por un lapso de tiempo no menor de un mes.

Cuadro 7. Uso de una y dos o más sustancias alguna vez en la vida (monoconsumo y policonsumo de drogas)

	Frec.	%	% ajustado
Cualquier droga			
Monoconsumo	2,216	11.0	11.0
Policonsumo	17,963	89.0	89.0
Drogas legales			
Monoconsumo	5,847	29.0	32.4
Policonsumo	12,205	60.5	67.6
No consumió	2,127	10.5	Se omite
Drogas ilegales			
Monoconsumo	5,648	28.0	32.6
Policonsumo	11,656	57.8	67.4
No consumió	2,875	14.2	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Cuadro 8. Uso de una y dos o más sustancias en el mes previo a la solicitud de tratamiento (monoconsumo y policonsumo de drogas)

	Frec.	%	% ajustado
Cualquier droga			
Monoconsumo	5,574	27.6	32.8
Policonsumo	11,426	56.6	67.2
No consumió	3,179	15.8	Se omite
Drogas legales			
Monoconsumo	8,027	39.8	56.1
Policonsumo	6,279	31.1	43.9
No consumió	5,873	29.1	Se omite
Drogas ilegales			
Monoconsumo	7,919	39.2	69.5
Policonsumo	3,473	17.2	30.5
No consumió	8,787	43.5	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Cuadro 9. Uso de drogas alguna vez en la vida por sustancias

	Frec.	%
Alcohol	15,959	79.1
Tabaco	14,298	70.9
Mariguana	11,496	57.0
Solventes inhalables	5,594	27.7
Cocaína ¹	10,791	53.5
Tranquilizantes menores ²	1,593	7.9
Heroína	853	4.2
Metanfetaminas	2,320	11.5
Alucinógenos	915	4.5
<i>Crack</i>	3,779	18.7
<i>Basuco</i> (pasta base de cocaína)	382	1.9
Sedantes barbitúricos	285	1.4
Rohypnol [®]	1,189	5.9
Antidepresivos	66	0.3
Estimulantes anfetamínicos	720	3.6
Otros estimulantes del SNC ³	72	0.4
Opio y derivados ⁴	208	1.0
Refractil Ofteno [®]	63	0.3
Sustancias no identificadas	1,029	5.1

¹Excluye el uso de *crack* y de *basuco*

²Excluye el uso de Rohypnol[®]

³Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos.

⁴Excluye el uso de heroína

Cuadro 10. Uso de drogas en el último año

	Frec.	%	% válido
Reportó uso drogas en el mes previo a tratamiento	18,993	94.1	98.4
No reportó uso drogas en el mes previo a tratamiento	302	1.5	1.6
<i>Sin Información</i>	884	4.4	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Cuadro 11. Uso de drogas en el último año por sustancias

	Frec.	%
Alcohol	13,200	65.4
Tabaco	12,319	61.0
Mariguana	7,422	36.8
Solventes inhalables	3,158	15.6
Cocaína ¹	7,486	37.1
Tranquilizantes menores ²	906	4.5
Heroína	560	2.8
Metanfetaminas	1,770	8.8
Alucinógenos	292	1.4
<i>Crack</i>	3,060	15.2
<i>Basuco</i> (pasta base de cocaína)	331	1.6
Sedantes barbitúricos	147	0.7
Rohypnol [®]	597	3.0
Antidepresivos	43	0.2
Estimulantes anfetamínicos	414	2.1
Otros estimulantes del SNC ³	36	0.2
Opio y derivados ⁴	93	0.5
Refractil Ofteno [®]	15	0.1
Sustancias no identificadas	466	2.3

¹Excluye el uso de *crack* y de *basuco*²Excluye el uso de Rohypnol[®]³Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos.⁴Excluye el uso de heroína

Cuadro 12. Uso de drogas en el mes previo a la solicitud de tratamiento

	Frec.	%	% válido
Reportó uso drogas en el mes previo a tratamiento	17,000	84.2	88.1
No reportó uso drogas en el mes previo a tratamiento	2,295	11.4	11.9
<i>Sin Información</i>	884	4.4	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

Cuadro 13. Uso de drogas en el mes previo a la solicitud de tratamiento por sustancia

	Frec.	%
Alcohol	9,518	47.2
Tabaco	11,067	54.8
Mariguana	4,604	22.8
Solventes inhalables	1,927	9.5
Cocaína ¹	4,297	21.3
Tranquilizantes menores ²	476	2.4
Heroína	414	2.1
Metanfetaminas	1,086	5.4
Alucinógenos	51	0.3
<i>Crack</i>	2,112	10.5
<i>Basuco</i> (pasta base de cocaína)	235	1.2
Sedantes barbitúricos	75	0.4
Rohypnol®	254	1.3
Antidepresivos	29	0.1
Estimulantes anfetamínicos	183	0.9
Otros estimulantes del SNC ³	19	0.1
Opio y derivados ⁴	54	0.3
Refractil Ofteno®	6	0.0
Sustancias no identificadas	219	1.1

¹Excluye el uso de *crack* y de *basuco*²Excluye el uso de Rohypnol®³Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos.⁴Excluye el uso de heroína

Cuadro 14. Droga de mayor impacto

	Frec.	%	% válido
Alcohol	3,236	16.0	17.9
Tabaco	1,895	9.4	10.5
Mariguana	3,006	14.9	16.6
Solventes inhalables	1,759	8.7	9.7
Cocaína ¹	3,874	19.2	21.4
Tranquilizantes menores ²	174	0.9	1.0
Heroína	458	2.3	2.5
Metanfetaminas	1,097	5.4	6.1
Alucinógenos	16	0.1	0.1
<i>Crack</i>	2,053	10.2	11.3
<i>Basuco</i> (pasta base de cocaína)	181	0.9	1.0
Sedantes barbitúricos	29	0.1	0.2
Rohypnol®	63	0.3	0.3
Antidepresivos	12	0.1	0.1
Estimulantes anfetamínicos	144	0.7	0.8
Otros estimulantes del SNC ³	2	0.0	0.0
Opio y derivados ⁴	42	0.2	0.2
Refractil Ofteno®	0	0.0	0.0
Sustancias no identificadas	72	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	2,066	10.2	Se omite
Total	20,179	100.0	100.0

¹ Excluye el uso de *crack* y de *basuco*

² Excluye el uso de Rohypnol®

³ Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos.

⁴ Excluye el uso de heroína

ANEXO 3

PERFIL DEL CONSUMO DE DROGAS DE USUARIOS ACTIVOS (%)

Característica	Alcohol	Tabaco	Mariguana	Solventes inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Heroína	Alucinógenos
Consultante	Sin compañía	Sin compañía	Con compañía	Con compañía	Sin compañía	Con compañía	Con compañía	Sin compañía	Sin compañía
Promedio de edad de ingreso a tratamiento	25.4	25.9	23.2	18.4	25.9	24.7	25	30.7	22
Razón de hombres por cada mujer	6.2	4.7	9.4	5.6	8.2	13.1	4.7	10.2	2.9
Estado civil	Solteros 56.7 Casados 24.9 Unión libre 11.0	Solteros 56.5 Casados 24.1 Unión libre 10.7	Solteros 67.6 Casados 16.2 Unión libre 10.6	Solteros 84.9 Casados 5.7 Unión libre 5.5	Solteros 50.3 Casados 29.0 Unión libre 12.5	Solteros 52.3 Casados 25.7 Unión libre 13.9	Solteros 53.2 Casados 21.5 Unión libre 15.9	Solteros 44.0 Unión libre 21.0 Casado 15.7	Solteros 90.2 Unión libre 5.9
Escolaridad	Secundaria 44.0 Primaria 16.6 Profesional 8.7	Secundaria 42.7 Primaria 18.4 Profesional 8.3	Secundaria 43.7 Primaria 21.8 Profesional 5.0	Secundaria 57.2 Primaria 26.2	Secundaria 43.6 Primaria 17.8 Profesional 7.5	Secundaria 48.5 Primaria 14.0 Profesional 6.0	Secundaria 44.9 Primaria 24.5 Profesional 4.0	Secundaria 38.5 Primaria 36.7 profesional 2.9	Preparatoria 49.1 Profesional 23.5 Secundaria 17.6
Ocupación	Trabaja 56.0 No ocupado 23.7	Trabaja 52.9 No ocupado 25.2	Trabaja 47.6 No ocupado 30.0	No ocupado 35.3 Estudia 34.1	Trabaja 62.8 No ocupado 25.7	Trabaja 59.3 No ocupado 30.9	Trabaja 44.2 No ocupado 42.1	Trabaja 53.1 No ocupado 42.5	Trabaja 35.3 No ocupado 31.4 Estudia 31.4

Continúa...

PERFIL DEL CONSUMO DE DROGAS DE USUARIOS ACTIVOS (%)

Característica	Alcohol	Tabaco	Mariguana	Solventes inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Heroína	Alucinógenos
Nivel socio-urbano	Medio bajo 54.9	Medio bajo 55.1	Medio bajo 52.1	Medio bajo 54.2	Medio bajo 53.9	Medio bajo 60.8	Medio bajo 47.3 Medio alto 25.1	Medio bajo 43.5 Bajo 38.8	Medio bajo 58.1 Medio alto 27.9
Fuente de referencia (Familiar y amigos)	42.6	40.9	38.3	33.0	46.3	45.3	49.1	62.3	56.9
Promedio de edad de inicio del consumo de drogas	14.5	14.3	13.7	13.2	14.9	14.6	14.2	13.9	13.7
Principales drogas de inicio	Alcohol Tabaco	Tabaco Alcohol	Tabaco Alcohol Mariguana	Tabaco Alcohol Solventes	Tabaco Alcohol	Tabaco Alcohol	Tabaco Alcohol	Tabaco Alcohol Mariguana	Tabaco Alcohol
Droga de mayor impacto	Alcohol	Cocaína	Mariguana	Solventes inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Heroína	Mariguana
Diagnóstico del consumo (Dependencia)	87.1	88.0	90.6	75.4	93.7	96.1	94.5	99.7	90.0
Promedio del tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas y el ingreso a tratamiento	10.9 años	11.6 años	9.4 años	5.2 años	11 años	10.2 años	10.8 años	16.9 años	8.3 años

Continúa...

PERFIL DEL CONSUMO DE DROGAS DE USUARIOS ACTIVOS (%)

Característica	Alcohol	Tabaco	Mariguana	Solventes inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Heroína	Alucinógenos
Uso de drogas alguna vez en la vida*	Tabaco Mariguana Cocaína	Alcohol Mariguana Cocaína	Alcohol Tabaco Cocaína Solventes	Alcohol Tabaco Mariguana Cocaína	Alcohol Tabaco Mariguana	Alcohol Tabaco Mariguana Cocaína	Alcohol Tabaco Mariguana Cocaína	Mariguana Cocaína Tabaco Alcohol	Mariguana Alcohol Cocaína Tabaco Metanfetaminas Solventes
Policonsumo de drogas en el mes previo a tx.	87.2	78.7	88.7	76.4	90.4	87.3	91.0	88.6	98
Uso de drogas en el mes previo a la solicitud de tratamiento*	Tabaco Cocaína Mariguana	Alcohol Mariguana Cocaína	Tabaco Alcohol	Tabaco Alcohol Mariguana	Alcohol Tabaco Mariguana	Tabaco Alcohol Mariguana	Tabaco Alcohol Mariguana	Tabaco Cocaína Mariguana Alcohol	Mariguana Alcohol Tabaco Cocaína Metanfetaminas

* A cada grupo corresponde el 100% de uso de la droga que define al mismo. Por ejemplo, para el grupo de alcohol, todos los usuarios reportaron el uso de alcohol alguna vez en la vida y en el mes previo a tratamiento.